

**BERNARDI
SIEGFRIED ALBINI
EXPLICATIO
TABULARUM...**

Bartolomeo Eustachi,
Bernhard Siegfried Albinus



2-85



BERNARDI SIEGFRIED ALBINI
EXPLICATIO
TABULARUM
ANATOMICARUM
BARTHOLOMAEI EUSTACHII,

A N A T O M I C I S U M M I.

Auctor recognovit, castigavit, auxit, denuo edidit.



L E I D A E.

Apud **JOANNEM & HERMANNUM VERBEEK**, Bibliop.

C I O I O C C L X I



BERNARDI SIEGFRIED ALBINI
EXPLICATIO
TABULARUM
BARTHOLOMAEI EUSTACHII.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

BERNARDUS SIEGFRIED ALBINUS
AUDITORIBUS SUIS

S. P. D.



Explicationem promissam à me, Auditores optimi, vobis non modo exhibeo, sed etiam dico, dedicoque. Quid enim fieri posset aequius, quam ut ad vos perveniat tota, quam, vobis morem ut gererem, causaque vestra, & suscepi conficere, & absolvi? Ac vos quidem, qui per hos quatuor & viginti annos, ex quo tempore hac in Academia docui, operam mihi alii post alios dedistis; quum satis jam moveri possent summis illis laudibus, quibus Eustachii tabulas viri extulerunt praestantissimi; assidua etiam commendatione mea adducti estis, ut, quando in anatomicis, quorum aliquid iis continetur, versaremini, in manibus eas semper haberetis. Sed, quemadmodum saepe & multum conquesti estis, impedimentum identidem intulit, atque à tabulis rejecit difficultas intelligendi illa omnia, quae exhibita in iis sunt: quippe quum nudae, absque ulla Eustachii ipsius expositione, praeter vulgatas octo primas, repertae sint; & ut summorum hominum opera, quam ad eas illustrandas contulerunt, adjumento sit in multis; ea tamen in multis quoque, inter quae non pauca sint perdifficilia, passim desideretur. Quo factum est, ut multi olim vestrum, quibus praesentibus, atque insipientibus, corpora hominum pro demonstrationibus anatomicis quotannis secui, & rimatus sum, tabulis studiose adscripserint, quae tunc vel animadvertabant, vel à me requirebant: multi, quae in demonstrationibus ipsis laudari à me audiebant, & explanari. Atque ita non pauca quidem paulatim collegerunt; sed tamen tantummodo dispersim. Quamobrem ante multos annos, iis, quos ex vobis tunc temporis auditores habebam, petentibus, suscepi, ut publicis scholis, quas per anni academici decursum hic habemus, tabulas illas exponerem, brevibusque notis tanquam

*

quam indicem earum perpetuum traderem : quem describere annisi sunt. Traditumque per manus adhibuistis, qui insculti estis; atque ita, ut, quum anatomen vobiscum tractarem, eum confirmare, & augere, non destiteritis. Fuerunt deinde inter vos, qui, ut describendi labore socios studiorum suorum levarent, conservarentque, quae quidem interire non debere putabant, consilium edendi indicis illius ceperint. De quo quum ad me referrent, rogare ego, ut ab incepto desisterent: deberi enim hoc Eustachio; deberi aestimatoribus ejus; deberi utilitati publicae, ne quid nimium festinanter, imperfecteque agatur: fieri vix posse, ut, quae sic excepta sint, ac deinde ab aliis aliisque digesta, & aucta, satis habeant maturitatis. Quum instarent: ego, deberi etiam mihi, à quo acceperint; deberi vel maxime ab iis, qui acceperint. Tunc igitur petere, ut ejusmodi aliquid ipse emitterem. Ab eoque tempore instare non desierunt, & jure etiam quodam, ut sibi quidem videbatur, à me contendere, ut, quibus maxime admodum juvari posse studia sua docuerim, iis ut recte uti possent efficere. Ne igitur deessem flagitationi eorum, aggressus sum non ad recognoscenda modo illa, confirmandaque, quae jam habebam collecta; sed etiam ad addenda, quae deficiebant. Quanquam animo satis prospiciebam, in multas magnasque incurfurum me difficultates, indicem aliquem conficere si illa quidem accuratione vellem, quae, non dicam dignitati Eustachii, sed vestro studio, & meae saltem voluntati, aliquo modo responderet. Atque ita etiam evenit, ut praevideram. Icones videlicet erant alienae; resque & permultas, & varias, inter easque etiam intellectu minime faciles, continebant: & conandum tamen erat, eas non jam alicubi, ad libitum electis quibusdam, sed ubique intelligere, atque interpretari. Quamobrem minime mihi mirum accidit, tantum me & temporis, & operae, non raro etiam permolestae, ea in re una consumissey: maximeque comparando icones cum rebus ipsis; excutiendoque corpora hominum ad invenienda, quae minus erant in iconibus manifesta; quo certi quid, aut probabilis, proferre de iis possem. Quod tamen multo fecissem

sem facilius, nisi efficiendum temporibus illis fuisset, quibus, quum fere sola idonea sint ad demortuorum corpora tractanda, ad incidenda ea, atque anatomicen, quod muneris mei ratio postulabat, tradendam, ut vos optimi testes estis, plane indigui: illis, quibus, quin praeterea alia multa ex illis iisdem corporibus, quod opportunum erat, colligerem, impetrare à me non potui. Accessit hoc etiam molestiae, quod, quum scrupulus aliquis restabat, ut saepenumero accidit; aut quum confirmare, quae animadvertisse me opinabar, cupiebam; ad eundem insequentibus annis iterum ac saepius redeundum fuerit laborem. Et probe memini, nec dissimulo, non pauca torfisse me diu. Ne dicam de recognoscendis annotationibus, iisdemque digerendis; de scriptis Eustachii toties perlegendis, quaerendoque in iis, quod lumen in tenebris praeferret; de evolvendis antiquorum scriptis, quamvis obscura spe, ad cognoscendum, an ferre aliquid opis possent; de conquirendis, & expendendis illis, quae à viris praestantissimis solertissimisque super his tabulis scripta sunt; de consiciendis tabulis linearibus, notisque necessariis eis inscribendis; de tabularum, deque tota denique operis editione curanda. Ad quae omnia, operosa sane, vix satis temporis ex tot aliis publicis privatisque negotiis, quibus distentus fui, surripere potui. Quid multa? Rem, ut potui, perfeci. Ex qua opera, vobis libenter praestita, si quid alii etiam fructus ferent; si quid Eustachius collustrabitur; id omne debebitur vobis, quod auctores fuistis, atque impulsores. Quamvis autem hic liber serius prodeat in lucem, quam quidem vos, qui me antea audivistis, voluissetis; mihi tamen illud perjucundum est, quod, quoniam ejus expectationem vos etiam nunc tenere intelligo, sperare licet, omnes me & voluntatis meae hac in parte fructus, & industriae, non perdidisse. Gratulor vobis, hoc interim spatio non minus dignitate, quam commodis, fortunam plerorumque vestrum crevisse. Qui medicinam exercetis, vobis de laude gratulor, deque utilitatibus, quas peritia & industria vestra vobis quotidie comparatis. Ad docendum adhibiti qui estis, vobis gratulor, quod provinciam, quam suscepistis, tam egregie,

gie, tantaque cum celebritate sustinetis. Pergite bene de re publica merendo fortunam vestram magis ac magis amplificare. Et vos, qui litterato otio multa cum dulcedine frui-
mini; vosque, quibus, quamvis aliis studiis dediti essetis, meis tamen interesse volupe fuit; pergite jucundissimos fructus studiorum vestrorum capere, ac percipere. Vobis autem, qui me cum maxime auditis; & vobis quoque, qui in posterum audietis, si qui audient; vobis, qui ad eandem laudem, quam superiores illi consecuti sunt, contenditis, eademque com-
moda spectatis, ut ea res fauste, feliciter, prosperèque eveniat, precor. Viam anatomen colentibus vobis hoc opus promittit expeditiorem, certioreque. Ipsae equidem tabulae praeterquam quod accuratae sint, perspicuaeque, ac summo quodam judicio concinnatae, multaque contineant melius quam ab ullo alio exhibita; praeterea etiam esse vobis possunt epitome quaedam iconica, eaque & utilissima, & commodissima. Efficereque brevi hoc indice, quem accipitis, conatus sum, ut iis uti facilius possëtis. Quod si quaecipiam praeterea occurrant, quae animadversione digna esse videantur, ei illa, si placuerit, addetis. Ego quidem multa sciens praeterii, quod aut ex iconibus ipsis satis superque visa sunt apparere, aut, quae attendantur, minus digna esse: de quibus fieri poterit, ut aliter aliis videatur. Et satis provideo, non defuturos, qui alia atque alia ostendi putent, & contendant, quamdiu Eustachius ipse in ordinem non coget: quamvis tamen rejicere illa nolim, antequam cognoverim. Vos autem usu tractandoque cognoscetis, an satisfactum sit proposito meo, voluntatique vestrae. Volui aliquid quidem efficere certe, quo gratificari vobis omnibus possem: & si quidem, quod volui, quodammodo consecutus sum, satis mihi magna jam tributa merces est laborum, ac vigiliarum mearum. Valete!

D. Leidac Batav. c13 D CXLIII.

A L B I N I P R A E F A T I O.



Multa eorum, quae his in tabulis Eustachius, anatomicus rarus, expressit, notissima sunt; quae quivis, mediocriter rerum anatomicarum cognitione imbutus, facile cognoscat: multa difficiles explicatus habent: quaedam ambigua: nonnulla vix interpretanda. Satis autem apparet pleraque omnia ex corporibus hominum sumta esse; pauca ex animalibus aliis. Quocirca cupienti mihi intelligere res illas minus faciles, diligenter in corporibus hominum, & illorum animalium, quorum esse videantur, quaerendae inprimis fuerunt, ut, si qua in iis manifeste invenirentur, omnis eo, quidnam significetur, tolleretur dubitatio; sin minus manifeste, indicia tamen reperire studerem, quae ad aliquam conjecturam faciendam pertinere possint. Quod quanquam me potissimum quidem juvit, eo tamen plus in totis his tabulis visus mihi sum intelligere, quo magis sum modum, quo confectae sunt, (nisi me fefelli) assecutus. Neque enim, puto, rerum imagines omni ex parte exquisitas absolutasque exprimere voluit; sed tantummodo certa quaedam notare, quae in rebus illis animadverterit, aut proponere de iis in animum induxerit. Videre illud licet in ipsius explicatione tabularum, quae opusculis anatomicis adjectae sunt: idemque etiam in nuper inventis haud obscure apparet. Quod, quo magis intelligatur, exponam paulo plenius.

Ac primum quidem, quod ad observationes attinet, vide quomodo, quae de *magnitudine & altitudine* positus renum observaverat, exhibuerit in tabulis, quae additae opusculis anatomicis: itemque quae de *glandulis renibus incumbentibus*; quae de renibus tribus, *naturali uno, duobus praeter naturam*; quae de *vase urinario*, de rene urino, de canino, de papillis renum, de venis & arteriis emulgentibus, de vena sine pari, de venis aliis, de musculo mallei, de valvula venae coronariae cordis, de *membrana* denique, quae *foramini venae cavae à jecore adscendentis, cum primum haec*

A in

in dextram auriculam degenerat, praefecta est. Illasque suas observationes accurate exhibuit; atque ita, ut icones descriptioni plane respondeant. Videsne in prima tabulae I. *renem dextrum*, quemadmodum in explicatione traditum, *esse majorem, quam sinistrum*; parte superiore utrumque aequalem fere altitudinem habere; *sinistrum enim nonnihil dextro esse elatior*, inferiore dextrum sinistro esse humiliorem, & hoc evenire propter magnitudinem; *cujus causa sinister altior dextro dici possit?* Videsne in eadem *glandulam reni dextro incumbentem, forma ei respondentem, majorem esse, quam sinistram?* in secunda autem *glandulas illas esse instar placentularum depressas, ac latas?* Necessè autem non est pluribus illius generis exemplis hoc facere longius, quum plena eorum sit ejus explicatio. Et in nuper quoque inventis tabulis sunt, quae aut plane, aut majorem partem respondeant quibusdam locis opusculorum anatomicorum. Est *urinarii meatus distributio*, IKLLLLLL tabulae XIII. Est *profundus venae axillaris ramus*, n tabulae XXVI. n°. II, & x: x tabulae XXV. n°. II, & μ: μ tabulae XXIV. n°. II. Sunt rami, *in quos interdum scindatur vena vertebralis*, opp tabulae XXVI. n°. II. Sunt venae lmnop figurae III. tabulae XXVII. Sunt venae s, t, u figurae ejusdem. Est vena, *quae azygae munere in sinistro latere fungitur*, w figurae VII. tabulae ejusdem XXVII. Est *humerariae vices gerens*, l figurae VIII. tabulae ejusdem. Sunt venae intercostales ab utroque latere superiores duae, t, t: u, u figurae XII. tabulae ejusdem. Est *sternomastoideus*, & *cleidomastoideus*, s, t: t tabulae XXXV. Est *rectus lateralis capitis*, A figurae XIII. tabulae XLI: & *rectus internus minor*, ε ibidem: & *rectus internus major*, II ibidem. Est *deficiens sutura sagittalis*, d figurae III. tabulae XLVI. Est *lambdiformis*, d figurae VIII. tabulae ejusdem. Est *ligamentum g* figurae IX. tabulae XLVII. Est *sternum* figurae XVIII. XIX. XX. XXI. tabulae ejusdem. Est *officulum circa radicem magni digiti manus locatum*, e figurae XXXIV. tabulae ejusdem: & *os, quo smiae abundant*, f ibidem. Sunt *sesamoidea*, e, e, e, e, e figurae XXXVII. tabulae ejusdem. Velis, quaeſo, ea considerare, cum iisque conferre, quae ex opusculis anatomicis addidi: invenies, quae in his descriptae verbis sunt observationes, expressas iis in tabulis esse.

Quum vero ejusmodi observationes reddere non posset,
nisi

nisi quaedam praeterea, quae ad institutum suum non pertineant, simul cum iis exprimeret; expressit ea, sed minus curiose. Sic, quum renum *magnitudinis & altitudinis* differentias in tabulae I. figura I. II. & III, quantum quidem ad renes pertineat, exhibere tantummodo vellet; nec posset, nisi eorum quoque figuras adderet; addidit, sed generatim, satis habens quandam eorum formam dedisse. Et quanquam forma diversos dedit, ut, si quis minutius ac scrupulosius examinare velit, multas fortasse in iis differentias observet; tamen non nisi generalem quandam formam, nihil aliud, nisi *magnitudinis & altitudinis* diversitatem ostendendi causa, proponere voluisse censendum est. Quo factum est, ut ab his renum formis renes in tabulis nuper repertis, in his iisdem, quas iis inseruit, iconibus, forma non mediocriter discrepent. Ni quis fortasse reperiatur, qui illis etiam differentis aliquid significare voluisse contendere velit; ad quas, quamvis nihil quicquam de iis vel in explicatione, vel in tractatione de renibus monuerit, pertinere tamen possint, quae in tractatione illa, capite xv, agens de *inconstanti vasorum emulgentium dispensatione*, scribit. Ubi nimirum, postquam, *quae & qualisnam sit haec varia arteriarum venarumque dispensatio, in depictis tabulis huic libello adjunctis, apertissime cerni posse* scripsit; addit haec, quae pertinere ad differentias illas renum possint; *si enim omnia, quae in illis unico intuitu cuivis sub oculos subjici possint, oratione declarare tentaret, non solum longitudine orationis fastidium exhibiturum, verum etiam multo difficilius id executurum ac praestiturum; perspicuum enim esse quanto rectius oculis, quam auribus haec noscantur & percipiantur.* Obstaret tamen, ni fallor, hoc, quod nullam talium differentiarum mentionem fecit, neque in explicatione, neque in tractatione de renibus, ubi de renum figura agit, capite tertio: quum aliquid saltem dicturus de iis fuisse videretur; hoc certe, ex tabulis cognosci eas posse. Vereor potius, ne plerisque videar in re minime dubia operam frustra insumsisse. Sed erat tamen faciendum, quoniam, quod de renibus attuli, id ad reliqua quoque pertinet, atque aliquo momento esse potest ad tabulas, quas nudas accepimus, intelligendas: in quibus illius generis multa clarissime video; alia non obscure videre mihi videor.

Quaedam praeterea non tam eorum, quam alius alicujus

rei ostendendae caussa exhibuisse videtur ; ut glandulas renibus incumbentes in figura II. & III. tabulae III. De quibus apparere videtur , eas , si non tantummodo , at potissimum tamen exhibuisse , ut exhiberet , in secunda quidem *venam quae in glandulam illam inferatur* ; in tertia *venam quae inferatur in illam glandulam* , & *unde postea ramus ad membranam pinguem egrediatur* : quae exhibere , nisi additis glandularum illarum figuris , ea perspicuitate non poterat. Et quamvis à superioribus magnitudine & forma differant ; & in tractatione de renibus , capite VI , postquam de *longitudine* glandularum illarum , & *latitudine* , & *crassitudine* dixerat , illa *omnia pro ratione suae figurae , quum ea una semper non sit , non minimum quoque variare cerni* tradat : tamen , quum de illis nihil moneat in explicatione hujus II. & III , ut monuit in explicatione tabulae I. & II ; etiam atque etiam suspicor , glandulas illas in his , de quibus dico , tabulae III. secunda & tertia , additas vasorum supradictorum caussa. Atque hoc ideo expendendum propono , ut illos , qui tabulas nuper repectas intelligere student , attentiores facerem ad talia quaedam in iis etiam suspicanda ; immo vèro , quod multa satis manifesta sunt , cognoscenda. Nonne enim sic in tabula nona speciem hominis ob hanc solummodo caussam adumbravit ; aut , si id fortasse malis , ob hanc potissimum , ut in aperto capite , pectore , ventre , contenta iis commonstraret ? Nonne in tabulae XLI. figura I. & III , capitis speciem , ob hoc , ut inscriptos exhiberet musculos ? Nonne in tabula XIX. XX. XXI. XXIII. musculos , ossa , alia , totamque adeo figuram adumbravit , non nisi nervorum exhibendorum caussa ? Nonne eodem modo in tabula XXII. XXIV. XXVI. caussa venarum & arteriarum ? & in XXV. si non omnia , at pleraque tamen omnia ? Nonne in musculorum tabulis (paucis fortasse exceptis , ut figura XIII. tabulae XLI.) ossa , partes externas , & quaedam alia , caussa musculorum ? Mitto caetera ejus generis. Idemque sine dubio institutum in aliis quoque tenuit , in quibus ita apertum manifestumque non est. Certe argumenta ad probandum plurima certissimaque sumi ex ipso possunt : quorum aliqua in medio proponenda sunt. Sic nempe in tabula I. & III , & in secundae figura III , & in quartae quinta , dedit quidem figuram portionis venae cavae ; non autem , puto , ejus caussa. Sed , quum vellet venarum , quae

quae emulgentes vulgo appellari solent, ortum à cava exhibere; quum aliarum quoque venularum; non potuit, quin cavae portionem tantam, quanta ad propositum illud necessaria erat, adderet: eamque adeo sua in explicatione tantummodo indicat. Itaque etiam venam cavam in figura I. & II. tabulae II. longiorem à superiore parte exhibuit, quam in aliis confimilibus: indicaturus scilicet *ortum in prima venae à cava juxta hepar originem ducentis*, quae *partim dextrae glandulae reni incumbentis corpus perforat, partim superficiem ejusdem perreptat*; in secunda, *venae à cava parum sub hepate ortae*, quae *dextri renis glandulam perforat*. Anne igitur eadem mente in figura III. tabulae XXVII. cavam cum subclaviis addidit, non earum, sed venularum, quae ab iis oriuntur, ostendendarum gratia? Cujus quidem rei necessarium esse non videtur exempla plura addere, quod in oculis incurrunt per se.

Quin etiam non pauca sunt, quae addidit, non quia exhibere illa voluerit, aut proposita ratio ita postulaverit; sed quia ad illas partes, quas exhibere necessarium erat, ita pertinent, ut praetermitti aegre possint. Colligere hoc institutum ex ipso haud obscure videmur posse, quum in explicatione figurae VI. tabulae VIII, postquam, quae volebat, indicaverat, addit haec: *caetera, quae in hac figura continentur, ad praesentem translationem non pertinent*. Idemque etiam apparet ex re ipsa. Sic quum in figura I. tabulae I. portio aortae & cavae exhibenda esset, simul cum iis radices arteriarum spermaticarum, mesentericaeque inferioris, ac venae spermaticae dextrae exhibuit, non aliam ob causam, nisi quod omittere eas vix poterat, quum aortae & cavae portiones illas exhiberet, à quibus emittuntur: quapropter in explicatione radices illas tantummodo indicavit. Idem animadvertere licet in figura I. & III. tabulae II. Eadem ratione in figura secunda tabulae secundae exhibuit radices arteriarum spermaticarum, ac mesentericae inferioris. Quae quum videamus, anne igitur idem censendum est de tot radicibus similibus arteriarum, venarum, nervorum, quae exstant in tabulis nuper repertis? & ni fortasse de omnibus, anne saltem de permultis? Confirmare illud magis poterit ipsius explicatio figurae I. II. & III. tabulae IV, & quinque primarum tabulae VII: in qua quasdam ejusmodi radicum tantummodo quoque indicat; plerasque, quamvis exhibuerit, silentio praeterit.

B

In-

Invenio praeterea quaedam exhibuisse, quae neque ad institutum suum pertineant, neque ad partes illas, quas exhibere necesse habuit, quamvis pertineant, ita tamen pertineant, quin omittere facile potuisset. Ut potuisset ureterem in tabulae I. figuris, & in quinta tabulae IV. Quum enim in iis, ut instituto suo satisfaceret, renum quidem figurae necessariae essent, nihil autem figuris opus esset ureterum; potuisset integros ab illa parte renes, praetermissis nihil ad institutum suum pertinentibus ureteribus, exprimere: sicuti praetermisit in tabula XXV, & in figura IV. tabulae XII, quae est ipsa quinta tabulae IV, in qua addidit.

At contra multa, quae videri possint praetermittenda non fuisse, praetermisit tamen, eo quod ad rem suam non pertineant. In figura II. tabulae I, & in secunda tertiae, praetermisit arteriam mesentericam inferiorem. In figura V. tabulae IV. praeter mesentericam illam, etiam utramque spermaticam, itemque venam spermaticam dextram. Significare autem eo voluisse putandum non est, incidisse se in corpora, in quibus revera defuerint: nam profecto de re tam rara admonuisset. Neque putandum praetermisisse per errorem, quem emendaverit in tabulae XII. figura III. XII. IV, quae respondent supradictis. Quis enim errasse in re tam nota, tam obvia, facile sibi persuadeat? Praetermisit haud dubie in tabula I. III. IV, quod nihil ad rem suam attinebant. Addidit in tabula XII, fortasse quod, quamvis ad rem suam nihil attinerent, melius tamen est simul cum aorta & cava exhibere; & fortasse quoniam primum erat addere. Credasque non ita magnopere ad haec fuisse attentum. Eadem ratio praetermissae arteriae coeliacae, & mesentericae superioris, in figura I. II. & III. tabulae I, & in figura III. tabulae II, & in figura I. II. & III. tabulae III, & in figura V. tabulae IV. At in figura I. tabulae II, quum arteria diaphragmatica sinistra exhibenda esset; coeliacam, & mesentericam superiorem, fortasse quod proximae diaphragmaticae illi sunt, addidit. Talia autem etiam in tabulis nuper reperiuntur. Nam, ne dicam de tabulae XII. figura I. III. VII. IX. XII. X. IV, (quae sunt I. II. III. tabulae I, I. II. III. tabulae III, V. tabulae IV.) in quibus arteria coeliaca, & mesenterica superior, similiter praeteritae; in tabula XIII. praeterita coeliaca cum mesenterica utraque. In zygo-

gomate figurae I. & III. tabulae XLI, & in tabulis aliis, praeterita futura.

Juvabit autem, & proderit, eorum, quae dixi, exemplum in una eademque icone subjicere, simulque expendere Eustachii in ea propositum, ac rationem. Ad quod idonea erit prima tabulae I. In ea, ut ex ipsius explicatione cognoscimus, exhibere voluit de renibus primum haec: *dextrum majorem; quam sinistrum; parte superiore utrumque aequalem fere altitudinem habentem; sinistrum tamen nonnihil dextro elatiorem; inferiore dextrum sinistro humiliorem, quod eveniat propter magnitudinem; cujus causa sinister altior dextro dici possit.* De glandulis renibus incumbentibus haec: *forma, figura, & substantia renibus respondere: dextram majorem, quam sinistram.* De venis emulgentibus haec: *dextram humiliorem, brevior, & magis obliquam, quam sinistram: itaque sinistram altius ortam; longiorem, & minus obliquam, quam dextram.* De quatuor aliis venis haec: *venulam ortam à dextra parte cavae venae supra emulgentem, & in pinguem dextri renis membranam distributam. Venulam vel à cava, vel à suprema parte emulgentis dextrae ortum ducentem; quae partim in septum transversum, partim in glandulam reni dextro incumbentem, partim in supernam regionem substantiae renis distribuitur. Venulam à superiori latere sinistrae emulgentis venae in medio ductu natam; quae distribuitur partim in septum transversum; partim in glandulam reni sinistro incumbentem; partim in superiorem regionem pinguis tunicae renis. Venulam originem ducentem à superiori latere emulgentis sinistrae juxta renem, disseminatam in inferiorem partem pinguis tunicae ejusdem.* Denique voluit *venae seminariae sinistrae ortum ab emulgente.* Atque illa etiam omnia plane expressa videmus. Exprimere autem nequivit, nisi simul & renum quandam speciem, & glandularum renibus incumbentium, & venarum exprimeret, eaque tum lineis extremis definir, tum lumine atque umbris sic satis distingueret: in quibus frustra aliquid praeterea quaeras, quum perfectam omni ex parte illarum partium speciem tradere non instituerit, sed tantummodo illas suas observationes; praeter quas de partibus illis nihil etiam addit in explicatione. Quum vero venas supradictas exhibere sine cava, quoniam ab ea oriuntur aliquae earum, non posset; addidit ejus portionem. Commodissime praeterea addidit arterias emulgentes, quoniam ad renes cum venis pertinent:

cum iisque aortae portionem, quoniam oriuntur ab ea, ca-
vae praeterea comitem. Et quum aortae cavaeque partem
illam, unde arteriae spermaticae, inferior mesenterii, & ve-
na spermatica dextra emittuntur, exhiberet; addidit radices
earum. Renibus ureteres addidit, quum ad eos pertineant.
Illae autem partes in icone quasi secundariae sunt, easque in
explicatione tantummodo indicavit, & nominavit. Quapro-
pter in quibusdam earum incuriosior esse potuit, & fuit.
Profecto arteriam inferiorem mesenterii minorem exhibuit,
quam alterutram spermaticam: ac sic quoque in figura I. ta-
bulae II, & in I. III. IV. tabulae XII. Quod neque per
errorem, neque data opera fecisse putamus: non per erro-
rem, quod errare tali in re tantopere non potuit: non data
opera, quod haud dubie admonuisset. Sed, puto, quod
parum aut attentus, aut curiosus fuit in re ad propositum
suum non pertinente: quemadmodum non aliam quoque ob
causam omittere hac in figura primam arteriam coeliacam, ac
mesentericam superiorem, potuit. Quam incuriosus autem
quibusdam in rebus fuerit, infra pluribus dicitur. Ex qui-
bus judicari potest, quam recte sibi ex tabulis ejus mensu-
ras capacitatis quarundam arteriarum, tanquam si accuratissi-
mae essent, viri docti assumerint: & maxime quum assum-
ferint arteriarum illarum, quae inter secundarias iconum par-
tes numerandae sunt. Atque haec de figura illa tabulae I,
ut exemplo eorum, quae supra dixi. Ad cujus similitudinem
& rationem etiam reliquas, quae opusculis anatomicis addi-
tae, perfectas esse, facile ex iis intelligitur. Idemque insti-
tutum in tabulis nuper repertis haud obscure, nisi vehemen-
ter fallor, apparet.

Sed ad eas penitus intelligendas indicanda est Eustachii in
concinnandis iconibus ratio, quae ex iis ipsis colligi satis
superque posse videtur. Eoque magis indicanda, quoniam
à communi anatomicorum discrepat. Quorum consuetudo
haec esse solet, ut, postquam partes in corpore demortui
detexerunt, earum figuram sic modo in tabula efficiant, aut
effici curent, ut tota similis illis sit, illudque plane, quoad
fieri possit, exhibeat, quod ante oculos positum est ad imi-
tandum; quemadmodum propositum exemplar pictores in to-
tum, ut propositum est, imitantur. Eustachius autem, ut
summatim dicam quod sentio, observationes ex corporibus
sum-

sumtas exhibuit cum ratione, simulque clare, simplici quodam modo, non nisi id, quod volebat, exprimente; absque ulla, quam pictores & scalptores vocant artem. Quae omnia singillatim illustrare, & probare conabor.

Exponi difficulter verbis, accipique, nisi additis exemplis, possunt. Rem plane ante oculos ponit figura III. tabulae XLI. Ad quam efficiendam, nequaquam oculis pictoris (non potuit enim) caput hominis proposuit tale, quale exhibet, ita maximam partem integrum, una tamen cum musculis aliquot tanquam in superficie exstantibus, interque eos etiam aliquibus, qui profundiore in parte faciei delitescent: verum capitis primum quandam figuram separatim effecit, eique deinde ex dissecto capite musculos, quos volebat, suis inscripsit locis. Ac sic quoque in tabula IX. figuram hominis effecit, eique ex inciso demortui corpore inscripsit tres ventres apertos, una cum iis, quae continent. Eadem ratione concinnavit musculorum tabulas primas, XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. & XXXII, adhibendo figuram hominis pro fundamento, & ad ejus normam ex corporibus describendo musculos, ligamenta, ossa: quod etiam dilucidius reddunt illarum figurarum manus, & pedes; utpote integram eorum formam exhibentes cum inscriptis musculis, & tendinibus. Ubi vero musculos exhibere voluit, qui magis ab exteriori corporis parte distant, sceletum potissimum ut fundamento usus est, atque ei illos, ut cui adjacent, inscripsit: ut tabula XXXIII. XXXVII. XXXVIII. XXXIX. figura I. In quibus tamen etiam faciei, & manuum, & pedum quaedam figurae, quibus musculos inscripsit, ossiumque lineamenta. Quin etiam sceletum solos in tabula XXXIV. & XXXV. inscripsit musculos exteriores: quos ita cum sceletum subjicere oculis pictoris nequivit. Et musculos quoque cranio ac syntaxi vertebrarum colli inscripsit in figura XLII. tabulae XLI. Ad nervorum venarumque atque arteriarum ramos, quos subcutaneos appellant, exhibendos, figuram hominis pro fundamento adhibuit, ejusque ad normam in tabula XXI. XXII. XXIII. per corporis circumferentiam musculos, ossium quasdam partes, aliaque, quae statim sub integumentis communibus posita sunt, descripsit; majoremque etiam partem retinuit pedum & manuum formam: atque illis figuris inscripsit nervos, venas, arterias. Ex quo intelligi quoque ratio potest, qua

usus esse videtur in tabula XIX. XX. XXIV. XXV. XXVI. In tabula XIII. vasa inscripsit reni, utero, vaginae, vesicae. Ad encephalum spinamque dorfi retulit nervos in tabulae XVIIII. figura II: ad encephalum in figura I. III. IV. V. Atque haec exempla plus etiam satis ostendunt, quomodo cum ratione & iudicio composuerit.

Quin etiam simpliciores alias, in quibus partes partibus inscriptae non sunt; ita cum ratione effinxit. Ita plerasque omnes tabulae XXVII: de cujus prima & tertia decima hic tantummodo dicam, quoniam dicere de omnibus longum est, neque necessarium. In prima igitur vasa jecoris, in tertia decima pulmonum, tum ex iis, quae anatomica dissectio ostendebat, tum ex iis, quae cognitio docebat, cum ratione effinxit; & ita quidem, ut in hac figuram pulmonum, in illa jecoris, referant. Ita & concinnare potuit eximias illas nervorum tabulae decimae & octavae; quas tales, quales in tabula exstant, ante oculos positas delineatori fuisse, nemo, puto, in re anatomica, concinnandisque iconibus, vel medio-criter exercitatus, opinabitur.

Neque temere, sed ratione & consilio egisse, id apparet etiam ex eo, quod inter icones aliae aliis respondent, & aliae quoque continuationes sunt aliarum. Quod postquam animadverti, multum adjumenti accessit ad tabulas intelligendas: eamque ob causam operae pretium est ostendere. Et primum ostendam in illis, quae vel me non monente in oculos facile incurrere possunt. Sic tabula XXX. & XXXI. sunt altera alterius pars adversa. Sic XLIII. & XLIV. Sic tabulae XLVII. figura XXVI. & XXVII: itemque XXVIII. & XXIX: itemque XXX. & XXXI: itemque XXV. & XXXII: itemque XXXIII. & XXXVI: denique XXXIV. & XXXV. Sic tabula XXI. & XXIII. Sic tabulae XI. figura VIIII. & IX. Sic tabulae XVI. figura I. & II. Sic tabulae XII. figura II. & V. Sic fere figura I. & III. tabulae XV. Sic maximam partem tabula XXIX. & XXXII. Magnam partem tabula XXXVII. & XXXVIII. Maximam partem XIX. & XX. Generaliter XXIV. & XXVI. Similiter tabulae X. figura I. & III.

Sunt deinde, quae respondent positi: ut musculorum prima primae sceleti, hoc est, vigesima & octava quadragesimae tertiae. Sic maximam partem trigesima quarta vigesimae nonae. Sic trigesima quinta trigesimae secundae. Sic je-

jecori figurae III. tabulae XI. vasa jecoris figurae I. tabulae XXVII. Sic mesenterio figurae II. tabulae XI. generaliter respondent vasa mesenterii figurae II. & IV. tabulae XXVII.

Quaedam praeterea serie quadam quasi continuatae sunt. Ut sunt quatuor primae tabulae XV: quarum series haec, I. IV. II. V. Sic ejusdem tabulae tertia & sexta. Sic III. IV. V. tabulae XVII. Sic II. III. IV. tabulae XXXIX. Sic II. III. IV. V. VI. VII. tabulae XL: & VIII. IX. X. XI. XII. Sic I. & III. tabulae XLI: & VIII. & XI. Sic IV. & VI. tabulae XLII. Sic III. VI. VII. VIII. tabulae XLVII. Sic, quantum ad partes inferiores, I. & III. tabulae XII.

Est quoque separatim vasorum & nervorum quaedam ex aliis in aliis continuatio. Est primum manifesta in circumferentia earum: ut figurae I. & II. tabulae XVI: ut tabulae XXI. & XXIII. Deinde etiam minus primo intuitu manifesta: at ubi expendis, evidens, & artificiosa. Sic arteriae jecoris figurae II. & IV. tabulae XXVII. continuatio in figura I. per jecur est, cistamque fellis: itemque venae portarum. Sic, si examinare velis, in figura II. & VIII. tabulae XL. invenies continuationes vasorum choroidis ex postica parte in priorem, & ex priori in posteriorem; & ita quidem, quemadmodum plene exhibitum est in figura XI. Sic nervus spinalis recurrens tabulae XX. n°. II. a, continuatio est nervi ejusdem tabulae XIX. n°. II. f. Et nervus, cui S in dextro crure inscripsi tabula XXI. n°. II. continuatio est illius, cui 12. tabula XIX. n°. II. Sic vena h, & vena & arteria k tabulae XXIV. n°. II. sunt continuationes, illa venae a tabulae XXV. n°. II; haec, venae & arteriae z tabulae ejusdem. Sic venae & arteriae μ : μ tabulae XXIV. n°. II. sunt venarum & arteriarum τ : τ tabulae XXVI. n°. II. Mitto caetera ejus generis, quae annotavi in explicatione tabulae XIX. XX. XXI. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XL.

Multa etiam inveniuntur, quae non plane de integro effinxit; certe non videtur effinxisse, sed ex aliis iconibus in alias transtulisse. Quemadmodum ex prima sceleti, quae tabula XLIII. continetur, haud dubie in XXXIII. transtulit thoracem cum claviculis, aliaque. Ac sic pleraque sceleti ex tabulae XLIV. figura I. in tabulam XXXIV. Multa ex tabulae XLIII. figura I. in tabulam XXXV. Similiterque in aliis.

liis. Sic uteri & vaginae icones duae, altera tabulae xiv. figurae ii, altera tabulae xiiii, satis similes sunt inter se, ut videri possit altera in alteram tabulam translata. Sic pulmonum in tabulae xv. figura iii. & vi. Sic uterus, tubae Falloppianae, vasa spermatica, ligamenta uteri rotunda cum vasis suis, figurae i. tabulae xiv. majorem partem sumpta esse videntur ex tabula xiiii. Sic cor cum auricula dextra, vasisque, figurae ii. tabulae xv. satis respondent figurae i. tabulae xvi. Sic portio cordis, cavae inferioris, venae coronariae majoris, figurae vi. tabulae xv. respondent figurae ii. tabulae xvi. Cor cum aure dextra & vasis suis tabulae xxv. respondet figurae i. tabulae xvi, & figurae ii. tabulae xv.

Jam vero illud, quod dixi, expressisse omnia simplici quodam modo, nulla, quam pictores & scalptores laudent, arte; illud, inquam, ex ipsis constat tabulis. Itaque etiam peritiorem artis, & qui artem tantummodo spectabat, neminem adhuc unum offendi, qui eas laudaret. Mirari potius omnes, in tanto apud nos honore esse, quum habeamus Vesalianas, insigni adeo artis praestantia ad omnem memoriam commendatas. Sordere prae Bidlonianis, quae illa tam speciosa, & pictoris Lairessii propria luminis atque umbrarum gratia & dignitate, intuentes alliceant. At audivimus tamen homines imperitos, artisque pictoriae rudes ignarosque, aut quos occaecaverat quam de Eustachio conceperant opinionem; audivimus alios laudantes linearum extremarum, quibus descriptae partes sunt, pulchritudinem; alios luminis atque umbrarum nescio quam praestantiam; alios scalpturae elegantiam. Profecto neque accuratam artificiosamque partium symmetriam, & formam; neque linearum extremarum dignitatem, aut elegantiam; neque luminis, umbrarumque artem quandam; neque naturae ipsius subtilem imitationem; neque omnino quicquam eorum, quae ars habet inprimis laudabilia, in iis videmus. Atque ita sane non videmus, ut eorum omnium nihil non modo non affectasse, sed ne curasse quidem videatur: qui alioquin commissurus non fuisset, ut, quum tam severus & gravis Vesalii cenfor fuerit, icones efficeret, & eas quidem haud dubie magnam partem contra Vesalium, quae, quod ad artis laudes attineat, cum Vesalianis nullo modo sint comparandae. Satis habens,

bens, observationes anatomicas veras & certas simpliciter exprimere, plus artis, quam ad id satis perspicue exequendum requirebatur, non adhibuit; cum Vesalio; cumque posterioribus, non de palma artis, quibus observationes anatomicae exprimantur, contendens, sed ipsis certans observationibus. Et certe si alterutro est carendum, id est, aut rerum, quae exhibeantur, veritate ac perspicuitate, aut arte qua exhibeantur; carendum potius arte: quippe quum icones praesertim propter res, non propter artem, expetamus. Quocirca Eustachii hae, in quibus res exquisitae, ars nulla, multo hercle laudabiliores sunt aliis aliorum, quae arte quidem superiores, inferiores autem rebus illis, quae ad anatomen pertinent. Quanquam tamen illas inprimis laudare non vereor, quibus res & vere accurateque ac perspicue exprimantur, & simul quanta maxime possit arte.

Quum vero Eustachii pleraeque impolitae sint, rudiores in primis plerumque modo expressae res illae, quas aliarum causa exhibuit; ut multae etiam ex eo haud ita aegre internoscantur. Rudior figura hominis tabulae IX. Rudis figura capitis figurae I. III. V. VIII. XI. tabulae XLI. Rudis ossium in pedibus extremis tabulae XXXIII. XIX. XXV, & in manibus tabulae XXIV. Rudis multorum muscutorum in tabula XIX. XX. XXV. XXVI, aliis. Intervalla inter musculos, partesque alias, ita saepe rudia, ut nihil nisi intervalla significant: exemplo sit tabula XXVIII. Atque ex his quaedam etiam plane incuriose indicata, ut nisi hoc attendas, aut obscurissimus videatur, aut falsus. Sic in tabula XXVIII. ossa tibiae pedesque extremos non distinxit. In tabula XXI. ab extensore longo digitorum pedis dextri tendines nulli per pedem extremum: neque in tabula XXIII. ab extensore communi digitorum, proprioque auricularis, per manum dextram. Cujusmodi sane multa passim occurrunt.

At quam plane tamen perspicueque res illas, quas in primis volebat, expresserit, ex iis tabulis, quarum explicatio ab ipso relicta in manus nostras pervenit, habemus cognitum: in quibus illa, quae indicat in explicatione, tam evidenter apparent, ut nihil possit supra: quorum exempla in principio attuli. Ex quo colligi satis potest, non minus perspicue in tabulis nuper repertis animi sui sensus expressisse: praeterquam quod loca, ex opusculis anatomicis supra allata,

D

qui-

quibus aliquot rerum interpretatio continetur, id tam manifeste confirmet.

Jam porro animadvertimus, sumsisse Eustachium icones suas ex hominibus junioribus. Quod ne dubitare possimus, magno, ni fallor, argumento est sternum sceleti tabulae XLIII, è partibus nimirum sex constans: cujusmodi est juniorum. Atque ejusmodi se invenisse in hominibus, qui ad quartum decimum, aut decimum octavum annum usque vixerant, tradere in examine ossium videtur. In quo primum docet, puerulorum sternum in prima generatione totum cartilagineum esse: ubi autem in os formari incipiat, natas in eo osseas partes cartilagine undique comprehensas, quasi plurium in tabula nodorum speciem prae se ferre: ac tandem ad summum sex tantum particulas, transversa linea à costarum cartilaginibus protracta, sternum incisus obtinere, quibus adnumeret etiam illam, quae mucronatae cartilagini sit praeposita. Ac paulo post subjicit, illud ita se habere in publico gymnasio se ostendisse, multis sternis ante oculos omnium positis, non solum puerulorum, sed etiam illorum, qui ad quartum decimum, ac decimum octavum annum usque vixerant. Itaque ad summum sex tales particulas obtinere, ultimumque terminum aetatis eorum, in quibus ostenderit, annum memorare quartum decimum, ac decimum octavum: eoque ea aetate sex obtinere, indicare credibile est. Sternum autem sceleti tabulae XLIII. è particulis talibus, quales illa aetate sint, sex constat: ut eum etiam aetatis illius esse indicetur. Praeterea non ita multo post in ossium illo examine tradit, de numero ossium sterni in adultis pauca addere oportere, esseque varium, & modo quatuor, modo tria eorum apparere: ex quo concludi posse videtur, sceletum illum tabulae XLIII, in quo particulas sex exhibet, ad adulti, quam vocat, aetatem nondum pervenisse. Adde quod in adultioribus tria inveniri soleant. Epiphyses praeterea, quas in ossium figuris distinxit, eorum aetatem juniorem declarant, hoc est, illam, qua, quamvis ad plenum quidem magnitudinis suae maxime incrementum, nondum tamen ad plenam pervenerint perfectionem. Quin etiam tota ossium figura juniorum ossibus similior est. Vides & os multiforme figurae XIV. tabulae XLVI. in tria divisum esse, ut est in juniore. Ni quis eo divisionem illam ostendi velit, quae aetate juniore animadvertitur: sed tamen multiforme
figurae

figuræ XII. ejusdem magnitudinis, ejusdemque etiam generaliter formæ est, idemque integrum. Jam vero sceletos quoque illos, quibus muscoli appositi, juniorum hominum esse, ex divisione sterni, epiphysibus, habitu, judicamus; eoque etiam appositos iis musculos. Idemque illud ex ipsa musculorum figura haud obscure colligimus. Viscera quoque juniorem ætatem referunt. Figura IV. tabulæ XI. junioris jecur, quam adulti, magis refert. Juniori maxime similis ventriculus figuræ I. & III. tabulæ X. Caetera prætereo. Ipseque de venis, quas exhibuit figura III. tabulæ XXVII, in tractatu de vena lineæ pari tradit, *in puerulis non modo ejusmodi vasa, sed & alia multa, quemadmodum mesenterii*, quæ exhibuit figura II. & IV. tabulæ XXVII, *clarius, quam in adultis cerni.*

Nec prætereundum, non pauca exhibuisse, quæ semper non invenerit: ne quis existimet, omnia, quaecunque exhibuit, in omnibus talia esse voluisse, qualia exhibuit. Inter ea sunt etiam rara inventu: sunt rarissima. Ita in tabulis parvis passim fecisse videmus. Ita etiam fecit in nuper repertis: in quibus aliqua ipso interprete cognoscimus, & non modo ex parvis tabulis, ut in tabulam XII, translata, sed etiam alia. Cujus generis in tabula XXVI. venæ sunt vertebrales; quarum *major (pp) sextæ vertebrae colli foramen penetrat, minor (o) vero septimæ*: quo pertinere locus potest, quem explicationi ex ossium examine addidi. Est quoque *venæ humerariæ vices gerens*, I figuræ VIII. tabulæ XXVII: quam describit in tractatulo de vena communi profunda brachii. Est *vena humeraria, quæ ita exilis quandoque occurrit, ut nisi animum una cum oculis diligenter advertisset, se prorsus effugisset*, g, ut videtur, figuræ IX. tabulæ XXVII: quam describit in eodem mododicto tractatulo. Est deficiens *sutura, quæ sagittam imitatur*, d figuræ III. tabulæ XLVI: de quo in examine ossium. Est *os, quod A litteram imitatur, gemina sutura circumscriptum*, ccd figuræ VIII. tabulæ XLVI: de quo in eodem ossium examine. Sunt ossis hyoïdis *additamenta, quæ cum apophysibus styloideis conjunguntur*, figuræ XIV. & XV. tabulæ XLVII: de quo in examine eodem. Sunt, de quibus in eodem, sterna figuræ XVIII. XIX. XX. XXI. tabulæ XLVII. Alia quoque nonnulla, de quibus nihil Eustachius, attuli in explicatione.

Et exhibuit quoque, de quibus ipse ossium in examine scripsit, *miraculum se videre existimaturum, si quis sibi ostenderet.* Id nempe existimaturum se scripsit, *si quis calvariam sibi ostenderet, in qua (puta ob capitis eminentias depravatas) aut coronaria futura, aut ea, quae Δ literae similis est, deficeret, aut illam inveniret, in qua utrisque his deletis, duae lineae, altera secundum capitis longitudinem, altera secundum aures protracta, instar X calvariam interfecant:* quam appellat *commentitiam calvariae fabricam, quam (qui nempe Hippocratem & Galenum sedulo reprehendere studeant) similiter atque veteres anatomici, salute describant.* Et tamen exhibuit figura x. xv. & xvii. tabulae xlvii, quae respondent Vesalii ii. iii. iv. capitis v. libri i. de humani corporis fabrica. Ad quarum haud dubie exemplum exhibuit, non quod videatur tales calvarias vidisse; sed, puto, illustrandae descriptionis suae, ac controversiae illius causa. Praeterea ex Vesalio in suas transtulisse videtur figuram iii. tabulae xlii.

Praeterea ad ea, quae juvare nos posse ad sensum Eustachii cognoscendum dixi, hoc etiam adjungendum est, multa procul dubio tabulis ejus contineri, de quibus veteribus cum sui temporis recentioribus controversia erat; multa praesertim, quae spectent illa, de quibus à Galeno Vesalius dissentit; & multa quidem contra Vesalium; multa quoque, quae ipse dicturus esset non animadversa fuisse ab aliis, aut non descripta, non picta. Cujus existimandi copiam dare non modo ille ejus animus, quo opuscula sua conscripsit, potest, sed certius etiam argumentum praebere explicatio tabularum, quae cum opusculis illis existant. Partim Pinus quoque confirmat: *Bartholum, procacem fastum, & dicta refellere impudentis Vessali, methodum docentem notandi quaque in particula situm, figuram, structuram, numerum, ordinem, atque nexum.*

Quorundam denique interpretationem invenimus in opusculis anatomicis. Atque utinam inveniremus in iis plura, quae ad has tabulas pertinere possint, ad obscuriora praesertim earum loca! Sunt certe, quae quis non facile intelligat, nisi ipso interpretante Eustachio, aut certe adjuvante. Sic haud scio, an ita promte intellexissemus figuram xi. & imprimis viii. tabulae xxvii, nisi explicuisset ipse. Lan-
ci-

cisium undecima diu incertum, dubiumque detinuit, donec forte fortuna in syntagma de vena, quae azygos dicitur, incidere, & ex antigrammate XII. perspicuum lumen ad obscuram hanc rem illustrandam acceperit. Octava, etsi haud abfimile quiddam in homine semel inveneram, detinuit me, donec animadverterim clarissimum locum in tractatulo de vena comuni profunda brachii.

Nunc, quum jam satis dixisse mihi videar de iis, quae ad intelligendas tabulas utilia sint, ac necessaria, tempus erit de iis dicere, quae praestiterim, aut potius, quae praestare conatus sim.

Breviter summamque quid quaeque res sit tradidi. Non addidi descriptionem pleniorē, quod aut describenda fuissent, quae manifeste apparent, ut magnitudo, figura, situs, connexio, caetera ejusmodi; aut addenda, quae non apparent. Quorum illud supervacaneum visum est, eo quod nihil attineat verbis declarare illa, quae diligentior quis ex rerum figuris ipsis facile cognoscat. Immo si omnia, quae in tabulis unico intuitu cuius sub oculos subjici possunt, oratione declarare tentarem; non solum longitudine orationis fastidium exhiberem, verum etiam multo difficilius id exequerer ac praestarem; perspicuum enim est quanto rectius oculis, quam auribus haec noscantur & percipiantur: ipsius Eustachii verba haec sunt, ex capite xv. tractationis de renibus descripta. At, dicas, ille tamen ipse in explicatione illarum ipsarum tabularum, de quibus illa profert, alia quidem simpliciter indicat, alia autem describit plenius; & plenius quidem illa, quorum in primis causa confecit. Certe. Imitari autem non potui; non quidem ita, ut cuperem, ut deberem, ut praevit. Quod sane fateri non erubesco, si modo fatendum est, neminem unquam inventum iri, qui ita interpretetur, ut interpretaturus fuisset ipse. Profecto, etsi res ipsas, quae exhibitae sunt, intelligere fortasse plerasque possumus, & in multis quoque propositum satis videmur assequi; nulla tamen ita illud plane assequendi spes est, quin aut aliqua, aut etiam multa superesse dubitatio plerumque possit, volueritne, quod putemus, nec ne. Apparet hoc ex tabulis, quae opusculis anatomicis additae: quas qui seposita, & nihil quicquam juvante Eustachii explicatione, suo Marte explanare aggrediretur; fieri aliter non posse intelligeret, quin ab ejus pro-

E

po-

posito passim discreparet. Et si conari tale quid ad ejus mentem voluisssem; plenius fortasse descripturus fuisssem, quae ipse simpliciter indicaturus; ipse quae descripturus, simpliciter indicaturus ego. Et si qua etiam eorum, quae descripturus fuisset, descriptuisssem; casu tantummodo factum fuisset, si id satis ad mentem ejus fecissem. Ac multo etiam minus addere volui, quae in tabulis non apparent, quamvis potuisssem multa, atque Eustachius etiam praeciverit in explicatione tabularum parvarum; qui in sua figurae v. tabulae iv. ureteris addidit originem, & quaedam de vasis renis inferioris, quae non exstant in ea. Quae quum ita sint, hoc unum mihi, certiora tradere quam maxime cupienti, superesse credidi, ut res, quae apparent, simpliciter indicarem: nisi quod pauca quaedam adjecerim, quae ut aliquae melius intelligerentur, praeterire commodè non potui. Satis mihi sit, hunc tantum tabularum thesaurum ad usus anatomes amatorum & cultorum quodam modo accommodasse, quo frui eo interea, dum aliquis ab Eustachio relictus commentarius (si quis modo alicubi) latebit, sic satis possint.

At fortasse satis omnium expectationi à me factum non erit, eo quod, quid quaeque in tabulis expressa res sit, proposuerim quidem; oportuisset autem praeterea, quare illud esse censendum sit, ostendere. Quod sane ostendere si instituissem; quam non mihi modo operosam & taedii plenam rem aggressurus fuisssem, sed etiam quam parum necessariam, quum multa satis manifesta per se sint, & pleraque etiam alia anatome ipsa ostendat, confirmet. Ubi tamen scrupulus aliquis residere visus est, subjeci rationes quasdam interpretationis meae: & studiosius quidem, ubi in rebus non omnino manifestis dissentiendum mihi fuit à viris gravibus. In antecessum autem, quae fortasse objicientur, quis mortalium diluat? Potui alicubi falli, ut humanus: potui, quod vehementer occupatis temporibus meis haec congesti, quod multa perdifficilia fuerunt. Hoc tamen scio; hoc ne quis dubitare velit rogo; dedisse me saltem operam, ne quid temere inconsiderateque affirmarem. Utinam modo ita omnia recte & ad veritatem interpretatus sim, ut nihil praetermisi, quantum eniti potui, quin quid sint perspicerem!

Quoniam perpetuum indicem tradere susceperam, non potui

tui quin multa in eo notarem; quae minime obscura sunt; multa, quae videri possint non egere interprete; multa, quae momentum non habere. Neque tamen diligentia nimis scrupulosa indicavi omnia, quaecunque expressa apparent: cujusmodi quidem indicem jam fere confeceram, quum, ecce, poeniruit facti, mutatoque consilio, rescidi plurima, ne inutilibus notis tabulas obscurarem, explicationemque praeter omnem necessitatem interromperem. Et an operae quidem pretium fuisset indicare ad rem non pertinentia, eademque notissima? ut partes exteriores corporis in tabula ix, aliisque. An, indicare manifesta omnibus? ut intestini coli quas vocant cellulas, in figura ii. iv. v. tabulae x: ut intestinis similem cerebri speciem quandam in tabula ix. xvii. xviii. Et praesertim, si qua ex illo genere rudia sint? ut columnas carneas in corde, ejusque auriculis, tabulae xvi. An quicquam, quaeso, exposuisse juvaret, quae nihil, ut videtur, significant? ut intervalla inter musculos, partesve alias. An, exposuisse rudia quaedam, in quibus momentum esse non visum? An denique quae etiam magis elaborata, sed ex aliis tabulis translata, ex iis certe facile cognoscenda, exponere necessarium erat? ut sceleri partes tabulae xxxiv. xxxv. xxxvi. xxxvii. xxxviii. xxxix. Quorum, si quid Eustachii ingenium perspicio; si quid ex eo, quod in tabulis, quae opusculis anatomicis additae, praestitit, judicare valeo; ipse fortasse rationem habiturus non fuisset. At ignoramus, inquis, anne fortasse habiturus fuisset. Et in summa, si quid modo utilitatis asferre possunt, digna sunt, ad quae animum attendamus: possunt autem, vel si aliquid modo juvare possunt ad intelligendum paulo plenius. Atque idcirco addidi etiam illius generis non pauca, &, ut videtur, plus etiam satis. Caeterum adeo non quaesivi illam non jam scrupulosam, sed supervacuum accuratorem, ut, nisi in mentem venisset, posse eam fortasse aliquos juvare, longe etiam magis evitarem. Quae vero ex illo genere praeterii, vix morabuntur, puto, illos, qui paulo attentius & tabulas considerabunt, & explicationem expendent meam.

Et quaedam fortasse non merebantur operam, quam impendi. Profecto quum multa difficilia fuerint, perdifficilia simul & permolesta fuerunt, in quibus rudior figura obscuritatem peperit, aut dubitationem. In tabula xix. xx.

xxi. xxii. xxiii. xxiv. xxv. xxvi. musculorum aliqui ex figura, qui sint, non satis apparet; sed fere ex loco possumus suspicari. Aliorum non figura, sed potius locus, aut eorum loco spatia inter musculos, partesve alias, indicata videntur. Fieri itaque illis in locis potuit, ut, quo plenius explicarem, musculos esse dixerim, ubi locum tantummodo eorum adumbraverit. Quare obscuris & rudibus illis in locis, in quibus parum curiosus fuit, & quorum fortasse, si explicaret ipse, mentionem non faceret; in iis de eo, quod videatur, quod suspicer, intelligi velim potius, quam de eo, quod manifestum sit.

Sunt quaedam, quae dubitanter interpretatus sum. Per pauca, de quibus ne quidem conjecturam vel suspicionem ausus sum proponere. Tales sunt figura v. vi. vii. tabulae xi. Tales fuissent renes sinistri figurae iv. tabulae xii, nisi exposuisset ipse in explicatione figurae v. tabulae iv. Et si cui forte fortuna simile quid obvenisset, ni totum toti simile fuisset, multa superfuisset dubitatio. Cujusmodi, respondens quidem, sed tamen discrepans, Bauhinus theatri anatomici libri i. capite xxii. memorat, & figura i. tabulae xxiv. libri illius exhibet.

Ex varietatibus dissimilitudinibusque aliquas, quae notabiliores visae sunt, indicavi. Insunt fortasse plures: sed malui vitare conjecturas nimis incertas.

Quaecunque in reliquis Eustachii operibus invenire potui, quae ad tabulas pertinere, aut ad eas illustrandas pertinere posse arbitratus sum; ea indici illarum partium, ad quas pertineant, ipsis ejus verbis adjeci.

Eustachii cum aliis anatomicis, & potissimum cum Vesalio controversias, ubi fortasse eas in tabulis spectaverit, ne attigi quidem; partim quoniam, quicquid dici de iis posset, fere tantummodo conjecturis niteretur; partim quod impetrare à me non potui, ut tantum eriperem temporis ex utilioribus occupationibus meis, quanti illud indigeret. Et quamvis tale quid non injucundum sit earum rerum amatoribus, fortasse tamen utilius, quam nostris, Eustachii esse potuit temporibus, quum Vesalii libri omnium manibus maxime tererentur.

Neque, quacnam Eustachius eorum, quae exhibuit, aut primus ante omnes invenerit, exhibueritve; aut quacnam, &
quan-

quantum ea perfecerit, disquirere per otium licuit; neque addere alia, quae addi potuissent. Sed quid apologiam scribo? Explicationem in modum indicis fere nudi promittere utique potui: promisi: promisso, quantum in me fuit, satisfeci.

Quum vero compertum haberem, Eustachii rationem, qua in designandis iis, quae expressa sunt, usus est, utcunque alioquin non improbandam, vitiis laborare, quibus fiat, ut minus ad usum commoda sit; & assiduas etiam querelas audiverim de difficultatibus, quibus utentes impedit; idcirco nolui declinare laborem lineares tabulas efficiendi, iisque notas necessarias inscribendi, eo modo, quo feci alias.

Nec potui, quin tabulas ipsas, denuo descriptas, adderem, ut simul cum explicatione ad manum essent. Neque enim aliam ob causam addidi: quippe quum omnis laus & commendatio in eo consistat, ut Romae primum editis quam simillimae sint. Potuisssem tamen certe melius ponere tantum operae temporisque, quantum in eo consumendum mihi fuit; quum praeterea res sit, in qua si quid erraveris, vix ulla venia; si recte feceris, exigua laus proposita sit. Ut tamen archetypis iis rebus, quae visae mihi sunt alicujus momenti esse, responderent, operam, quantum potui, dedi. Et si ab iis lineolis & punctis, quibus umbrae exprimuntur, aliisque rebus, quae sive hoc, sive illo modo expressae sint, parvi aut nihil refert, aliquantum discrepent; quamvis maluisssem totas totis similes effici potuisse, nec culpa factum sit mea, ita similes non esse; tamen non ita, opinor, discrepant, ut in rebus ipsis aliqua sit differentia, quae momentum habeat. Itaque ad eos usus, ad quos addidi, satis idoneae esse poterunt. Si autem aliquid in disceptationem veniat, & dubitatio fortasse accedat, quid sit id, quod exhibere voluerit; quamvis (quod tamen obtineri ab artificibus non facile potest) haberes archetypis omni ex parte plane similes; nihilominus ipsae archetypae inspiciendae, ut quae non habeant admissi per imitationem erroris cujusdam ullam suspensionem.

Caeterum diu multumque cogitavi, deberemne etiam illas omni alioquin laude dignissimorum hominum interpretationes expendere, à quibus recedendum mihi fuit. Quippe impetrare à me vix poteram, ut publice proferrem, & tanquam in luce collocarem, quae emendanda esse putem;

quod res erat futura non cum quodam plebejo tantum scriptore, minorumque gentium anatomico; sed cum eximiis eruditione, scriptis, dignitate, meritis, & quod praecipuum, nostrae memoriae, nostrorum temporum. Honestius acturus cum iis mihi videbar; si non palam, sed tacite dissiderem, nullaque facta aliter sentientium mentione, quae veriora esse putem, nude proponerem. Et omittere praeterea omnem quamcunque reprehensionem malebam, ne minus gratiae proferendo recta, quam offensae emendando prava, mererer. Contra ea autem non leve momentum ad confirmanda illa, quae veriora putem, & ad excitandam omnium attentionem, allaturum erat hoc; si scire me, aliter alios sentire, productis eorum locis ostenderem, & non casu, sed data opera, & quoniam poscat res, ab iis discedere. Ac nunc etiam maxime, meam operam, quam Eustachii tabulis impendi, emissurus quum sim, mearum partium esse videbatur, ab alienis eas interpretationibus pro virili liberare. Jamque in eo eram, ut explicationem nudam exire sinerem, quum vicit demum utilitatis illa quaedam ratio. Hoc igitur unum superfuit, ut pro veritate dicerem, neque tamen obliviscer honoris ac reverentiae, quam principibus viris & debeo, & libentissimo animo tribuo.

Inter eos autem, quorum interpretationes expendendas sumsi, Lancisii, quam aliorum, saepius facienda mentio erit. Cujus explicationem postquam accuratius inspexi, magnitudinem agnovi viri eximii erga anatomes amatores meritorum, & simul indolui, inveniri in ea, quae detrahere de meritis illis aliquid videantur. Quamvis enim multa contineat, quae omni laude digna sunt, negari tamen non potest, continere etiam, quibus assentiri nequeamus. Quod quum ita sit, neque negligenda esse laudabilia illa, quae tradidit, puto; neque tamen plus ei tribuendum, quam veritatis cultores deceat. Licebit igitur, ni fallor, quibus in rebus minus probanda tradiderit, monere veritatis amatores; ita tamen, ne minuere existimationem ejus velle videamur magis, quam communi utilitati consulere. Ignoscendumque vel ob unum bene merendi studium; valereque apud omnes iusta debet excusatio & difficultatis rerum, & angustiarum temporis, intra quod conscripsit explicationem suam, multis alioquin, magnisque negotiis occupatus. Ad quod accedit, affecta fuisse

se actate, ac valetudine; quod ex Morgagni tum adversariorum anatomicorum tertiorum animadversione XLV, tum epistolae anatomicae primae paragrapho LXXVI. intelligimus. Adde quod ipse in praefatione scripserit, *se in edendo hoc opere esse haesitantiorē, ne scilicet multa inchoata solum, ac rudia, immo forte perperam ex commentariolis suis excidisse quis opinetur; quem tamen velit praesentibus frui.* Quapropter aequo animo ferre vix possumus, durius, quam decet, reprehendi ea, quae emendanda ducantur, atque ita cum primi ordinis homine agi, tanquam si esset aliquis ex infima scriptorum plebe. A quo tantum absum, ut quum explicationem ejus expendere coepi, tantum dederim honori & meritis ejus, ut toties dolore affici me senserim; quoties occurrerem alicui rei, quae justam emendationem effugere nequibat. Atque illa ipsa reverentia ab emendationibus proferendis cohibere me etiam nunc potuisset, nisi negligi ejus explicationem ab anatomes studiosis intellexissem, eo quod in omnium animis insideat opinio haec, dubiam esse, incertamque, ac plenam errorum; meamque adeo operam afferendam esse existimaverim, ut allatis emendationibus, si possem, efficerem, ut studiosius, & securius (nisi modo ego etiam, dum emendare volui, hallucinatus sum) explicatione illa utantur, fruantur. Nec dubium quin, ut quaedam emendavit ipse, sic emendaturus fuisset, si aberrasse se cognovisset. Nihil autem explicationis illius attingi, nisi quod ad rerum, quid sint, interpretationem attineat. Et praeterii levia quaedam, utpote per se apparentia, quae excidere Lancisio facile potuerunt. Cujus generis si qua tamen afferenda tironum causa duxi; nolite, quaeso, in malam partem interpretari. Illud autem animadvertendum est, plerosque quidem numeros, quibus in explicatione ejus res designatae sunt, satis eas accurate designare; non raro tamen, quas debere videntur, non designare, ut, nisi vitiosos esse numeros illos agnoscas, multo etiam saepius à veritate deflexisse videri possit. Nihil autem refert hic inquirere, utrum mensurae illud vitio adscribendum sit, an metiendi rationi, an alii cuicunque causae. Sed non potui, quin monerem, ubicunque tale quid occurrit. Et fortasse aliis etiam in locis, ac de quibus monui, ubi error in re esse videtur, tantum in numeris residet. Monere autem operae precium non fuit, ubi tantum leviter ab-

errant, ut vel à mediocriter exercitato facile, quid designetur, perspiciatur. Et in aliquibus etiam ne aberratum quidem esse dici potest, eo quod aut numeris illis ita accurate designari res nequeant, aut designari necessarium non fuerit, quum nemo facile reperiatur, quem talis tam parva differentia moretur. Quam difficile autem sit, talibus in rebus cavere ne quicquam alicubi aberres, neque gravior error irrepat, nemo, puto, non videt: ne videar negligentiae acculare velle aut Lancisium ipsum, aut Soldatum, qui refert in monitis, Lancisium voluisse, *ut singulas tabularum particulas, quae animadversione magis dignae habitae sint, per appositos numeros fideliter ostenderet.*

Restaret nunc, ut de illis virorum clarissimorum annotationibus loquerer, quibus multa ab iis tam egregie partim explicata sunt, partim illustrata. Multa primum Lancisius protulit: qui satis non esse putans, tabulas à se diligenter secundisque avibus quaesitas, ac feliciter inventas, in lucem proferre; sumsit sibi quoque laborem notas addendi. Et, ut tradit in praefatione, *quoniam, ne frequens locorum obscuritas se in errorem duceret, saepe, maximeque est veritus; idcirco in laboris honesti societatem vocavit D. Antonium Pachionum medicum romanum, & in rebus potissimum anatomicis apprime versatum, quocum singulas tabulas iterum ad examen revocare non detrectavit; atque ubi vel minimus scrupulus (quod interdum accidit) sibi injectus est, statim imaginem cum archetypo, nempe iconem cum dissecto cadaveris membro contulerunt, & comparaverunt: in partem quoque diligentiae, curaeque accito Francisco Soldato, juvene quidem medicis studiis, cadaverumque sectionibus magnopere exercito. Neque vero, cum opportunum censuerunt, per epistolas quoque in consilium admittere praetermiserunt eximios viros Joannem Fantonum, & Joannem Baptistam Morgagnum suae aetatis in Italia experientissimos anatomicos. Scripsitque eo tempore uterque ad Lancisium epistolam elegantem; & Morgagnus quidem uberiores, qua de tabulis illis, deque re anatomica, praeclare meritis est. Post haec edita Morgagnus quaedam quoque attigit in adversariis suis anatomicis, epistolisque, refertis & observationibus egregiis, & eruditione. Attigit & Santorinus in observationibus, & Winslowus in expositione anatomica corporis humani, eximio laboris ac diligentiae suae monumento. Hic autem, quae*

quae praestiterunt, non commemorabo: exstant scripta eorum, dignissima quae ab omnibus, qui rei anatomicae student, diligenter legantur. Neque commemorabo quae alii eruditi homines sparsim attulerunt. Quum primum edidi, data, spero, haec venia indicem scribenti: dabiturque etiam nunc denuo edenti, declinantique praeterea, quod satis jam occupatus, recognoscendi operam. Annotationes autem eorum, quas quidem adhuc legerim, quoties meis observationibus confirmari animadverti; & quoties vicissim illa, quae olim, ante quam scripta eorum prodierunt, notaveram, inveni confirmata ab iis; toties magnam cepi voluptatem non modo, sed etiam fructum. Sed utinam studium suum operamque, ut in aliqua, sic in reliqua omnia contulissent, atque explevisset desiderium, quod editis speciminibus commoverunt! Quod efficere si voluissent, facile, Auditores, opera caruisset mea. Atque ego etiam libenter pepercissem ei, difficultatem timens rerum, & magnitudinem operis, nisi vobis petentibus, instantibusque, non satisfacere nefas esse duxissem. Quod si minus idoneus fui qui tantam rem efficerem, poterit tamen certe hoc, quod proferre ausus sum, aliquod obsequii mei, voluntatisque, esse documentum.

AD EXCELLENTISSIMUM
BARTHOLOMAEUM
EUSTACHIUM

Praeceptorem Optimum

P E T R U S P I N U S.

Olim Pergamides velut Magister
Falsa scripta refellit inscientis
Thessali, methodum docens medendi;
Sic meus quoque BARTHOLUS procacem
Fastum, & dicta refellit impudentis
Vessali, methodum docens notandi
Quaque in particula situm, figuram,
Structuram, numerum, ordinem, atque nexum.
Illi posteritas adhaeret omnis,
Et mirata colit Virum; futura
Te nobis, Pater, invidet aetas,
Seque ortos citius volent Nepotes:
Fortunata nimis, nimis beata
Per te secula nostra praedicabunt.

DE

DE USU TABULARUM.

Quanquam ad hanc explicationem meam nihil opus est gradibus Eustachii, ad-ditos tamen volui, ne, si quando usus eorum esset, desiderarentur. Quod quum fecerim, etiam de modo iis utendi dicendum est. Et ipse quidem Eustachius praecipit haec.

Regulam ex charta, aut ex aere facito latitudine digitali, quae longitudine harum tabularum latitudinem exaequet: eam dividito in gradus ipsarum tabularum gradibus ac numeris respondentes. Sed regulam accommodabis ad lineas altitudinis tabulae, ex eo numero, quem ipsarum index ostendit. Quo autem lineae concurrerint, angulumque effecerint, ibi quaesitam partem invenies. Illud vero attendito in indice, locos harum partium, quae depictae sunt, commonstrante, priore numero altitudinem, posteriore latitudinem significari.

Potest etiam aut ex ferro, aut ex ligno fieri circulus planus, cujus ambitus sit paulo major, quam longitudo tabularum, eique alterum filum rectum, & alterum transversum ad angulos rectos protrahum obducere, ac insigere oportet. Si enim e-jusmodi regulae fila, numeris altitudinis, & latitudinis in tabula descriptis, accommo-dabis, statim punctum, quo fila sese interfecant, partem, quam inquiris, ostendet.

De primo autem modo Soldatus in monitis; cum usu, inquit, deprehenderimus fore, ut si praefata regula non prorsus illi similis construeretur, quae ad indicandas partes à nobis adbibita fuit, jam angulus ex concursu linearum oriundus plus justo anterior, aut posterior efficeretur, qui proinde aliam ab indicata particulam tabulae demon-straret; propterea duas regulas, quibus nos usi fuimus, aeri incidendas curavi-mus, quarum quae brevior est, octo prioribus tabulis aptabitur, quae vero longior, in reliquis adbibenda erit.

Addit deinde, studendum esse, ut librorum compactior inter pulsandas, tundendas-que libri paginas, easdem quoque regulas intus reponat. Cum enim tabulae per idius mallei paullo porrectiores in latitudine sint evasurae; certe, nisi etiam regulae id pa-terentur, jam quaesitae partes aegre inveniri possent.

Addit praeterea, studendum esse, ut ab eodem bibliopogo praedictae regulae crassiori chartae membranaceae superinducantur, atque à libri vertice filo pendulae collocen-tur. Animadvertendum tamen, regulam ex charta, quum, ut crassiori chartae mem-branaceae superinducatur, glutine illinitur, madefactam ex eo, laxari, fierique lon-giorem; maxime ubi super crassiorem illam chartam post aequaliter extenditur: & quamvis deinde, quum siccatur, contrahat se rursus, fiatque brevior; incertum ta-men esse, an justam longitudinem receptura sit, nec ne.

Denique addit, cum incisoris incuria contigerit, ut non singulae tabulae eadem consent latitudine, necesse esse, ut, dum eadem regula uteris, illius principium in primo tabularum latere, ac supra illam altitudinis lineam, quae figuram immediate respicit, ad amussim semper apponas, ipsiusque sinem extra alterum tabularum latus excidere facias.





Idem de altero Eustachii modo, non omnibus tabulis congruere posse, admonet, cum graduum, seu numerorum vestigia in basi quoque impressa exposuisset, eademque in plerisque prorsus desiderantur. Cui tamen modo nihil horum difficultatem avert, sive charta tabularum tundendo fiat porrectior, sive laxet se humido, sive calore contrahat, sive alia sit in aliis aliisque tabulis graduum magnitudo; quae quidem caveri vix possunt.

Proponit deinde alium. *Attamen, inquit, si expeditiorem exoptes modum pro eodem usu tabularum, sequentem addimus. Quadrilongum planum ex charta crassiori, vel aliqua tabella constructo, quod undique quamlibet tabulam aliquantulum superet; deinde illud per lineam diagonalem dividito; qua divisione duo triangula rectangula habebis, quorum alterum hoc pacto usurpabis: Latera angulum rectum comprehendentia ad lineas cum altitudinis, tum latitudinis tabulae ex iis gradibus, qui indicati sunt, ita dispones, ut angulus rectus intra tabulam incidat; quo vero idem inciderit, ibi quaesitam partem invenies.* Et expeditior quidem hic modus; quamvis tamen, triangulum illum ita apponere, aeque promptum non sit omnibus.

Ad quas difficultates tollendas, posset regula ex ligno aut aere confici, ea forma, qua littera T scribitur, constans scilicet ex regula transversa, quae transversae lineae litterae illius respondeat; & ex recta, quae rectae, quaeque ad mediam longitudinem transversae ad perpendicularum adnexa sit. *Si enim ejusmodi regulae partem transversam numeris altitudinis in utroque tabulae latere descripsis, & simul partem rectam numeris latitudinis in superiore parte tabulae descripsis, accommodabis punctum, quo pars regulae recta cum transversa concurrat, angulumque efficit, partem, quam inquiris, ostendet.* Quo vero ad quamcunque tabularum latitudinis & altitudinis partem accommodare eo modo punctum illud posses, partem quidem rectam regulae aeque longam esse deberet, atque ipsae sunt tabulae; transversam autem esse fere duplo longiorem, quam quanta est tabularum latitudo. Ob quam tamen longitudinem regula talis esset ad usum paulo impeditior.

Winflowus alium modum, quo usus sit, tradit in expositione anatomica, in monito de figuris. Quoniam vero, ut prompte intelligatur, tabulas, in quibus cum ex parte expressit, simul inspicere necesse est; idcirco tantum indico, ex ipso petendum.

Caeterum melius facturos illos moneo, qui res in tabulis secundum gradus ab aliis ex Romano exemplari designatas quaerent, si quaerent in Romano, quam in descripto hoc; propterea quod, si aliquantum aberratum in gradibus à scalpore in hoc sit, ut facile potuit; id in errorem inducere eos alicubi posset.



BARTHOLOMAEI EUSTACHII E X P L I C A T I O TABULARUM & FIGURARUM ANATOMICARUM

AD OPUSCULA ANATOMICA PERTINENTIIUM.

*Diversae renum formae in his tabulis depictae sunt, non quia omnes sint
monstruosae, sed quia hominis natura in eis conformandis
admodum inconstans, ac varia est.*

T A B U L A P R I M A.

F I G U R A P R I M A.

IN prima figura renis dexter est major, quam sinister; parte superiore utraque aequalem ferè altitudinem habet; sinister enim nonnihil dextro est e-latior, inferiore dexter sinistro est humilior, & hoc evenit propter magni-tudinem; cuius causa sinister altior dextro dici potest.

A Glandula reni dextro incumbens, forma, figura, & substantia ei respon-dens, major est quam sinistra.

B Glandula reni sinistro incumbens, similis dextrae; sed eà minor.

CC Venae cavae truncus.

DD Arteriae magnae pars.

E Venula orta à dextra parte cavae venae supra emulgentem, & in pinguem dextri renis membranam distributa.

F Venula, vel à cava, vel à suprema parte emulgentis dextrae ortum ducens; quae partim **G** in septum transversum; partim **H** in glandulam reni dextro incumbentem; partim **I** in supernam regionem substantiae renis distribuitur.

K Vena emulgens dextra, humilior, brevior, & magis obliqua, quam sinistra.

L Vena feminina dextra.

M Arteria dextra emulgens.

N Vas urinarium dextrum.

O Vena emulgens sinistra, altius orta, longior, & minus obliqua, quam dextra. Oriri solent venae emulgentes è regione duodecimae thoracis, & primae lumborum vertebrae.

P Venula à superiori latere sinistrae emulgentis venae in medio ductu nata; quae distribuitur partim **Q** in septum transversum; partim **R** in glandu-lam reni sinistro incumbentem; partim **S** in superiorem regionem pinguis tunicae renis.

T Venula originem ducens à superiori latere emulgentis sinistrae juxta renem; disseminata in inferiorem partem pinguis tunicae ejusdem.

U Vena seminaria sinistra; orta ab emulgente.

V Arteria emulgens sinistra.

W: X Arteriae seminae.

Y Arteria inferior mesenterii.

Z Vas urinarium sinistrum.

H

F I.

FIGURA SECUNDA.

Secunda figura renem sinistram habet majorem, & altiore dextro; licet propter magnitudinem hic videatur esse humilior.

a: b Glandulae renibus incumbentes, instar placentularum depressae, ac latae; ut plurimum enim tales occurrunt: renibus formâ sunt rarius similes. Hae quandoque non renibus, sed transverso septo adhaerent, eique validè alligantur.

c c Vena cava.

dd Arteria magna.

e Venula parum supra principium emulgentis dextrae enata; inferitur tum in dextram glandulam renis; tum in superiorem regionem pinguis tunicae ejusdem distribuitur.

f Vena emulgens dextra altius oritur, quàm sinistra; ac simul cum arteria in quatuor ramos dividitur; & antè divisionem producit venam seminariam.

g, h Venae seminariae dextrae duo principia; alterum ab emulgente, alterum à vena cava.

i Vas urinarium dextrum.

k Vena juxta emulgentem sinistram à cava orta, quae alterum ramulum l mittit in peritonaei membranas, alterum bipartitum m inserit in glandulam reni incumbentem: unde alter ramulus n egreditur ad membranas peritonaei, alter o ad supremam sedem tunicae pinguis.

p Vena emulgens sinistra humilior oritur, quàm dextra; ac simul cum arteria in quinque ramos dividitur: & ante divisionem duo principia venae seminariae producit.

q Vena seminaria sinistra, duobus principiis ab emulgente orta: quod saepe accidit; quamvis vena emulgens in tot ramos, quot vides, semper non sit divisa.

r: s Arteriae seminae.

t Vas urinarium sinistrum.

FIGURA TERTIA.

In tertia figura renis dexter est altior sinistro.

aa Venae cavae truncus.

bb Arteria magna.

γ, δ Duae emulgentes venae dextrae altius oriuntur, quàm duae sinistrae; oblique deorsum, uno digito aequè distantes, ad renem tendunt; quarum inferior est minor superiori: ambae seminariam venam producant.

ε Arteria emulgens dextra, cum superiori, & crassiori vena procedens.

ζ Vena seminaria dextra, ex duobus principiis constituta.

η Vas urinarium dextrum.

θ, ι Duae venae emulgentes sinistri lateris, magnitudine aequales, figura flexae; humilior oriuntur, quàm dextrae: quarum superior satis obliqua deorsum procedit; inferior verò parum, & penè transversa ducitur, ambaeque instar X se intersecant: eminentior enim inferior, humilior verò superior in renem inferitur.

κ Arteria emulgens sinistra; ad medium usque ductum cum superiori, & inde cum inferiori vena procedens.

λ Vena seminaria ab inferiori emulgente orta.

μ: ν Arteriae seminae.

ξ Inferior arteria in mesenterium distributa.

ο Vas urinarium sinistrum.

T A-

T A B U L A II.

FIGURA PRIMA.

IN prima figura renes, magnitudine parum, aut nihil differunt; & dexter nonnihil est humilior; sinister parum elatior.

A: A Glandulae renibus incumbentes; depressae, & oblongae, ac si essent duae placentulae.

BB Vena cava.

CC Arteria magna.

D Vena à cava juxta hepar originem ducens; partim dextrae glandulae reni incumbentis corpus perforat; partim superficiem ejusdem perreptat.

E Venula in eandem glandulam inserta; originem trahens ab emulgente vena juxta cavam.

F Vena emulgens dextra; ferè è regione sinistrae, aut nonnihil inferius enata.

G Vena distributa in pinguem renis tunicam; orta à superna parte emulgentis dextrae.

H Vena alia emulgens dextra, parum sub priori enata; multò tamen eadem minor.

I Vena seminaria dextra.

K Arteriola in dextram glandulam renis infixà; principium sumens ab arteria emulgente.

L Arteria emulgens dextra.

M Arteria orta ab emulgente, & in renem dextrum juxta secundam venam emulgentem inserta.

N Vas urinarium dextrum juxta renem satis latum.

O Vena emulgens sinistra; admodum magna, nonnihil altior in ortu, quàm dextra; parumper oblique procedens.

P Vena orta à superiori latere emulgentis sinistrae: quae dividitur in duos ramos: quorum alter Q bifidus, in medioque suarum propaginum arteriam continens, in septum transversum, non longe à sinistro latere foraminis, per quod gula pertransit, distribuitur; & antequam ad membranosam ejus partem perveniat, cum propriis septi transversi venis coit. Alter ejusdem venae ramus R partim in glandulae reni incumbentis substantiam, partim in ejus superficiem, ac in superiorem pinguis membranae partem dispensatur.

S Vena in mediam sedem pinguis tunicae renis sinistri, ab emulgente juxta renem orta.

T Vena ab emulgente sinistra, fere eodem loco cum superiori originem ducens, in inferiorem partem pinguis tunicae renis disseminatur; à qua ramulus procedit, qui cum vena seminaria sinistra conjungitur.

Qua parte ab emulgente vena oriri solet seminaria sinistra, quatuor rami ab una radice simul oriuntur, quorum primus U simul cum ipsa emulgente tendit in renem. Secundus VV ad posteriora juxta vertebrae sursum reflectitur: & cum ramo sinistro W venae sine pari connascitur: cujus secundi rami portio X ad latus sinistrum tendit. Tertius Y ad sinistrum latus iliorum deductus in proximas partes disseminatur. Quartus ramus Z venam seminariam sinistram producit; cum quo portio venae per pinguem renis tunicam disseminatae conjungitur.

H 1

T Ar-

Γ Arteria sinistra in septum transversum distributa.

Δ & Θ Arteriae mesenterii.

Λ Arteria emulgens sinistra.

Ξ Arteriolae ad glandulam sinistram reni incumbentem tendentes; quae communi principio ab arteria emulgente oriuntur.

Π:Σ Arteriae seminae.

Φ Arteria inferior mesenterii.

Ψ Vas urinarium sinistrum.

FIGURA SECUNDA.

In secunda figura renis dexter sinistro major est; eodemque parumper etiam humilior.

a Glandula dextro reni incumbens, instar placentulae depressa.

b Glandula instar placentulae satis oblongae, sinistro reni incumbens.

cc Vena cava.

dd Arteria magna.

e Vena à cava parum sub hepate orta, dextri renis glandulam perforat.

f Vena ab emulgente juxta cavam originem ducens; altero ramo dextram renis glandulam penetrat: altero ejus superficiem perreptat; altero in supremam partem tunicae pinguis distribuitur.

g Vena ferè in totam dextri renis tunicam pinguem dispensata; nam supremam ejus partem non perreptat: oritur ab emulgente juxta praedictam, & cum praecipuo ejus ramo propago venae seminae dextrae conjungitur.

h Vena emulgens dextra.

i Vena seminae dextra.

k Ramus venae seminae dextrae; qui conjungitur cum ramo praecipuo venae; quae in pinguem dextri renis tunicam dispergitur.

l Arteria emulgens dextra.

m Vas urinarium dextrum.

n Vena emulgens sinistra maxima.

o Vena à superiori parte sinistrae emulgentis in medio ductu enata; quae hoc pacto distribuitur:

p Venula in septum transversum; non longè ab ejus arteria sinistra, quae satis insignis etiam in simia observata est.

q Vena glandulam renis sinistri penetrans; & ejus superficiem, ac pinguis supremam partem tunicae renis perreptans.

r, s Venulae in pinguem renis sinistri tunicam, supra ejus medium distributae.

t t Ramus venae emulgentis sinistrae, sursum juxta vertebrae reflexus; qui cum altero extremo venae sine pari coit.

u, v Portiones praedicti rami, in proximas partes distributae.

w Vena seminae sinistra.

x Ramus venae seminae sinistrae, in inferiorem partem pinguis tunicae renis sinistri distributus.

y Arteria sinistra septi transversii.

z: Γ Arteriae seminae.

Δ Inferior arteria mesenterii.

Θ Vas urinarium sinistrum.

FIGURA TERTIA.

In tertia figura renis dexter sinistro aliquantulum est humilior.

$\alpha\alpha$ Vena cava.

$\beta\beta$ Arteria magna.

γ Glandula reni dextro incumbens, instar placentulae oblongae.

δ Glandula, instar placentulae oblongae, reni sinistro incumbens.

ϵ Vena à cava parum supra emulgentem dextram ortum ducens; in tres ramos divisa.

ζ Primus ramus, altera sui parte, in superficiem glandulae dextrae reni incumbens distribuitur: altera verò eandem glandulam perforat; ac deinde superiorem partem pinguis tunicae renis perrepat.

η Secundus ramus in totam fere pinguem tunicam dextri renis dispergitur.

θ Tertius ramus in membranam peritonaci, juxta vasa emulgentia dextri lateris dispensatur.

ι Vena emulgens dextra.

κ Vena feminaria dextra.

λ Arteria emulgens dextra humilior sinistra.

μ Vas urinarium dextrum.

ν Vena emulgens sinistra major, quàm dextra, & ea in origine altior.

ξ Vena ab emulgente sinistra, juxta ejus principium enata in duos praecipuos ramos distributa.

\omicron Primus ramus altera sui portione π & ρ in peritonaeum; altera σ in glandulae sinistrae corpus, ac superficiem; altera τ & υ in superiorem partem pinguis tunicae renis sinistri digeritur.

ϕ Secundus ramus in membranam peritonaci, circa vasa emulgentia disseminatur.

χ Vena feminaria sinistra.



ψ Vena in renis tunicae pinguis inferiorem partem.

ω Arteria emulgens sinistra.

$\Gamma:\Delta$ Arteriae feminariae.

Θ Inferior arteria mesenterii.

Λ Vas urinarium sinistrum.



T A B U L A III.

F I G U R A P R I M A.

IN prima figura dexter renis minor est, & elatior; sinister multò major, & humilior; praesertim in infima sede: nam in suprema ambo parum differunt.

AA Vena cava.

BB Arteria magna.

C Vena emulgens dextra in tres ramos divisa.

D Vena emulgens alia, duobus digitis sub praedicta originem sumens; quae venam seminariam dextram producit.

E Vena seminaria dextra.

F Vena alia, duobus digitis supra magnam cavae venae in lumbo divisionem, principium ducens, inseritur in humiliorem partem renis simul cum arteria, quae ipsam comitatur.

G Arteria emulgens dextra, simul cum prima emulgente vena procedens; in duos inaequales ramos divisa.

H Arteria alia à trunco dextro magnae divisionis in lumbo.

I Dextrum vas urinarium, quod sumam partem renis usque ad ejus summitatem perreptat.

K Vena emulgens sinistra, è regione dextrae ortum ducens; simul cum arteria in tres ramos dividitur; nullamque seminariam venam producit.

L Vena seminaria sinistra à cava enata.

M: N Arteriae seminae.

O Inferior arteria mesenterii.

Interdum rene existente satis magno, ut hic sinister apparet; tres in eo sunt cavitates, in quas urina colatur; una in ejus summitate, non admodum magna; altera in medio, praedicta triplo major: tertia in infima ipsius sede: & à qualibet earum unus oritur meatus urinarium.

PP Primus meatus urinarium à prima cavitate ortus; qui deorsum tendens usque ad magnam arteriae divisionem in lumbo, conjungitur cum aliis duobus meatibus.

Q Secundus ramus urinarium ortus à media cavitate; qui deorsum obliquè fertur, ferè usque ad humiliorem sedem renis.

R Tertius meatus amplius est; & ab ultima cavitate tribus principiis ortum ducit: hic parumper deorsum productus, angustior redditur; & primum cum secundo meatu coit, ac unus cum eo efficitur: deinde cum primo unitus, cum eo unum vas urinarium efformat.

F I G U R A S E C U N D A.

In secunda figura renis dexter elatior est sinistro.

aa Vena cava.

ββ Arteria magna.

γ Vena emulgens dextra, multò altius orta, quàm sinistra; simul cum arteria in tres ramos aequales divisa: qui aequè distantes inseruntur supra renis medium.

- d Vena feminaria dextra.
 e Vena alia emulgens, procedens à cava sub ortu venae feminariae dextrae, quae transversa ducitur; & in renem inferitur sub ejus medium.
 ζ, η Duae aliae arteriae, ultra consuetam, cum prima vena emulgente procedentem; ad renem dextrum tendunt.
 θ Prima harum duarum arteria oritur supra arterias feminarias; & transversa supra cavam venam procedens, inferitur propè humiliorem ramum primae venae emulgentis.
 i Secunda arteria oritur sub arteriis feminariis; & unà cum secunda vena ad renes progreditur; ac in eos inferitur.
 κ Vas urinarium dextrum.
 λ Vena emulgens sinistra; major, & humilior orta, quàm dextra; ubi arteriam magnam praeteriit, in duos ramos partitur, & singuli rursus in alios dividuntur: altera portio primi rami inferitur in glandulam reni sinistro incumbentem, & ipsam perforat; altera in anteriorem renis partem supra ejus medium dispergitur. Secundus ramus primum gignit venam feminariam: deinde bipartitus, altera parte sursum fertur; & inferitur in renem supra infimam partem primi rami: altera inferitur in eundem renem sub ejus medium.
 μ Vena feminaria sinistra.
 νν Alia vena sinistra ad renem sursum oblique tendens; oritur à sinistro trunco magnae divisionis venae caevae in lumbo; & inferitur in infimam sedem renis.
 ξ Arteria sinistra emulgens; quae in duas partes dividitur, quarum una fertur, & inferitur simul cum infima portione primi rami venae emulgentis: altera cum secunda parte secundi ejusdem venae rami.
 ο Alia arteria simul cum secunda vena sinistra deducta; ortum ducens à sinistro trunco magnae divisionis in lumbo.
 π: ρ Arteriae feminariae.
 σ Vas urinarium sinistrum instar oblongae vesicae satis dilatatum, in anteriori sede renis oblique positum; in quod plures ex rene feruntur meatus, multis interdum arenulis pleni.

FIGURA TERTIA.

In tertia figura renis dexter sinistro est minor; qui propter magnitudinem supra elatior, infra humilior dextro apparet.

aaa Vena cava.

bbb Arteria magna.

c Vena emulgens dextra altius orta, quàm sinistra; & eà multò gracilior, quae in duos ramos divisa, altero in elatiorem, altero in humiliorem partem renis inferitur; & antequam dividatur venam feminariam dextram producit.

d Vena feminaria dextra.

e Vena altera ad renem producta, quae uno digito sub emulgente dextra ortum ducens oblique sursum tendit; & multò supra insertionem prioris rami memoratae emulgentis, in renem infigitur.

f Tertia vena ad renem dextrum procedens, duobus digitis sub secunda enata, & ferè transversa ad renem producta.

gg Ar-

- gg Arteria dextra supra emulgentem consuetam orta, primò deorsum, deindè sursum procedens, quae in duos ramos divisa, inferitur in renis summitatem.
- hh Arteria dextra emulgens, deorsum cum vena emulgente procedens, & cum infimo ejusdem venae ramo in anteriorem renis sedem inserta.
- i Tertia arteria dextra, ortum ducens è regione inferioris arteriae mesenterii, & transversa ad renem tendens.
- k Quarta arteria dextri renis, enata in medio magnae divisionis, quae in lumbo fit; obliquè sursum ad renis posteriorem, & inferiorem sedem protrahitur.
- l Quinta arteria dextri renis, orta à ramo ejusdem lateris ad os sacrum tendente; sursum obliquè ascendens, in anteriorem, & imam sedem renis inseritur.
- m Vas urinarium dextrum, in principio satis latum, ex quinque propaginibus constat; licet earum tres solum appareant; quae per anteriora renis egrediuntur.
- n Vena emulgens sinistra, inferius orta, quàm dextra, ubi arteriam magnam praeteriit, in quinque ramos dividitur; quorum alter o, qui superior est, inferitur, tùm in elatiorem sedem ipsius renis, tùm in glandulam ei incumbentem; undè postea ramulus ad membranam pinguem egreditur. Secundus p obliquè deorsum tendit, & bipartitus in anteriorem sedem renis circa ejus medium inferitur. Tertius q sursum obliquè reflectitur; & secundum instar X interfecans, inferitur in anteriorem, & superiorem renis partem. Quartus r deorsum obliquè tendens, inferitur in anteriorem, & humiliorem sedem renis. Quintus s reflectitur retrorsum ad lumbum; & inter primam, & secundam ejus vertebam ad medullam spinalem penetrat.
- tt Vena alia sinistri renis, à sinistro ramo magnae divisionis in lumbo enata; sursum obliquè ascendit, & postquam ramum divisionis arteriae ejusdem lateris praeteriit, in duas propagines dividitur; quae in medio comprehendentes tertiam arteriam sinistram, inferuntur in anteriorem, & humiliorem sedem renis.
- u Vena seminaria sinistra.
- v Prima arteria sinistra ad renem tendens, oritur è regione secundae earum, quas in dextro latere esse diximus. Haec juxta renem bipartita, inferitur cum primo, & cum tertio ramo venae emulgentis.
- w Secunda arteria sinistri renis, oritur sub infima arteria mesenterii; bipartitaque prope renem inferitur, altera ejus parte sub medium renem, altera cum quarto ramo venae emulgentis.
- x Tertia arteria, oritur paulò ante divisionem magnae arteriae in lumbo; quae inter ramos secundae venae sinistrae procedens, simul cum illis in renem infigitur.
- y: z Arteriae seminae.
- Γ Inferior arteria mesenterii.
- ΔΔ Vas urinarium sinistrum, ex quinque propaginibus à renibus procedentibus constatur; oblongam vesicam, instar perae pastorariae recurvatam, refert; aut threicium gladium altera parte flexum repraesentat, hoc calculis plenum à nobis est inventum.

T A B U L A I V.

TRes figurae venarum primo loco depictae, non modò ad tractationem de renibus pertinent, verùm etiam ad eam, in qua de vena azyga disputatur.

TRIBUS PRIMIS FIGURIS COMMUNIA.

Γ. Γ Γ Vena cava juxta cor recisa.

Δ. Δ. Δ Vena sine pari.

Θ. Θ Venae sine pari divisio circa decimam thoracis vertebra, & Λ ē regione octavae, ut interdum à nobis observatum est.

Ξ. Ξ. Ξ Truncus venae cavae, qua vocatae emulgentes ab ea oriuntur.

Π Propago dextri rami venae sine pari, quae conjungitur cum vena cava, juxta ortum emulgentis dextrae, quod tamen rarò cernitur.

Σ: Φ Dexter, & sinister ramus venae sine pari, qui cum prima vena sui lateris, in lumbo sub emulgente orta conjungitur; & in tertia figura Σ: Φ. In secunda autem Σ: Φ sinister ramus conjungitur cum alio, ab emulgente orto, priusquàm producat venam feminariam.

F I G U R A S E C U N D A.

A Vena à sinistro cavae trunco in jugulo, sub ortu venae sterni enata, in duos ramos statim divisa; quorum major **B** sub arteria brachii sinistri, ad tertiam thoracis vertebra reflexus; juxta radices costarum, usque ad nonam singulis furculos offerens, perreptat; quò ubi pervenit, cum ramis venae sine pari, octavum **C**, & nonum **D** earum intervallum nutrientibus conjungitur: quod ab illis praesertim expendi debet, qui in sanguine exhauriendo fibrarum rectitudinem magnificiunt. Minor **E** ramus cum sinistro septi transversi nervo incedens, in ejus lateris membranam thoracem dividendem, & in eam, quae pericardium appellatur, propagines distribuit: tribusque bifidis furculis in carnosam, eandemque superiorem partem septi inseritur.

F I G U R A T E R T I A.

a Ramus venae azygae, qui juxta radices costarum sursum reflexus, tertium, quartum, quintum, & sextum earum intervalla sinistri lateris nutrit.

b Vena à sinistro cavae trunco in jugulo ortum ducens, in duos ramos scissa. Quorum alter **c** cum sinistro nervo septi transversi procedens, in hoc, & in membranam dividendem thoracem distribuitur. Alter ramus **d** sub arteriam brachii reflexus, ē regione quintae vertebrae thoracis, cum eo ramo a venae azygae conjungitur, quem à sexto intervallo sursum reflecti diximus.

FIGURA QUARTA.

α Renis urfinus ex pluribus quasi glandulis magnitudinis cerasorum coagmentatus; quae invicem junguntur, & alligantur membranae cujusdam tenuis, ac ramorum trium vasorum beneficio. Harum divisiones replet copiosum pingue; quo remoto facile est ejusmodi particulas sine vulnere separare.

In singulas has urfini renis partes, glandulas referentes, semper ramus venae, arteriae, ac vasis urinarii inseritur.

Quilibet ramus vasis urinarii in latum finem desinit; in quem alia glandula parva, acuta, & nonnihil depressa, ex substantia renis formata, instar operculi ei incumbens, ingreditur.

β Vena, & arteria emulgens.

γ Vas urinarium.

Bubulus ren est ferè similis urfino; sed tubercula glandulis similia, non perinde in bove, ac in urso dividi possunt.

Singula vasa renis vitulini, antequàm in glandulas, seu coagmentationes dispendentur, dividuntur in duos praecipuos ramos: quorum unus sursum, alter deorsum tendit.

In aliquibus foetibus humanis reperti fuerunt à nobis renes similes bubulis, ut Aristoteles scribit.

FIGURA QUINTA.

Quandoque vidimus tres renes; unum scilicet in dextro latere, qui naturalis erat; duos verò praeter naturam in sinistro.

A Alter sinister ren, praeter naturam, admodum parvus; figurae triangulae, & satis depressae, solà substantiâ similis ei, qui naturalis est, vase urinario, & arteria destituitur.

B Alter ren sinister praeter naturam, in sinistro spinæ latere situs est; & à summitate quartae lumborum vertebrae, usque ad ossis sacri initium producit: estque in superiori parte angustior, in humiliori latior; ac vas urinarium ex posteriori sui regione producit; quamvis hoc videri in figura non possit.

CCC Vena cava.

DD Arteria magna.

E, F Duae venae emulgentes dextrac; aequales, & aequè distantes; quae arteriam in medio continent.

G Vas urinarium dextrum.

H Vena emulgens sinistra, satis gracilis, elatiorem originem habens, quàm dextra; quae sine ulla comite arteria transversa procedit.

I Vena seminaria sinistra.

K Vena orta à cava, è regione secundae lumborum vertebrae; quae transversa sub arteria procedit.





L Vena alia principium sumens parum supra magnam cavae venae divisionem in lumbo; quae etiam sub arteria transversa procedit, & cum praedicta coit.

M Vena ex praedictis duabus conflata; quae inseritur in posteriorem sedem renis, versus externum latus.

N Arteria bipartita, antè, ac retrò in superficiem sinistri renis distributa, oritur antequàm magna arteria in lumbo dividatur.

O Arteria altera, à sinistro trunco magnae divisionis in lumbo principium sumens; inseritur in humiliorum renem sinistrum simul cum vena.

T A-



T A B U L A V.

F I G U R A P R I M A.

Prima figura renem, & ejus vas urinarium per medium divisum ostendit.

AAAA Renis substantia circa ramos vasis urinarii.

B,B,B Carunculae extuberantes, instar acutae glandulae, seu papillae mammillarum, extrema patentia ramorum vasis urinarii claudentes; quae mediae secundum ipsarum longitudinem divisae sunt, ut cerni possint earum lineae, hinc inde velut à centro ad circumferentiam protractae; quarum causa apparent ejusmodi carunculae, ex pluribus quasi fibris concurrentibus contextae.

CC Vas urinarium cum suis ramis per medium divisum. In rene enim humano nulla alia est cavitas, praeter illam, quam vas urinarium efficit, ob concursum suorum ramorum.

D,D,D,D,D Ramis vasis urinarii per medium dissecti; in quorum extrema orificia, instar operculi, incumbunt glandulae parvae, à substantia renum extuberantes.

E,E,E,E,E Foramina vasis urinarii, quae sine ordine distributa saepe occurrunt; parvas quoque glandulas in internam cavitatem spectantes, & ipsa admittunt.

F Foramen, & via vasis urinarii extra renem procedens.

G Vas urinarium extra renem deorsum tendens.

F I G U R A S E C U N D A.

Secunda figura venae, arteriae, ac vasis urinarii ramos per renis substantiam distributos ostendit.

a Vena emulgens, postquam in renem ingressa est, in quatuor, vel quinque scinditur ramos, qui in multos alios rursus divisi, per renis substantiam vario modo dispensantur; ac invicem permixti uniuntur; & denique in tenuissimos, visumque propemodum fugientes furculos cessant. Si enim ren incisus comprimatur; apparent multae sanguinis guttae, ostendentes vasa, quae cerni non possunt, esse dispersa per renis substantiam.

b Arteria emulgens, quae simul cum vena procedens, eandem, quam illa, habet distributionem.

In hac figura apparent rami trium vasorum, remota, & abrasa tota renis substantia.





c Vas urinarium, quamprimum in renem penetrat, dilatatur, ac in duas, quandoque in tres partes dividitur; quarum una sursum, altera deorsum tendit; ambae verò in alios ramos, interdum quatuor, saepe quinque, rursus dividuntur; quò fit, ut eorum divisiones octo, vel ad summum novem, aut decem sint, quae in latum finem, instar coli rotundi desinunt.

L

Vas

Vas urinarium duas habet tunicas: in quarum exteriori disperguntur multae venulae tenues, & aliquae etiam satis evidentes elegantissime dispositae: quod in hac pictura ostendi non potuit.

d, d, d, d Extrema orificia ramorum vasis urinarii; quorum quodlibet, ut diximus, à caruncula instar papillae mamillarum, clauditur: circa quam unaquaeque horum ramorum extremitas connascitur; & quibusdam fibris satis validis, atque in substantiam renis infixis adhaerescit.



T A B U L A VI.

FIGURA PRIMA.

Prima figura ostendit renem caninum, per medium dissectum, absque remotione alicujus particulæ.

AAAAAA Renis circumferentia, ejusdem substantiæ cum reliquo corpore.

BBBBBB Pars renis, lineis quibusdam subaltis, seu fibris à centro ad circumferentiam productis exsculpta.

C, C, C, C, C, C Foramina quaedam valorum, quæ in renis divisione incisa fuerunt; anteriora enim cum posterioribus connascuntur.

DDDDDD Pars renis magis alba & subcineritia; diversis in locis maculis quibusdam rubeis tincta, cavitatem renis, instar septi, per medium dividens.

EE Portio cavitatis internæ renis.

F Foramen, & principium vasis urinarii.

FIGURA SECUNDA.

Secunda figura ostendit renem caninum, detracta illa parte, quæ, instar septi, per medium dividit cavitatem renis.

a, a, a, a, a, a Partes renis, inter divisiones corporis membranei existentes.

bbbbbb Corpus membraneum vasa operiens, eademque complectens; à quo cavitas renis magna ex parte efformatur.

c, c, c, c, c, c Rami prædicti corporis membranei invicem connati; qui vasa undique sub & supra complectuntur.

d Foramen, & principium vasis urinarii.

T A B U L A V I I.

Renis caninus; à quo non solum detracta est pars illa, quae cavitatem renis, instar septi, dividit; sed etiam corpus membraneum, quod in alia figura vasis erat obductum, & cavitatem internam renis, magna ex parte, efformabat.

aaaaa Substantia renis inter ramos vasorum.

b, b, b Rami venae emulgentis; satis ampli, tenuissimam tunicam habentes.

c, c, c, c, c, c, c, c Rami arteriae, simul cum ramis venae distributi; quibus membrana subjacet, pinguedine referta; quae continua est cum propria renis tunica; sicut pinguedo cum ea, quae circa vasa extra renem est circumfusa.

Praedicti rami venarum, & arteriarum invicem non coeunt; nec degenerant in tertium corpus, ut scribit Vesalius; sed venae cum venis, arteriae cum arteriis uniuntur.

Rami venae, & arteriae passim distribuuntur per substantiam renis, & continentur à canaliculis, qui fiunt ex conjunctione corporis membranosi, & alterius membranae vasis substratae: hi autem canales, instar vaginae, manifestè apparent dispensari per renis substantiam.

ddddddd Membrana praedicta vasis substrata; à corpore membranoso, quod iisdem vasis incumbere diximus, recisa.

In ea cavitate, quae fit à corpore membranoso vasis incumbente, & à membrana iisdem substrata, multa pinguedo continetur; quae ramis vasorum undique obducitur.

e Foramen, per quod venae, & arteriae in renem ingrediuntur; & vas urinarium extra procedit.

F I G U R A E P A R V A E.

Duae parvae figurae, ad epistolam de organis auditus pertinentes, tria officula, in caverna ossis petrae similis recondita, & musculus motioni eorum praefectum ostendunt; superior quidem in homine, inferior verò in cane.

A. a Officulum incudi simile.

B. b Officulum malleum referens.

C. c Officulum stapedi vocatae comparatum, à Vesalio praetermissum.

D. d Musculus nemini anatomicorum non incognitus, qui in majorem processum ossiculi malleum referentis inseritur.

e In cane autem, non longè ab insertione, glandulam corneam adnexam habet.

T A B U L A V I I I .

F I G U R A P R I M A ,
E T S E C U N D A .

Prima, & secunda figura, quasdam dextri brachii humani venas ostendunt: & praesertim illas, quae in profundo latitant.

A. a Truncus dexter venae cavae in jugulo.

B. b Radix jugularis internae.

C. c Radix jugularis externae.

D. d Truncus humerariae, & axillaris.

E. e Vena humeraria.

F. f Divisio humerariae parum supra cubiti flexum in duos ramos; quorum interior cum axillaris ramo conjunctus, communem venam efformat.

G. Propago praedicti interioris rami humerariae, quae in flexu cubiti jungitur cum profunda axillari.

H. h Venae communis superficialiae radix.

I. i Axillaris simul cum arteria.

K. k Axillaris parum supra internum humeri tuberculum in duos ramos divisio; quorum exterior cum altero humerariae ramo conjunctus, communem superficialiam constituit.

L. l Axillaris profunda, quae plerumque oritur supra medium longitudinis humeri, & interdum altius, vel humilior.

M. Axillaris profunda gemina esse solet, & arteriam hinc inde complecti. Interdum utraque ejus pars, in medio ferè ductu in unam coit; deinceps illi cò bipartitur; & circa cubiti flexum iterum unitur: quod Vesalius ignorat.

n. Axillaris profunda supra humeri medium, in duas partes arteriam utrinque complectentes, dividitur; ex quibus circa cubiti flexum una efficitur; non solum ut in secunda figura cernitur; sed variis etiam modis, quorum nullus à Vesalio describitur, aut pingitur.

N. n Axillaris profunda in flexu cubiti, aliquos furculos principiis musculorum, qui oriuntur ab interno humeri tuberculo, tribuit: deinde cum ramo, O vel ab humeraria communem venam constituyente, o vel ab ipsa communi orto, conjungitur: de qua re Vesalius nimis petulanter Galenum reprehendit.

P. p Congressus duarum memoratarum venarum, seu vena communis profunda, quae videtur dividi in tres ramos, contra Vesalii opinionem.

Q. q Humilior venae communis profundae ramus, juxta ulnam incedens, non semper unus est; sed interdum geminus existens (quod Vesalius non animadvertit) comprehendit in medio arteriam, & sub musculo in octavam brachialis os inserto procedens, vicinisque soboles offerens, in internam manus sedem dispensatur; & omnibus digitis, vel quatuor, vel etiam paucioribus, furculos offert.

R. r Elatior venae communis profundae ramus, juxta radium incedens, non raro, sicut humilior, geminus est, & sub musculo brachiale ad magnum digitum flectente deorsum procedens, vicinisque musculis propagines offerens in internam sedem pollicis, vel indicis distribuitur.

M 2

S. s Me-

- S. s Medius ramus venae communis profundae, qui à Vesalio nec describitur, nec pingitur; inter musculos secundum, & tertium digitorum internodium flectentes, totam membranae ligamenti ulnae, & radii longitudinem perreptans, musculis ei incumbenibus furculos tribuit; & interdum geminus existens arteriam hinc iadè comprehendit.
- T. t Propago à praedicto medio ramo venae communis profundae circa quartam ulnae partem orta; quae ligamentum membranae ulnae, & radii perforans, ad posteriora tranlit, & in musculos ab ulna procedentes, aliosque eisdem incumbentes distribuit: haec propago, quae interdum gemina est, & arteriam mediam comprehendit, oscitanter à Vesalio praetermittitur.
- U. u Arteria cum axillari vena procedens.

F I G U R A T E R T I A ,
ET Q U A R T A .

Figura tertia, & quarta aliquot venas, & arterias dextri brachii simiae demonstrat.

- A. a Truncus dexter venae cavae in jugulo.
- B. b Vena jugularis interna multò minor, quàm externa.
- C. c Vena humeraria, quae à clavicula, & musculo ab ea in primam costam inserto media comprehenditur; & juxta illius cum sterno articulum foras erumpit.
- D. d Principium jugularis externae ab humeraria sub clavicula procedens.
- E. e Alterum principium jugularis externae ab humeraria procedens, ubi claviculam praeteriit.
- F. f Jugularis externa à duobus principiis enata, contra quam in homine, multò major est, quàm interna.
- G. g Humeraria à musculo deltoide, & ab eo, cui mamilla insidet, operata.
- H. h Divisio humerariae supra cubiti articulum.
- I. i Humerariae ramus per exteriora cubiti distributus.
- K. k Humerariae ramus, qui circa medium cubiti, cum alio ab axillari enato coit.
- L. l Axillaris simul cum arteria, eodem modo, quo in homine internus ejus ramus, profunda est; & sub primo musculo cubitum flectente arteriam comitem habens, usque ad cubiti flexum procedit.
- M. m Ramus axillaris, qui per thoracis latus sub cute dispensatur.
- N Axillaris divisio non longè à cubiti articulo.
- O Ramus exterior axillaris arteriam comitem habens, qui cum alio humerariae, è regione extremae partis carnosae primi musculi cubitum flectentis, nimirum inter hunc musculum, & alium obliquum radii conjungitur.
- P Propago rami exterioris axillaris, per interiora cubiti in superficie dispensata.
- Q Propago, quae interdum oritur ab externo ramo axillaris ad medium cubiti tendente; & quandoque q à conjunctione ramorum axillaris, & humerariae bipartito scinditur; deinceps sub cubiti flexu, inter duos radii musculos extra erumpit, & à ligamento, quod instar membranae omnibus musculis ea in parte obducitur, usque ad radii extremum fertur.

R. r Pro-

- R. r Propago, arteriâ interdum destituta, à conjunctione ramorum humerariae, & axillaris procedens, quae sub obliquum radii musculum demergitur; & cum altero ramo profundo axillaris, juxta insertionem primi musculi cubitum flectentis conjungitur.
- S Interior axillaris ramus, parum supra cubiti articulum ortus, qui profundus juxta os cubiti simul cum arteria incedens, multas propagines vicinis musculis offert; & tendinem primi cubitum flectentis non longè ab ejus insertione conscendens, ramo à conjunctione humerariae, & axillaris orto, occurrit; & communem profundam efformat.
- T. t Insignis ramus ex profunda, quam diximus, venarum conjunctione ortus, qui simul cum arteria juxta os ulnae sub musculis digitos flectentibus latitans, medius inter duas propagines ab eadem conjunctione ortas, ad extremam manum procedit.
- v Venae axillaris divisio, quae sicut in homine, ante medium longitudinis humeri, interdum fit.
- v Exterior axillaris, quae, secus quam in homine, arteriam comitem habet; & à primo musculo cubitum flectente non admodum profunda occultatur; ac parum supra cubiti articulum dividitur.
- Rami humerariae, & axillaris exterioris conjunctio, juxta cubiti flexum, 27. 27.
- x Exterior axillaris ramus sub cute distributus.
- y Interior, & profundior ramus axillaris, qui à primo musculo cubitum flectente occultatus, interdum, non aliter quam in homine, in duas propagines mediam arteriam comprehendentes, divisus, usque ad insertionem ejus musculi fertur: juxta quam ipsum conscendens, cum ramo à priori jam dicta humerariae, & axillaris exterioris conjunctione orto, coit; & venam communem profundam efformat: undè facile est Vesalii ignorantiam arguere, qui hominis, & simiae convenientiam propter ejusmodi venarum congressum turpiter ignorans, non minus temerè, quàm injustè Galenum de eis reprehendit.

FIGURA QUINTA.

Quinta figura praecipuas venas, & arterias dextri brachii canis ostendit.

- a Truncus dexter venae cavae in jugulo.
- b Truncus humerariae, & jugularis externae.
- c Humeraria, orta à jugulari externa, parva est; & è regione medii capitis humeri à musculis occultata ad posteriora quodammodo reflectitur; & quum ad finem musculi deltoidis pervenit, à ramo axillaris d, qui major ipsa est, adaugetur, aut potius constituitur.
- e Humeraria juxta primum musculum flectentem cubitum incedens.
- f Divisio humerariae supra cubiti articulum.
- g Humerariae ramus per exteriora cubiti distributus, qui ferè ad inferius extremum radii bipartitur, & in manum dispensatur.
- h Ramus humerariae, qui in flexu cubiti cum externo ramo axillaris conjungitur.
- i Vena jugularis externa.
- k Vena gracilis orta à jugulari externa, quae in superficie per posteriora scapulae deorsum incedens, juxta inferius, & posterius latus musculi deltoidis conjungitur cum alia insigni vena orta ab axillari.

N

I Vena

l Vena axillaris.

m Insignis vena orta ab axillari juxta ejus principium, quae sub cervicem scapulae ad posteriora procedens, humerariae conjungitur, & ipsam adauget, vel potius constituit.

n Vena axillaris ferè in superficie incedens, inter quam, & arteriam nervi medii sunt.

o Ramus axillaris pluribus surculis per musculos cubitum extendentes in superficie distributus.

p Ramus insignior axillaris, ferè in superficie ad flexum cubiti simul cum arteria incedens, qui cum ramo humerariae conjungitur.

q Surculus gracillimus insignioris rami axillaris, qui in superficie longioris radii musculi fertur.

r Tertius axillaris ramus, qui non longe ab alio, quem insigniorem esse diximus, supra cubiti articulum ortus, profundus cum arteria incedit; & sub infertione primi musculi cubitum flectentis, cum ramo à conjunctione humerariae, & axillaris in flexu cubiti orto, unitur.

s Ramus à conjunctione humerariae, & axillaris in flexu cubiti ortus; qui arteria destitutus, sub obliquum radii musculum demergitur; & in duos ramos dividitur; quorum interior cum tertio axillaris t jam dicto ramo conjungitur; deinde transversus u juxta os ulnae incedens, simul cum arteria ferè usque ad ulnae extremum fertur. v Exterior ramus, ut in pictura vides, dispensatur.

w Gracilis arteria simul cum ramo axillaris procedens, qui cum humeraria conjungitur.

x Arteria sine vena sub externo brachialis musculo incedens.

FIGURA SEXTA.

Sexta figura dextrum cordis ventriculum secundum ejus longitudinem incisum, cum tribus membranis orificio venae cavae praefectis ostendit; & praeterea internam partem auriculae dextrae, quae à vena cava, qua parte ei adhaeret, divisa est.

a Membrana artificii, & admirationis plena, nemini anatomicorum haecenus non incognita; quae foramini venae cavae à jecore ascendente, quam primum haec in dextram auriculam degenerat, praefecta est, nimirum dimidiatam partem, eamque anteriorem illius occupat; & deinceps reticulum efformat.

b Membrana cornutae lunae figuram referens, orificio majoris venae coronariae, ceu operculum ultra medium obducta, quam caeteri anatomici oscitanter praetereunt.

c Superius orificium venae cavae ad jugulum ascendente, quae, ut Galenus scribit, ab elatiori auriculae dextrae extremo principium quodammodo sumere videtur.

Caetera, quae in hac figura continentur, ad praesentem tractationem non pertinent.


B E R-

2-85



TAB. IX.

2-85



BERNARDI SIEGFRIED ALBINI
E X P L I C A T I O
TABULARUM ANATOMICARUM
BARTHOLOMAEI EUSTACHII
T A B U L A IX.

COrpus viri, aperto capite ac thorace cum abdomine, inscriptisque visceribus, quae continent.
a a Calvaria, una cum integumentis externis, internoque, id est, meninge crassa, secundum inferiora cerebri incisa.

Hic videri possit ora incisa altera integumentorum esse externorum; altera calvariae: nempe inferior eademque exterior esse integumentorum; superior eademque interior, calvariae. Quas oras fortasse ob crassitudinem earum distinxerit; meningem crassam ob tenuitatem ejus non distinxerit. Posset fortasse etiam ora exterior videri integumentorum esse simul cum cranio; interior meningis. Utcunque sit, parvi refert; quum videatur caput usque ad cerebrum incisum generatim exhibere voluisse, non sectionis illius, sed cerebri monstrandi causa. Quocirca calvariam una cum integumentis externis internoque incisam esse posui, quamvis distincta non appareant. Et non modo de integumentis, quae proprie vocantur, intelligendus sum; sed de illis simul omnibus, quae cranio hic loci extrinsecus adjacent. De ejusmodi autem rebus, quae momentum habere nullum videntur, ubicunque occurrant monere supervacuum duxi.

b c Cerebrum. b Hemisphaerium dextrum, c sinistrum.

Utrum, quod Lancisius tradit, *superficies cerebri pia matre hic obvelata* sit; an potius rationem ejus Eustachius non habuerit; ex icone non facile cognoscas. Et licet venae, quas exhibet, pia mater revera inhaereant; potuit tamen formam tantummodo cerebri expressisse, eique inscriptas venas illas.
d, d & c. Venae, quae truncis suis pertinent ad sinum superiorem meningis crassae. e, e, & c. Coniunguntur ramis suis.

Venas esse apparet, quum hac in parte cerebri arteriarum rami contrario modo ex truncis suis sursum ducantur.

ff f f f f f f f f g h h i i k k k k k k l l Thorax & abdomen à superiore thoracis parte per latera continuo & aequabili in pubem ductu incisa.

ff & c. Integumenta corporis communia truncata.

g Integumenta communia una cum sterno truncata.

h: h Pectorales truncati.

i: i Serrati antiqui truncati.

k k & c. Truncatae costae cum musculis intercostalibus, pleuraque, ac peritoneo.

l: l Abdominis muscoli cum peritoneo truncati.

m Thymus.

n o p: q r Pulmones. n, o, p Dexter in tres fibras divisus; q, r sinister in duas.

e: r Indicatae pleurae, quae mediastinum vocantur, à sterno resectae.

Lancisus esse *duos nervos in diaphragma utrinque ad lineam descendentes* tradit. Certe, qui diaphragmatici appellantur, demittuntur inter pulmones & pericardium, mox ante vasa pulmonaria, ubi illa in pulmones ingreditur: neque in conspectum veniunt nisi pulmonibus de pericardio sublatis; eoque hic, ubi pulmones illud naturaliter ambiunt, apparere ita nequeunt. Et, non esse nervos illos, colligi etiam satis superque ex tabulae xix. K:K n^o. 11. potest: ubi sinister non recta demittitur, ut hic, si illud, cui t apposui, nervus ille esset, demitteretur ante cor; sed ita à recta via deflectit, ut mucro cordis cogit. Adde quod nervos aequabili ductu ubique exprimat; non autem sic inaequali, ut hic expressit quas puto incisas esse mediaštini oras. Rudis hic earum adumbratio est. In figura autem x. tabulae xv. expressior species; ut intelligere, ni fallor, liceat, ut in ea, sic in hac, oras illas indicari. Neque aliud anatome significat.

uw Pericardium.

Recte, puto, Lancisus pericardium esse conjecit. Confirmare potest figura x. tabulae xv: ubi clarius expressum. Num autem, quod addit, *propter incuriam incisoris ineptissime delineatum?* Anne potius incuriosus ab Eustachio indicatum? Certe permulta, ut in præfatione exposui, indicavit potius, quam exhibuit; & quidem rudi quodam modo indicavit.

xxxx Diaphragma, ab altero latere corporis usque ad alterum truncatum.

m-x Haec illustrat figura x. tabulae xv, in qua clarius existant.

yy Jecur.

z Ligamentum latum jecoris, AA hac parte nascens ex eo, BB hac reflectum à peritoneo, C hac adhaerens ligamento rotundo.

D Fissura jecoris, quae admittit ligamentum rotundum.

E Ligamentum rotundum jecoris, in quod vena umbilici versa.

Adultiore nimirum aetate, cujus haec imago hominis est, ligamentum est.

F Umbilicus.

G: H Ligamenta, in quae versae sunt arteriae umbilici embryonis.

Vide annotationem ad E.

I Ligamentum, in quod urachus embryonis versus.

Vide annotationem ad E. Nequeo quin addam, quod Eustachius scriptis in examine ossium, *in humano foetu nullum urinarii meatus in umbilicum & in allantoidem perforati esse vestigium.*

K K Ventriculus.

Ventriculum hic nudum esse, anatome docet.

L, L, &c. Venarum & artierarum gastro-epiploicarum rami in ventriculi priorem partem ducti. Arteriae venarum comites.

MMMMMN Omentum, à fundo ventriculi demissum ante intestina.

MMMMM Hac parte ante intestinum colon dependet, quod sub eo eminet: NN hac ante intestina tenuia, quae sub eo similiter eminent.

O, O, O, O, O Venarum & artierarum gastro-epiploicarum rami per omentum: qui P, P, P se inter se conjungunt. Arteriae venarum comites.

QQ &c. Intestinum ilium.

R Vesica.


Figura & locus vesicam esse indicant. Accedit eo, quod ligamentum, in quod urachus versus, pertinere ad eam videtur.

Caeterum caput, collum, artus, partesque reliquae externae, non egent interprete. Et credibile admodum mihi videtur, totam illam figuram hominis nullam aliam ob causam exhibuisse, nisi ut haberet, cui inscriberet aptos ventres, cum visceribus, quae continent.


T A,



.Z.H.T.



TAB. X.



TAB. X .

T A B U L A X.

F I G U R A P R I M A.

S Tomachus cum ventriculo, à parte prior.

ABC Stomachus, A statim infra pharyngem, ut videtur, resectus.

C Locus, ubi stomachus in ventriculum migrat: ex quo ostium intus oritur, quod cardia appellatur.

DD Ventriculus.

E Portio membranae exterioris ventriculi, detracta de eo, & reflexa.

F Ventriculi membrana secunda, quae carnea.

Lineae, per quas expressa est, nullam aequae referunt, ac carneam. An vero pro *crusta villosa* habuit Boerhavius in institutionum §. 77? Jam antea Morgagnus indicaverat in epistola ad Lancisium, *exteriore sublata ventriculi tunica, ita ejus circulares fibras hic ostendisse, ut Willisii industriam in tabula III. ventriculi concinnanda praeverterit.*

G Membrana, ut opinor, illa, quae continuata membranae externae ventriculi, principiique duodeni, ab iis ad jecur pertinet. **H** Membranae illius ora libera, à pyloro ante duodenum ad jecur pertinens.

I Membrana, ut opinor, illa, quae continuata membranae externae ventriculi, ab eo ad pancreas pertinet.

K Ejusmodi peritonaei partem invenio, quae stomachum, ubi is per diaphragma penetravit, finitimamque sinistram ventriculi partem, annexit à superiore parte ad diaphragma, aliisque etiam ad jecur: à latere autem sinistro, ad vicinam superiorem lienis partem.

GHIK Hae membranae quid sint, postquam diu multumque in corporibus quaesiveram; visum est, esse illas, quas dixi.

Pylori locus plenius apparet in figura III. D.

F I G U R A S E C U N D A.

AAA Jecoris pars prior sursum reflexa, exhibitaque parte interiore, quae sinuata.

B Ligamentum rotundum, in quod versa vena umbilici.

C, C Referunt ramos illos, qui à ramo venae portarum ad venam umbilici pertinente ducuntur in jecur, juxta venam umbilici.

Lancisius, *venam esse umbilicalem dissectam.* Bianchus autem, historiae hepaticae animadversione ad figuram III. tabulae suae VIII, *an Eustachius pro trifido vase illo, seu in tres ramos, ad ingressum in hepar diviso, venam umbilicalem significare voluerit, probi anatomici viderint.* Ad quae Morgagnus primum notavit haec, in epistola anatomica I. 74. *Illud primum, quod Lancisium, opinor, movit, ex anatome perspicuum est, nullum eo loco vas ejusmodi crassitudinis subire jecur, praeter venam umbilicalem. Neque aliud voluisse Eustachium, altera ejus figura demonstrat, quae in proxima ipsius tabula sequitur, ac numero IV. designatur. Si enim hanc eodem quo illa posita, locatam fingamus, sique jecoris fissuram, si isthimum, summae fissurae latera committentem, in utraque attendamus; ut in hac ibi nullum aliud vas, nisi umbilicalem venam, membrano liga-*

mento annexam, ostendisse videbimus, sic in illa quoque nullum aliud ibidem vas, nisi eandem venam, ab ligamento jam liberatam, voluisse Eustachium ostendere, non difficile coniciemus. Cur autem in vena illa, sic liberata, & fortasse etiam versus jecinoris limbum aliquantum protracta, supremam partem pinxerit trifidam, sive singulos se minores ramos ab singulis lateribus in hepar mittentem; certam quandam mihi posse videor ex anatome conjecturam asserre. Ac deinde egregie explicat paragrapho sequente: Solitum se esse, inquit, invenire, sinum venae portae, cum à dextero jecinoris lobo ad sinistrum se extendens, contra interjectam utrique lobo fissuram pervenit, se ipsum, aut potius quandam quasi ramum ex ima sui parte deorsum mittere, qui obviam scandentem umbilicalem venam mox infimo suo extremo sic excipiat, ut non facillimum saepe sit utriusque fines statuere, praesertim cum venae summa pars (quod nonnunquam observaverit) non prorsus adhuc in adultis occlusa est. Ex ejusmodi igitur ramo, in quem ipsa umbilicalis vena recta produciunt, & quidem prope hujus venae finem, cum alios minores ramos ab anteriore, seu superiore facie oriri, tum duos praecipuos ab lateribus recedere, singulos ab singulis; ut haud raro, extrinsecus inspicendo, non absimilem effici figuram viderit ac si vena umbilicalis in fine trifida esset, quemadmodum ab Eustachio in eo iconismo videatur repraesentari. Etsi vero ramum illum sinus, duobus ramis interjectum, prae his invenire solitus sit crassorem, quam Eustachius delineavit; ab singulis autem lateribus non singulos semper praecipuos ramos, sed binos interdum compererit; saepe vero non sursum, sed deorsum potius oblique ductos invenerit; nunquam tamen haec quaevisse (quaevisse autem in adultorum jecinoribus saltem decem) quin si extrinsecus spectaret, illa se se sibi species offerret venae umbilicalis quae in summo hinc, & hinc ramos emitteret; si vero intrinsecus scrutaretur, sinus caveam deprehenderet se se manifesto demittentem in occursum illius venae, usque ramis initium praebentem. Et mox subjicit, eos, qui ducta jecoris fissura, huiusque isthmo; ne ulla ex parte obset, dissecto, umbilicalem venam ad suum usque finem persequentes, qui rami denique hinc, & hinc in summae fissurae latera, eamve viciniam immittantur, inquirant; mox autem trunco venae portae, & continuato sinu à sinistris aperto, sectionem ad venam usque umbilicalem deducant, eorum quos dixerit, ramorum oscula perquirentes: eos, si in istiusmodi perquisitionibus fuerint diligenter versati, cum facile secum conjecturos quid Eustachius per trifidum illud vas significare voluerit, tum percepturos, cur ejusdem vasis truncum Lancisius venam umbilicalem appellavit.

D Isthmus jecoris. Sub quo sinus est, per quem ducitur venae portarum ramus ad venam umbilici pertinens.

E Cista fellis.

F Canalis cysticus.

G Canalis hepaticus.

H Canalis choledochus.

II Venae portarum truncus.

K Arteria hepatica; quae antequam in jecur penetret, in ramos duos dividitur. Vide v figuræ 11. tabulae xxvii, & l figuræ 1.

Reliqua viscera à parte priore exhibita sunt, positu integro.

LL Ventriculus.

MMM Venae & arteriae gastro-epiploicae dextrae & sinistrae, continuatae in-

inter se, ut e p figurae 11. tabulae xxvii. Ab iis rami in ventriculi partem ducuntur priorem N, N, N, N, N, N, & posteriorem O, O, O, O, O.

Trunci earum non comitantur se alter alterum, ut figura 11. tabulae xxvii. Videatur fortasse illo modo tanquam inhaerentes omenti principio exhibere in hac decima voluisse. Ni quid potius de flexuoso vasorum ductu suspicari libeat. Certe vasa in ligamento uteri rotundo eodem modo exhibuit in figura 1. tabulae xiv: flexuosa autem in tabula xiiii. ζθ, & κξ.

P, P, P, P, P Rami venae & arteriae coronariae ventriculi.

Q Continuati rami, alter venae coronariae, alter gastro-epiploicae sinistrae.

R Lien.

SS Mesocolon.

Omenti portionem Lancisius. Est, quam *inferiorem omenti membranam* Vesalius vocat; & ejus quidem pars illa, quam *mesenterii loco ipsi colo intestino esse* tradit, qua id *ventriculo exporrigitur*: de qua agit in capite iv. libri v. de humani corporis fabrica. Haec membrana, quae mesenterii pars est, quam mesocolon nunc appellamus, primum pone ventriculolum sita; qua parte deinde infra ejus fundum ad colon pertinens est, ea exhibita hic est. Fortasse Lancisius à *ventriculi fundo propendere*, membranae illius melius designandae causa, tradit: illam scilicet, quae à loco fundi illius veluti *propendere* in icone appareat, omenti portionem esse. *Revera propendere* voluisse vix credam. Ignorare enim non potuit, à fundo ventriculi *propendere* omenti membranam illam, quam *superiorem* Vesalius vocat; eamque, contra quam in hac icone membrana illa de qua dicimus, *propendere* à ventriculo inde ubi vasa gastroepiploica MMM secundum fundum ventriculi ducta. Mesocoli portionem esse, confirmare glandulae possunt, quae hic inscriptae.

T, T, T, T, T Venae & arteriae mesocolicae.

V, V, V, V, &c. Glandulae mesocoli.

WXY Intestinum colon: cujus hic X flexus est juxta jecur. Y Hic colon lienem subit.

Z Unum ex ligamentis, quae per coli longitudinem ducta.

aaaa Jejunum, & ilium.

bcd Intestinum colon. c Ejus flexus, qui circa pelvem est. d Flexus postremus.

e Intestinum rectum.

f Unum ex ligamentis coli, quae per longitudinem ejus ducta sunt, ex filis rectis constantia. g Hac parte latescit, fitque carnosus; eique adjunguntur h, i coli ligamenta reliqua duo, similiter latescencia, ac carnosiora: unaque ex iis k vagina fit carnea, ex filis rectis constans, quae intestinum rectum continet.

l: m Levatores ani.

n Sphincter ani.

Sphincterem internum indicare voluisse videtur, alium omnino atque ilium, cui p tabula xxxvii. inscripti: ut qui externus est. Neque tamen Santorium scripsisse ignoro, à se ipso Eustachium *diversum esse, dum eundem sphincterem*, quem scilicet tabula xxxvii. exhibeat, eodemque posuit in hac tabulae x. figura 11. & 1v. *alter delineet*. Observationum capite x. §. 111.

o Locum, cui prostata adjacet.

p Anus.

FIGURA TERTIA.

Stomachus cum ventriculo, duodeno, & pancreate, à parte posteriore. Stomachus & ventriculus iidem, qui figura 1.

A Stomachus.

B Locus oris ventriculi, quod cardia vocatur.

CC Ventriculus.

D Ventriculi & duodeni confinium, ubi duodenum incipit. Qui locus extrinsecus strictior est; intusque ibi os ventriculi, quod pylorum appellant.

E Intestinum duodenum, F hic truncatum.

GHI Pancreas. GH Hac parte situm pone ventriculum; HI hac ad duodenum applicatum.

KLM Canalis choledochus. K Ejus principium truncatum. L Hac parte per pancreas pertinet. M Hac in duodenum penetrat.

Quomodocunque hanc iconem confidero, nihil, fateor, invenio, ex quo de canali pancreatico, aut de quadam ejus parte suspicari quid possim. Si quidem quaecunque in pancreatis imagine sunt lineolae, & puncta, & umbrae, nil nisi glandulosam illam inaequabilem pancreatis speciem significare possunt. Quid igitur *suspicionem praebere* Lancisio potuit, *Eustachium non latuisse ante Wirsungum à pancreate proprium ductum una cum choledoco intra duodenum ferri*? Canalem certe, cui K apposui, *ductum choledocum* esse ipse tradit.

FIGURA QUARTA.

Intestina crassa, positu integro, à parte priore.

A Extremum intestinum ilium, non longe à colo truncatum.

B Intestinum vermiciforme, caecum multis.

C Crassorum caput, hoc est, principium: quod aliqui caecum appellant.

DEFGHIK Colon. E Ejus flexus, qui juxta jecur est: F qui juxta lienem: I qui circa pelvem: K postremus.

L Rectum.

MMMM Ligamenta, quae per longitudinem coli ducta, ex filis rectis constantia.

Ad hanc, & ad quintam, Valsalva, qui optime de re anatomica est meritis, notavit in dissertatione anatomica I. I. VIII. *Eustachium, si verum fateri velimus, duas tantum productiones (nempe fibrarum carnearum intestini recti per totum colon) cognovisse videnti, non tres, ut revera observentur: & ni fallatur, quae sub mesocolo lateat, illam nempe quae ipsum latuerit, productionem fuisse.* Tres autem cognovisse colligere ex hoc possumus, quod in hac IV. figura, & in V. & II. praeter mediam illam, manifestamque, indicia infra exhibeat à lateribus ejus secundae & tertiae: quarum hoc intestini positu apparere plus nequit.

N Inde ligamentum hoc sensim dilatatur, fitque carnosius. Eique adjunguntur O, P coli ligamenta reliqua duo: quae similiter & latelescent, & sunt carnosiora. Unaque ex his tribus fit Q vagina carnea, quae ex filis rectis constat, rectumque intestinum continet.

R: S Levatores ani.

T Sphincter ani.

V Ex-

- V Extremum intestini recti.
W Ani interiora.

FIGURA QUINTA.

Eadem crassa intestina, similiter à parte priore. Varietatem exhibet tum situs capitis crassorum, tum flexuum ductusque coli. Quae omnia cognosci facile possunt, si haec icon cum proxima superiore conferatur.

Fortasse Lancisius *delineare intestina crassa facie postica* ob hanc causam putavit, quod coli flexus inferiores duo contraria ratione positi, atque in figura iv. Sed satis, puto, ex situ capitis crassorum, extremique ilium, non à parte posteriore expressa hic esse apparet, sed à priore.

- A Intestinum vermiforme, B continuatum capiti crassorum.
C Vagina carnea recti, è ligamentis coli nata.


P

T A-


[illegible]

- I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I will try to write to you more often. I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I will try to write to you more often.

2-35



TAB. XI.



T A B U L A X I.

F I G U R A P R I M A.

Mesenterium cum venis, arteriis, & glandulis mesentericis, intestinisque. Explicatum est, intestinaque in circumferentiam reclinata.

AAA Intestinum colon in superiora reclinatum.

B Unum ē ligamentis coli.

Vide **M** figurae **iv.** tabulae **x.**

CCC Jejunum & ilium, in circumferentiam reclinata.

D Coli flexus, qui circa pelvem est, posito integro.

E Ligamentum coli.

Vide **M** figurae **iv.** tabulae **x.**

F Rectum, posito integro.

Videri potest indicasse in eo vaginam carneam ē ligamentis coli natam : quae plenius in figura **ix.** **iv.** & **v.** tabulae **x.**

G Mesenterium explicatum, sed tamen rugosum. **H, H, H, H,** &c. Rugae, seu plicae ejus, non plane explicati.

II Arteria mesenterica superior.

Eam esse, haud obscure ex figura **ix.** & **iv.** tabulae **xxvii.** comparatione facta apparere posse videtur.

K Vena mesenterica. Vena haec, & arteria mesenterica superior concomitantur altera alteram, unaque quaquaversum in mesenterium ramis suis ductur.

L, L, &c. Rami earum, qui continuati non esse videntur, ob plicas mesenterii.

Quominus venas cum arteriis comitibus haec esse putemus, non multum obstat hoc, quod vasorum alterum altero ita exilius exhibitum non est, ut arteriam vena comite exiliorem soleat. Nam sic quoque hac ipsa in icone ramos aliquos venae & arteriae mesentericae minores videmus, ubi arteria vena comite exilior non est. Fortasse in exprimendis ramis illis, qui ob plicas mesenterii interrupti esse videntur, fuit incuriosior.

M, M, M, M, &c. Glandulae mesenterii.

F I G U R A S E C U N D A.

Pancreas cum mesenterio.

A Pancreas.

Habitu hoc non absimile est pancreati figurae **ix.** tabulae **x.** & ad superiorem partem mesenterii, ut pancreas, locatum est.

BBB Mesenterium totum, tum qua parte ei jejunum & ilium adhaerent, tum qua crassa. Positus integer, à parte priore.

CC Pars pancreati adhaerens.

DEFGH Huic orae intestina adjunguntur: à **D** ad **E**, jejunum & ilium: ab

E per **FG** ad **H**, crassorum caput, colon, rectum.

I, I, I, &c. Glandulae mesenterii.

K, K, K, &c. Plicae mesenterii non plane explicati.

P 2

F I.

FIGURA TERTIA.

A A Jecur à priori parte, positu integro.

B Ligamentum jecoris latum. CD Per hunc ductum adhaeret jecori: E per hunc ligamento rotundo.

F Ligamentum jecoris rotundum.

FIGURA QUARTA.

Jecur à parte sinuata.

AB Jecoris pars sinuata. A Pars sinistra, B dextra.

C Ligamentum, per quod jecoris pars sinistra annectitur ad sinistram diaphragmatis.

Hoc, & cui E inscripti, ligamenta esse, quamvis dubium mihi primum fuerit, tamen, quum ante oculos jecur habui, inclinari me sensi ad credendum, illa esse, quae dixi.

DDDD Hinc resectum peritonaeum, quo jecur ad diaphragma proxime alligatur.

Alligatur dexter renis, tum septo transverso, tum jecori; illi, prope eam regionem, in qua jecori nascitur. De renibus capite XIII.

E Ligamentum, per quod dextra jecoris pars alligatur diaphragmati.

Nec procul ab eo vinculo, quo hepar in dextra parte septo annectitur. De renibus capite XIII. Qui locus huc pertinere posse visus est.

Vide annotationem ad C.

FH Vena cava inferior: resecta F supra jecur, & H infra.

G Portio jecoris, quae venam cavam complectitur.

II Sinus, per quem in embryone pertinet canalis venosus: qui postea ligamentum fit. Eidem sinui, oraeque sinus proximi K, adhaeret omenti portio, interjecta oris ventriculi.

K Sinus, in quem venae portarum, arteriae hepaticae, & canalis hepatici rami pertinent, qui in sinistram maxime jecoris partem ducuntur.

L, M Jecoris eminentiae, inter quas vena portarum penetrat.

Inter G I I L M H Spigelii quem appellant lobulum.

N Vena portarum, ante jecur resecta.

O Canalis hepaticus.

P Canalis choledochus.

Q Canalis cysticus, qui cum hepatico conjungitur.

R Cista fellis, quae fundo suo dependet infra jecoris oram.

SSS Per hunc tractum jecori adhaeret peritonaeum, qua reni dextro superinductum crassius est, ac duodenum & colon ad jecur per id alligantur.

Alligatur dexter renis, tum septo transverso, tum jecori, — huic, in sinum ejus partem membraneo vinculo injecto. De renibus capite XIII.

Quamquam à viris clarissimis non nisi aegre dissentio, & tunc dissentio acrius, quum obscuritas aut ruditas figurae nonnullam in dubitationem adducere nos potest; hic tamen aliter, atque iis potuit, mihi videtur. Equidem quum illud, quod inter cistam fellis & lineas, quibus SSS apposui, interjectum est, considero, & cum cista comparo, talem esse speciem fateor, ut videri omnino posset exterior cistae tunica detracta esse, superque je-

jecur explicata; quamvis tamen angulus ille juxta S mediam non ita respondet. At contra, quum idem illud, quod tunica videri illa possit, jecori continuatum apparere ibi loci, ubi S mediam apposui, considero; atque etiam evidentius à superiore parte inter cistam & locum illum, cui S superiorem apposui; diffiteri nequeo, jecur videri potius, quam membranam quandam de cista detractam, superque jecur explicatam: cujusmodi membranam exprimere si voluisset, lineis eam ad loca illa duo, quae dixi, terminaturus, eoque à jecore distincturus fuisse videretur. Quum deinde ad hoc attendo, circa illum locum, cui SSS apposui, jecori peritonaeum adhaerere, qua reni dextro superinductum, quaque duodenum & colon ad jecur alligat; atque illo quidem ductu, quem icon exhibet, & saepe alias adhaerens invenisse me, & nunc etiam videre; ac simul perpendo quod Eustachius in tractatione de renibus capite XIII. scribit, *alligari dextrum renem jecori, in sinum ejus partem membranae vinculo injecto*; videor mihi non temere, neque levi conjectura ductus, illum ipsum locum, ubi *vinculum* illud *injectum* sit, hic significari existimare; ubi nimirum, quod ex corporibus descripti, adhaeret peritonaeum, qua reni dextro superinductum crassius est, quaque duodenum & colon ad jecur alligat: quamvis alia atque alia loci illius aliis atque aliis esse soleat forma.

T Isthmus jecoris, sub quo sinus est, continuatus illi, cui V adscripta. Sub isthmo, tanquam ponticulo, per sinum ducitur ramus venae portarum ad venam umbilici pertinens.

V Sinus jecoris, per quem pertinet in embryone vena umbilici; postea, in quod vertitur, ligamentum rotundum.

W Fissura jecoris, venae umbilici in embryone non impediendae causa.

X Ligamentum rotundum.

Y Ligamentum latum, rotundo per longitudinem adhaerens.

FIGURA QUINTA, SEXTA, ET SEPTIMA.

An lienis? Difficilis de his conjectura.

FIGURA OCTAVA.

Lien, gibba parte expressus.

FIGURA NONA.

Idem lien, à parte sinuata.

A Sinuata pars, qua ventriculo adjacet.

BB Incisura esse videtur, ubi ad lienem membrana adhaeret, qua ventriculo alligatur; atque arteriae venaeque ac nervi in lienem penetrant: nisi indicium sit adhaerentis membranae illius.

Et si Eustachio plurimum libenter tribuo, dissimulare tamen nequeo, quoties in liene hominis has lineas quaesivi, toties nihil me invenisse, ex quo suspicari hoc possem, quod proponit Lancisius, *an in viventium, quae interdum secuerit, animalium lienibus vasa lymphatica subolfecerit*: neque persuadere mihi potui, *vasa nonnulla esse*.

FIGURA DECIMA.

Rene medio per latitudinem à parte gibba simam versus aequaliter dissecto, diductae partes illae duae. Itaque ut reliquum renis, sic papillae, pelvis rami, ipsaeque pelvis bipartita.

AA Exterior renis pars.

BBB &c. Pars renis, quam corticem appellare possumus. Extrinsecus papillas continet, interfertaque iis.

C, C, &c. Papillae: in quibus lineae, hoc est, fistulae uriniferae. D, D, &c. Extrema papillarum, quae inserta in extremos pelvis ramos.

Laxa est & inaequalis renum substantia, qua parte rami vasis urinarii desinunt; ibi enim caruncula quaedam parvam glandulam referens est, cuique eorum ramorum extremo, instar operculi circumposita: has vero carunculas, si secunda earum longitudinem diffecaveris, mirum tibi naturae artificium fiet manifestum, omnibus fere aliis anatomicis incognitum: nimirum videbis quosdam sulcos & canaliculos, non secus ac pilos tenuissimos, elegantissime in iis exsculptos, per quos non dubito, lotium in urinarii meatus ramos percolari; num autem ejusmodi canaliculi, à tenuissimis venis & arteriis fiant; an in ipsa renum substantia, perinde ac foramina in papillas mammillarum, sint excavati, difficile est ex anatome judicare. De renibus capite VII.

E, E, &c. Pelvis rami.

F Pelvis. G Hic angustata, & in ureterem migratura.

FIGURA UNDECIMA.

Vesica, una cum urethra, continuo per longitudinem ductu à priori parte incisa est, & diducta.

A priori parte incisa esse, ostia declarant ureterum D: D.

AA Vesicae pars exterior. BB Pars incisa. C Capacitas.

D: D Ostia ureterum, quibus in vesicam patent.

Vasa urinaria in posteriorem vesicae partem, à glandula, & à se invicem spatio duorum digitorum distantia, inseruntur, quae oblique deorsum per ipsius vesicae corpus, quanta est latitudo parvi digiti, ad interiora producta, in ejusdem vesicae cavitatem penetrant, nullaue membrana, aut operculo proprie obducuntur, sed obliquum ingressum solummodo in vesicam faciunt, ejusdem substantia laxata aut perforata, cujus beneficio urina sponte in eam confluit, retro vero commeari nequit. De renibus capite XX.

E: E Ureteres.

Integro non sunt positu. Confer tabulae XII. figurae VII. W.

F: F Vasa deferentia.

Integro non sunt positu. Confer tabulae XII. figurae VII. Z: Z.

G: G Vesiculae seminales.


Integro non sunt positu. Confer tabulae XII. figurae VII. a: a.

HI Urethrae interiora.


KK Corpus spongiosum urethrae incisum una cum urethra.

An incisam quoque cum iis prostatam exhibere voluerit circa vesicae quam vocant cervicem; quamvis non alienum videatur suspicari, tamen ob figurae ruditatem non satis liquet.

T A-



TAB. XII.



T A B U L A XII.

FIGURA PRIMA.

H Acc, quantum ad renes, renes quos vocant succenturiatos, truncum aortae & cavae, arterias & venas emulgentes, earumque ramos, respondet primae tabulae primae.

A Renis dexter est major, quam *Æ* sinister; parte superiore uterque aequalem fere altitudinem habet; sinister enim nonnihil dextro est elatior, inferiore dextro sinistro est humilior, & hoc evenit propter magnitudinem; cujus causa sinister altior dextro dici potest.

BB: **BB** Vas urinarium dextrum, & sinistrum.

C: **C** Glandula reni dextro incumbens, forma, figura, & substantia ei respondens, major est, quam sinistra. Glandula reni sinistro incumbens, similis dextrae; sed ea minor.

DD Venae cavae truncus.

EE Arteriae magnae pars.

F Venula orta à dextra parte cavae venae supra emulgentem, & in pinguem dextri renis membranam distributa.

G Venula, vel à cava, vel à suprema parte emulgentis dextrae ortum ducens; quae partim **H** in glandulam reni dextro incumbentem; partim **I** in supernam regionem substantiae renis distribuitur.

K Vena emulgens dextra humilior, brevior, & magis obliqua, quam sinistra. Solet in hominibus & in simiis una vena unaque tantum arteria utrique reni magna ex parte contingere. De renibus capite xv.

Consueverunt venae & arteriae renum magna ex parte non prius in ramos discindi, quam eorundem cavum ingressae sint. De renibus capite xvii.

L Arteria dextra emulgens.

M Arteria emulgens sinistra.

N Vena emulgens sinistra, altius orta, longior, & minus obliqua, quam dextra.

Vena, quae sinistrum renem adit, ex superiore & inferiore sede ramos emittit; ex superiore ut plurimum consuevit, alterum quidem **O** in medio suae longitudinis ductu, alterum vero **R** juxta ipsius insertionem producere; ex quibus prior **O** in superiorem partem membranae pinguis, usque ad renis longitudinis medium **Q**, & in ipsam glandulam reni incumbentem **P**, ac denique in ipsum septum transversum (*Θ* tabulae xxv. n^o. ii.) furculos spargit, qui interdum insignes occurrunt, & cum ejusdem septi venis, mira naturae solertia, coeunt atque uniuntur; posterior vero idemque superior ramus **R**, in humiliorem pinguis tunicae regionem digeritur; inferiore vero loco emulgens vena ex media sede vas seminarium **S** producit; quod etiam dextra, raro tamen, imitatur: multo vero rarius in utraque simul emulgente hoc fieri conspiciamus: & haec quidem ea vasorum distributio est, quae frequentius occurrit. De renibus capite xvi.

O Venula à superiori latere sinistrae emulgentis venae in medio ductu nata; quae distribuitur partim **P** in glandulam reni sinistro incumbentem; partim **Q** in superiorem regionem pinguis tunicae renis.

R *Venula originem ducens à superiori latere emulgentis sinistrae juxta venem; disseminata in inferiorem partem pinguis tunicae ejusdem.*

S *Vena seminaria sinistra, orta ab emulgente.*

T *Vena seminaria dextra.*

U: V *Arteriae seminae.*

W: W, W An vasa spermatica conjuncta inter se per membranam, quam cellulofam nunc appellant?

X, X, X: X *Arteriarum & venarum spermaticarum conjunctiões.*

De ramis, quos arteriae & venae spermaticae, antequam ad testes pervenerint, emittunt, vide Z & 30. tabulae xxv. n°. 11.

Y: Y *Funiculi vasorum spermaticorum.*

Z *Arteria inferior mesenterii.*

a: a *Arteriae iliacae.*

b, b: b *Venae iliacae.*

c: c *Venae hypogastricae.*

d, e: d, e *Radices ramorum venarum hypogastricarum, qui expressi tabula xxv.*

A: A n°. 11. *Comparatio docere videtur.*

f: f *Venae, quae X tabulae xxvi. n°. 11.*

g: g *Venae, quae ab hypogastricis emissae, ad vesicam pertinent.*

h *Alia vena ab hypogastrica sinistra emissae; quae ad vesicam pertinet, ramisque cum ramis superioris g crebre conjungitur. Hujus loco in dextro latere*

i *Vena, quae ab iliaca dextra infra hypogastricam emissae, ad dextram vesicae partem pertinet, conjungiturque, ut illa, cum superiore g.*

k *Vena insignis, nata ex ramis venarum g, g, h, i ante prostatam confluentibus.*

l: m *Venae ab hypogastricis emissae, quae cum vena k ad radicem penis conjunguntur. Ex quo fit*

n *Vena azyga, per longitudinem dorsi penis ducta.*

o: o *Arteriae hypogastricae.*

p: p *Radices arteriarum umbilici.*

q: q *Rami arteriarum hypogastricarum, qui comites venarum f: f. Idem, qui comites venarum X tabulae xxvi. n°. 11.*

r: r, s: s *Rami arteriarum hypogastricarum, qui cum venis g: g, h: i ad vesicam pertinent, ramisque suis conjunguntur inter se.*

t u: t u *Arteriae ab hypogastricis emissae, quae ad priorem partem radicis penis pertinent, ac deinde u: u venam azygam n per dorsum penis comitantur.*

v *Vesica.*

w *Ligamentum, in quod urachus versus.*

x x *Prostata.*

y: y *Capita penis.*

Lancisus, esse *musculos penis, erectores nuncupatos.* Capita penis, quibus ab ossibus pubis oritur, ni fallor, video, rudi modo indicata. Praeterea in dextra parte nullam video notam, ex qua de erectore suspicari possim. In sinistra videri possit cum capite penis erector exhibitus esse, distinguente quasi lincola per longitudinem ducta.

z *Bulbi urethrae rudem adumbrationem esse puto.*

α *Penis.*

β: β *Vasa deferentia.*

γ: γ *Epididymides.*

δ: δ *Testes.*

FIGURA SECUNDA.

Testis dexter à parte priore.

a Testis.

b Vas deferens.

c Epididymis.

d Alterum horum vasorum videtur esse vena spermatica, alterum arteria.

e, f, g Rami per vas deferens.

f Hic continuatio est rami f figurae v.

g Hic continuatio rami e, vel g figurae v.

h, h, h Rami, qui ducuntur per membranam testis, quae vocatur albuginea.

FIGURA TERTIA.

Haec, quantum ad renes, truncum aortae & cavae, arterias & venas emulgentes, ac spermaticarum principia, respondet secundae tabulae primae.

A: B *Secunda figura renem sinistrum B habet majorem, & altiore dextro A; licet propter magnitudinem hic videatur esse humilior.*

CC *Vena cava.*

D: D *Venae iliacae.*

EE *Arteria magna.*

F: F *Arteriae iliacae.*

G: G *Venae emulgentes.*

Vena emulgens dextra altius oritur, quam sinistra; ac simul cum arteria in quatuor ramos dividitur; & ante divisionem producit venam seminariam.

Vena emulgens sinistra humilior oritur, quam dextra; ac simul cum arteria in quinque ramos dividitur, & ante divisionem duo principia venae seminariae producit.

Per saepe venas & arterias renum in medio ductu in duos aut tres, nonnunquam etiam in quatuor aut quinque aequales ramos solvi observavimus, qui quidem rami ad renes, qua parte simi sunt, producti, quasi anchoris quibusdam jactis in eorundem cavitatem inseruntur. De renibus capite XVII.

HH: H *Arteriae emulgentes.*

IKL *Vena seminaria sinistra L duobus principiis I, K ab emulgente orta: quod saepe accidit; quamvis vena emulgens in tot ramos, quot vides, semper non sit divisa.*

MNO *Venae seminariae dextrae O duo principia; alterum M ab emulgente, alterum N à vena cava.*

P: QQ *Arteriae seminae.*

R *An vasa spermatica conjuncta inter se per membranam, quam cellulofam nunc appellant?*

S, S *Arteriae & venae spermaticae conjunctiones.*

T *Arteria mesenterica inferior.*

UU: UU *Ureteres, juxta vesicam rescissi.*

V: V *Vesiculae seminales.*

W *Caput gallinaginis.*

X *Ostiola duo, quibus in urethram patent canales, per quos semen in eam è vesiculis seminalibus, vasisque deferentibus, penetrat.*

Y: Y *Vasa deferentia.*

R

Z: Z

Z: Z. Spermaticorum vasorum funiculi: quibus adiunguntur vasa deferentia, ab epididymidibus profecta.

a: a Epididymides.

b: b Testes.

FIGURA QUARTA.

Haec, praeter pauca, in totum est eadem, quae quinta tabulae quartae. Vide & de renibus caput x.

In hac indicata origo arteriarum, quibus K: Q inscripti; quod praetermissum in figura v. tabulae iv. Ex quo conicere possemus, hanc tabulae hujus xii. post illam tabulae iv. confectam, & emendatam esse. Adde quod in hac additae sunt radices arteriarum spermaticarum, venae spermaticae dextrae, arteriae mesentericae inferioris; quae itidem praetermissae in figura v. tabulae iv. Idem conicere possemus de figura vii; in qua indicata origo arteriae I: praetermissa in figura iiii. tabulae i.

Quandoque vidimus tres renes, A unum scilicet in dextro latere, qui naturalis erat; B, C duos vero praeter naturam in sinistro.

B Alter sinister ren praeter naturam, admodum parvus; figurae triangulae, & satis depressae, sola substantia similis ei, qui naturalis est, vase urinario, & arteria desinitur.

C Alter ren sinister praeter naturam, in sinistro spinae latere situs est; & à summitate quartae lumborum vertebrae, usque ad ossis sacri initium producit: esque in superiori parte angustior, in humiliori latior; ac vas urinarium ex posteriori sui regione producit; quamvis hoc videri in figura non possit.

D D E E Vena cava. E: E Venae iliacae.

F F G G Arteria magna. G: G Arteriae iliacae.

H, I Duae venae emulgentes dextrae; aequales, & aequae distantes; quae arteriam K K in medio continent.

L Vena emulgens sinistra, satis gracilis, elatiorem originem habens, quam dextra; quae sine ulla comite arteria transversa procedit.

M Vena seminaria sinistra.

N Vena spermatica dextra.

O Arteriae spermaticae.

P Arteria mesenterica inferior.

Q Q Vena orta à cava, è regione secundae lumborum vertebrae; quae transversa sub arteria procedit.

R Vena alia principium sumens parum supra magnam cavae venae divisionem in lumbo; quae etiam sub arteria transversa procedit, & cum praedicta coit.

S Vena ex praedictis duabus conflata; quae inseritur in posteriorem sedem renis, versus externum latus.

T Arteria bipartita, ante, ac retro in superficiem sinistri renis distributa, oritur antequam magna arteria in lumbo dividatur.

U Arteria altera, à sinistro trunco magnae divisionis in lumbo principium sumens; inseritur in humilioris renem sinistrum simul cum vena.

FIGURA QUINTA.

Testis idem, qui figura secunda; sed à parte posteriore.

a Testis.

b Vas deferens.

c c c Epididymis.

d Alterum horum vasorum vena spermatica esse videtur, alterum arteria.

e, f, g Rami per vas deferens: quorum

f Continuatur figura 11. f.

g vel e, continuatur figura 11. g.

h, h Rami per epididymidem.

i, i, i Rami, qui per membranam albugineam testis ducuntur.

FIGURA SEXTA.

Testis, de quo tunica albuginea detracta.

A Pulpa testis nuda. Lineae inscriptae indicare videntur pulpae quandam in particulas divisionem.

BC Tunica albuginea. B Pars exterior. C Pars interior, quae pulpam testis continet.

D, D, D Vasa, quae è tunica albuginea ad pulpam pertinent.

Simples illae lineolae, quarum una à pulpa ad albugineam pertinet, aliae similes in parte interiore albugineae sunt, si quid significant, portiunculas fortasse significant filorum pulpae, detractae albugineae adhaerentes: ni modo indicia sint vasorum.

FIGURA SEPTIMA.

Haec, praeter vesicam cum pene, est tertia tabulae primae.

A Renis dexter est altior sinistro B.

CC Venae cavae truncus.

D: D Venae iliacaе.

EE Arteria magna.

FF Arteriae iliacaе.

G, H Duae emulgentes venae dextrae altius oriuntur, quam duae sinistrae; oblique deorsum, uno digito aequè distantes, ad renem tendunt; quarum inferior est minor superiori: ambae seminariam venam producant.

I Arteria emulgens dextra, cum superiori, & crassiori vena procedens.

Vide annotationem ad principium explicationis figurae 14.

K, L, M Vena seminaria dextra, ex duobus principiis constituta.

N Vas urinarium dextrum.

O, PP Duae venae emulgentes sinistri lateris, magnitudine aequales, figura flexae; humilius oriuntur, quam dextrae: quarum superior satis obliqua deorsum procedit; inferior vero parum, & pene transversa ducitur, ambaeque instar X se interfecant: eminentior enim inferius, humilior vero superius in renem inseritur.

- QR *Arteria emulgens sinistra* ; Q *ad medium usque ductum cum superiori* ;
 R & *inde cum inferiori vena procedens.*
 S *Vena feminaria ab inferiori emulgente orta.*
 T *Arteriae feminariae.*
 U *Inferior arteria in mesenterium distributa.*
 V *Vas urinarium sinistrum.* Cujus pars inferior una cum vesica inversa est.
 W *Ureteris dextri rescissi extremum.*
 X *Vesicae pars posterior* , in eaque fila conspicua , de quibus Eustachius ,
Vesicae propria tunica gemina est , obinetque exterior fibras conspicuas
crassas ac fere carneas , quae adeo variae quoquoversum distribuuntur , ut
intuentibus multarum tunicarum speciem habere videantur. De renibus ca-
 pite XIX.
 Y *Urachi embryonis reliquiae.*
 Z: Z *Vasa deferentia.*
 a: a *Vesiculae seminales.*
 b *Prostata.*
 c: c *Capita penis.*
 Capita penis haec satis referunt. Musculi autem erectoris nullum in par-
 te sinistra apparet indicium: in dextra , obscura quaedam nota in arche-
 typa , praeter caput penis , exhibiti etiam erectoris suspicionem fortasse
 moveat.
 d: d *An acceleratores ? An alterum ad caput penis dextrum pertinet: alterum*
urethrae indicium est ? Ob figurae ruditatem non facile internoscas.
 e *Penis.*
 f *Urethra.*

FIGURA OCTAVA.

Testis per longitudinem dissectus medius.

a, a, a, a *Vasa in pulpa testis.*

b *Hoc quoque vasa refert.*

Caeterum lineis , pulpa testis inscriptis , significare videtur pulpa quon-
 dam in particulas divisionem: ut figura VI.

FIGURA NONA.

Haec similis primae tabulae tertiae , praeterquam parte inferiore.

A *Dexter renis minor est* , & elatior ; B *sinister multo major* , & humilior ;
praesertim in infima sede: nam in suprema ambo parum differunt.

C C *Dextrum vas urinarium* , quod sinistram partem renis usque ad ejus summi-
 tatem perreptat.

DD EE F *Interdum rene existente satis magno* , ut hic *sinister apparet* ; tres
in eo sunt cavitates , in quas *urina colatur* ; una in ejus summitate , non ad-
 modum magna ; altera in medio , praedicta triplo major : tertia in infima
 ipsius sede : & à qualibet earum unus oritur *meatus urinaris.*

DD *Primus meatus urinaris à prima cavitate ortus* ; qui deorsum tendens
 usque ad magnam arteriae divisionem in lumbis , conjungitur cum aliis duo-
 bus meatibus.

EE

- EE Secundus ramus urinarius ortus à media cavitate; qui deorsum oblique fertur, sere usque ad humiliorem sedem renis.
- F Tertius meatus amplus est; & ab ultima cavitate tribus principiis ortum ducit: hic parumper deorsum productus, angustior redditur; & primum cum secundo meatu coit, ac unus cum eo efficitur: deinde cum primo unitus, cum eo unum G vas urinarium efformat.
- HH Vena cava.
- II Arteria magna.
- K Vena emulgens dextra in tres ramos divisa.
- L Vena emulgens alia, duobus digitis sub praedicta originem sumens; quae M venam seminariam dextram producit.
- M Vena seminaria dextra.
- N Vena alia, duobus digitis supra magnam cavae venae in lumbo divisionem, principium ducens, inferitur in humiliorem partem renis simul cum arteria, quae ipsam comitatur.
- OO Arteria emulgens dextra, simul cum prima emulgente vena procedens; in duos inaequales ramos divisa.
- P Arteria alia à trunco dextro magnae divisionis in lumbo.
- Q Vena emulgens sinistra, è regione dextrae ortum ducens; simul cum R arteria in tres ramos dividitur; nullamque seminariam venam producit.
- S Vena seminaria sinistra à cava enata.
- T Arteriae seminariae.
- V Inferior arteria mesenterii.
- W: W Arteriae iliacae.
- X: X Venae iliacae.
- Y: Y Venae hypogastricae.
- Z: Z Arteriae hypogastricae.
- a: a Venae epigastricae. Vide z: z figurae XII. tabulae XXVI. Confer etiam I: I tabulae XXV. n°. II.
- b Haud dubie ramus venae iliacae externae, qui H tabulae XXV. n°. II. in dextro latere.
- c, c Haud dubie rami arteriae iliacae externae, qui comites ramorum venae H tabulae XXV. n°. II. in dextro latere.
- Quum comparisonem facio cum tabula XXV, non videtur alius esse ramus, cui b apposui in hac IX, atque ille, cui H in dextro latere tabulae illius XXV. n°. II: quamvis in ea supra originem non saphaenae modo, sed etiam venae epigastricae oriatur; in hac autem figura IX. è regione principii saphaenae. Quod si haec, cui b in hac figura IX. apposui, sit, cui H in dextro apposui latere tabulae XXV. n°. II; etiam arterias, quibus c, c in hac figura IX. apposui, ramos esse iliacae externae illos, qui comites sunt ramorum venae, cui H apposui in dextro latere tabulae XXV. n°. II, fortasse haud aegre arbitraberis.
- d Ramus venae iliacae externae, & e ramus arteriae, qui H tabulae XXV. n°. II. in sinistro latere. Id ex comparatione judico.
- f Ramus arteriae cruralis, & g venae; qui emittunt ramos M, N, &c. in sinistro femore tabulae XXV. n°. II. Id judico ex comparatione.
- h Ramus venae cruralis, qui in tabula XXV. n°. II. juxta L in sinistro femore. Comparatio indicat.
- i: i Venae saphaenae.
- k: k Venae & arteriae ad scrotum pertinentes. Venae à saphaenis oriuntur.

Lancisus, *detrahta vesica, demonstrare hac figura potissimum videri sanguinea vasa, quae ad posticam ejusdem partem seruntur.* Cui obstat, posita vasa illa maximam partem in icone esse infra locum illum, in quo vesica sita est: infra quem posita esse, id cognoscere licebit, si conferatur haec cum prima. Quantum colligere ex comparatione corporum potui, vasa scroti esse visa sunt.

FIGURA DECIMA.

Est tertia tabulae tertiae.

A Renis dexter sinistro B est minor; qui propter magnitudinem supra elatior, infra humilior dextro apparet.

C Ren succenturiatus.

DEE Vena cava. E: E Venae iliacae.

FGG Arteria magna. G: G Arteriae iliacae.

H Vena emulgens dextra altius orta, quam sinistra, & ea multo gracilior, quae in duos ramos divisa, altero in elatiorem, altero in humiliorem partem renis inseritur; & antequam dividatur venam seminariam dextram producit.

I Vena seminaria dextra.

K Vena altera ad renem producta, quae uno digito sub emulgente dextra ortum ducens oblique sursum tendit; & multo supra insertionem prioris rami memoratae emulgentis, in renem infigitur.

L Tertia vena ad renem dextrum procedens, duobus digitis sub secunda enata, & sere transversa ad renem producta.

MM Arteria dextra supra emulgentem consuetam orta, primo deorsum, deinde sursum procedens, quae in duos ramos divisa, inseritur in renis summitatem.

NNN Arteria dextra emulgens, deorsum cum vena emulgente procedens, & cum infimo ejusdem venae ramo in anteriorem renis sedem inserta.

O Tertia arteria dextra, ortum ducens è regione inferioris arteriae mesenterii, & transversa ad renem tendens.

P Quarta arteria dextri renis, enata in medio magnae divisionis, quae in lumbis sit; oblique sursum ad renis posteriorem, & inferiorem sedem protrahitur.

Q Quinta arteria dextri renis, orta à ramo ejusdem lateris ad os sacrum tendente; sursum oblique ascendens, in anteriorem, & inam sedem renis inseritur.

R Vas urinarium dextrum, in principio satis latum, ex quinque propaginibus constat; licet earum tres solum appareant; quae per anteriora renis egrediuntur.

S Vena emulgens sinistra, inferius orta, quam dextra, ubi arteriam magnam praeteriit, in quinque ramos dividitur; quorum alter T, qui superior est, inseritur, tum in elatiorem sedem ipsius renis, tum in glandulam ei incumbentem; unde postea ramulus ad membranam pinguem egreditur. Secundus

V oblique deorsum tendit, & bipartitus in anteriorem sedem renis circa ejus medium inseritur. Tertius W sursum oblique reseritur; & secundum instar X interfecans, inseritur in anteriorem, & superiorem renis partem. Quartus X deorsum oblique tendens, inseritur in anteriorem, & humiliorem sedem renis. Quintus Y reseritur retrorsum ad lumbum; & inter primam, & secundam ejus vertebrae ad medullam spinalem penetrat.

ZZ Vena alia sinistri renis, à sinistro ramo magnae divisionis in lumbis enata; sur-

superius oblique ascendit, & postquam ramum divisionis arteriae ejusdem lateris praeteriit, in duas propagines dividitur; quae in medio comprehendentes tertiam arteriam sinistram, inseruntur in anteriorem, & humiliores sedem renis.

a Vena seminaria sinistra.

b Prima arteria sinistra ad renem tendens, oritur à regione secundae earum, quas in dextro latere esse diximus. Haec juxta renem bipartita, inseritur cum primo, & cum tertio ramo venae emulgentis.

c Secunda arteria sinistri renis, oritur sub infima arteria mesenterii; bipartitaque prope renem inseritur, altera ejus parte sub medium renem, altera cum quarto ramo venae emulgentis.

d Tertia arteria, oritur paulo ante divisionem magnae arteriae in lumbos; quae inter ramos secundae venae sinistrae procedens, simul cum illis in renem infigitur.

e Arteriae seminae.

f Inferior arteria mesenterii.

g Arteria hypogastrica dextra.

h Vas urinarium sinistrum, ex quinque propaginibus à renibus procedentibus conflatum; oblongam vesicam, instar perae pastorariae recurvatam; refert; aut ibreicium gladium altera parte flexum repraesentat: hoc calculis plenum à nobis est inventum.

FIGURA UNDECIMA.

Respondet quartae tabulae quartae.

A Renis urachus ex pluribus quasi glandulis magnitudine ceraforum coagmentatus; quae invicem junguntur, & alligantur membranae cujusdam tenuis, ac ramorum trium vasorum beneficio. Harum divisiones replet copiosum pingue; quo remitto facile est ejusmodi particulas sine vulnere separare.

In singulas has urachi partes; glandulas referentes, semper ramus venae, arteriae, ac vasis urinarii inseritur.

Quilibet ramus vasis urinarii in latum finem desinit; in quem alia glandula parva, acuta, & nonnihil depressa, ex substantia renis formata, instar operculi ei incumbens, ingreditur.

B Vena, & arteria emulgens.

C Vas urinarium.

FIGURA DUODECIMA.

Haec est secunda tabulae tertiae, praeter unam arteriam mesentericam inferiorem.

A Renis dexter elatior est B sinistro.

C Ren succenturiatus.


DD Vena cava.

EE Arteria magna.


F Vena emulgens dextra, multo altius orta, quam sinistra; simul cum G arteria in tres ramos aequales divisa: qui aequè distantes inseruntur supra renis medium.

H Vena seminaria dextra.

- I** Vena alia emulgens, procedens à cava sub ortu venae seminariae dextrae, quae transversa ducitur; & in renem inseritur sub ejus medium.
- K, L** Duae aliae arteriae, ultra consuetam, cum prima vena emulgente procedentem; ad renem dextrum tendunt. **K** Prima harum duarum arteria oritur supra arterias feminarias; & transversa supra cavam venam procedens, inseritur prope humiliores ramum primae venae emulgentis. **L** Secunda arteria oritur sub arteriis feminariis; & una cum secunda vena ad renem progreditur; ac in eum inseritur.
- M** Vas urinarium dextrum.
- N** Vena emulgens sinistra; major, & humilior orta, quam dextra; ubi arteriam magnam praeteriit, in duos ramos partitur, & singuli rursus in alios dividuntur: altera portio primi rami inseritur in glandulam reni sinistro incumbentem, & ipsam perforat; altera in anteriorem renis partem supra ejus medium dispergitur. Secundus ramus primum gignit venam seminariam: deinde bipartitus, altera parte sursum fertur; & inseritur in renem supra infimam partem primi rami: altera inseritur in eundem renem sub ejus medium.
- O** Vena seminaria sinistra.
- PP** Alia vena sinistra ad renem sursum oblique tendens; oritur à sinistro trunco magnae divisionis venae cavae in lumbo; & inseritur in infimam sedem renis.
- Q** Arteria sinistra emulgens; quae in duas partes dividitur, quarum una fertur, & inseritur simul cum infima portione primi rami venae emulgentis: altera cum secunda parte secundi ejusdem venae rami.
- R** Alia arteria simul cum secunda vena sinistra deducta; ortum ducens à sinistro trunco magnae divisionis in lumbo.
- S** Arteriae feminariae.
- T** Arteria mesenterica inferior.
- V** Vas urinarium sinistrum instar oblongae vesicae satis dilatatum, in anteriori sede renis oblique positum; in quod plures ex rene feruntur meatus, multis interdum arenulis pleni.



TAB. XIII.



TAB. XIII.

T A B U L A XIII.

Loco dextri renis *venae, arteriae, ac vasis urinarii rami per renis substantiam distributi*: ut figura secunda tabulae quintae, cui respondent. Ren sinister cum vena & arteria emulgente, venaque ramis, respondet reni sinistro primae tabulae primae.

AA Vena cava inferior.

BB Arteria aorta.

C Radix venae E figurae 1. tabulae 1, & ω tabulae xxv. n.º 11. Id ex comparatione videtur apparere.

D Vena emulgens dextra. *Vena emulgens, postquam in renem ingressa est, in quatuor EEEEE vel quinque scinditur ramos, qui in multos alios rursus divisi, per renis substantiam vario modo dispensantur; ac invicem permixti ununtur F, F, F, F, &c.; & denique in tenuissimos, visumque propemodum sugientes surculos cessant. Si enim ren incisus comprimat; apparent multae sanguinis guttae, ostendentes vasa, quae cerni non possunt, esse dispersa per renis substantiam.*

GH Arteria emulgens, quae simul cum vena procedens, eandem, quam illa, habet distributionem.

Apparent rami trium vasorum, remota, & abraza tota renis substantia.

Solet in hominibus & in simiis una vena unaque tantum arteria utrique reni magna ex parte contingere. De renibus capite xv.

Confluverunt venae & arteriae renum magna ex parte non prius in ramos discindi, quam eorundem cavum ingressae sint. De renibus capite xvii.

Ubi ambo haec vasa ad sui lateris renem oblique prorepentia in ejusdem cavitate, ut asserui, ingressa sunt, illico in plures ramos, qui magna ex parte quatuor esse solent, eorum utrumque discinditur: ac mirabili quidem artificio, sed multo aliter, quam alii scribant, dispensatur & absuntur. &c. — fere usque ad renis altitudinis medium perveniunt; ubi suis propaginibus multiformiter invicem coeunt & ununtur, quae rursus in alios exiguos surculos divisa, per renem substantiam capillorum modo dispersae tandem obliuescunt. De renibus capite xvii.

I Urinarius meatus (de hominibus loquor, non de canibus) ubi in renem ingressus est, **K** latior paululum evadit, **LL, LL, LL** & in tres ramos praecipuos instar venarum & arteriarum scinditur; eosque in superiorem, inferiorem ac mediam regionem ejusdem renis distributos; ex quibus rursus superior inferiorque in tres alios ramos dividitur, medius vero in duos: hi rami breves & amplis sunt, **M**, &c., finemque potius latiore, quam angustiore instar scyphi aut choanae obtinent, quo glandulam mammillarum papillis similem instar operculi quilibet eorum excipit & amplectitur, eidemque suis fibris undique laxatis adhaeret: evenit etiam frequenter plerisque ex his ramis in medio foraminibus esse pervios, quae non secus ac ipsorum extrema oscula, glandulam quoque admittunt; & haec est vasis urinarii in renes dispensatio, quae frequentius occurrit. De renibus capite xix.

N Vena emulgens sinistra, alius orta, longior, & minus obliqua, quam dextra.

*Vena, quae sinistram renem adit, ex superiore & inferiore sede ramos emittit; ex superiore ut plurimum consuevit, alterum quidem **O** in medio suae longitudinis ductu, alterum vero **P** juxta ipsius insertionem producere; ex quibus*
prior

prior O in superiorem partem membranae pinguis, usque ad renis longitudinis medium, & in ipsam glandulam reni incumbentem (P figura 1. tabulae XII.) ac denique in ipsum septum transversum (Θ tabulae XXV. n°. 11.) surculos spargit, qui interdum insignes occurrunt, & cum ejusdem septi venis, mira naturae solertia, coeunt atque ununtur; posterior vero idemque superior ramus P, in humiliorem pinguis tunicae regionem digeritur; inferiore vero loco emulgens vena ex media sede vas seminarium T. producit; quod etiam dextra, raro tamen, imitatur: multo vero rarius in utraque simul emulgente hoc fieri conspiciamus: & haec quidem ea vasorum distributio est, quae frequentius occurrit. De renibus capite XVI.

O Venula à superiori latere sinistrae emulgentis venae in medio ductu nata; quae distribuitur (partim in diaphragma) partim in glandulam reni sinistro incumbentem; partim in superiorem regionem pinguis tunicae renis. Est Θ tabulae XXV. n°. 11.

P Venula originem ducens à superiori latere emulgentis sinistrae juxta renem; diffeminata in inferiorem partem pinguis tunicae ejusdem. Est Λ tabulae XXV. n°. 11.

Q Arteria emulgens sinistra.

R Ren sinister.

S Vas urinarium sinistrum.

T Vena spermatica sinistra, ex inferiore parte emulgentis sinistrae fere mediae oriens.

V Vena spermatica dextra, ex cava oriens.

W:X Arteriae spermaticae, ex priori parte aortae orientes. Earum, sicuti & venarum, rami recisi, quos emittunt antequam ad uterum, tubas Falloppianas, ovaria, perveniunt. Vide Z & 30 tabulae XXV. n°. 11.

Y:Y,Y An arteriae spermaticae cum venis conjunctae connexaeque per membranas?

Z,Z,Z Medii rami, per quos venae spermaticae cum arteriis conjunctae.

aa: aa Venae spermaticae cum arteriis secundum uterum vaginamque ductae.

Ramos multos emittunt, pertinentes ad ovaria, tubas Falloppianas, uterum, vaginam. b,b,b Indicatum quoque venulas conjungi inter se.

cc: cc Arteriae iliacae.

dd: dd Venae iliacae.

e: e Venae hypogastricae.

ff: ff Arteriae hypogastricae.

g Radix arteriae umbilici.

h h, i, k: h, i, k Rami arteriarum hypogastricarum, ad uterum, vaginam, vesicam. Invenimus ramos eorum conjunctos inter se: ut l: l, l, &c. Invenimus conjunctos cum truncis arteriarum spermaticarum: ut m, m, &c. Invenimus conjunctum cum ramo arteriae spermaticae: ut n. Invenimus conjunctum cum ramo arteriae epigastricae per ligamentum rotundum uteri pertinente ad uterum: ut o. Et cum ramo venae hypogastricae: ut p: nisi infit sculpturae vitium.

q, r, s: q, r, s Rami venarum hypogastricarum, qui respondent arteriarum ramis h, h, i, k: h, i, k, eosque comitantur ad uterum, vaginam, vesicam. Invenimus itidem crebre conjunctos inter se ramis suis: ut t, t: t, t &c. Conjunctos quoque cum truncis venarum spermaticarum: ut u, u: u. Ac cum ramis earundem: ut w, w, w.

Suspicio, per venarum ramos, qui extremo recti intestini, uterique cervici

vici offeruntur, humores in vesicam vel ob eam maxime rationem excerni, quod si rami frequentissimi sint, & cum illis, qui vesicae urinae sunt proprii, vario modo mixti & conjuncti. De renibus capite xxxviii.

- x Rami venarum hypogastricarum, qui per vesicam ducti, ad priorem partem cervicis ejus conjunguntur: acceduntque hypogastricarum rami y:y. Ex qua conjunctione fit vena z, pertinens ad clitoridem.

Hic vitium haud dubie, ut facile potuit, irrepsit in numeros explicationis Lancisii. Nam numeri 70. 20. & 71. 37, quibus vasa hypogastrica, ut videtur, designat, designant venas y:y. Vasa autem illa hypogastrica designant numeri 70. 22. & 71. 35: qui fortasse reponendi.

- α:α Hypogastricarum venarum, & β:β arteriarum rami, qui ad nates penetrant.

γ:γ Arteriae epigastricae.

δ:δ Venae epigastricae.

- ε Ramus venae epigastricae dextrae, qui dividitur in duos: quorum alter ζ per ligamentum uteri rotundum ad uterum pertinet: alter η cum ligamento eodem in pubem.

θ Arteriae epigastricae dextrae ramus, qui comes venae ζ, ad uterum per ligamentum rotundum pertinet.

- ι Arteriae epigastricae sinistrae ramus, qui dividitur in duos. Alteroque κ per ligamentum uteri rotundum pertinet ad uterum: qui ramus respondet arteriae θ dextri lateris. Altero λ cum eodem ligamento pertinet in pubem: cui ramo nullus in dextro latere respondet.

μ Venula, quae deinde divisa in duas ν & ξ; iis arterias λ & κ comitatur ad pubem, utrumque. Respondet venae ε dextri lateris: sed ab epigastrica, ut illa, non oritur.

ο:ο Venae saphaenae.

Γ Clitoris. Δ:Δ Crura ejus.

Θ:Θ Erectores clitoridis.

Λ Cunni pars, quae est inter exitum urethrae, clitoridemque, ac nymphas.

Ξ Vesica.

Π Σ Uterus. Π Cervix. Σ Fundus.

Φ:Φ Tubae Falloppianae.


An simul cum tubis etiam ovariorum ligamenta, quibus ad uterum adnectuntur?

Ψ:Ψ Ovaria.


Ω:Ω Ligamenta rotunda uteri.

Dubitari admodum posset, an praeter vasa constare haec ligamenta ε fibris longitudinalibus, quod Lancisius indicat, voluerit: quum videri lineae illae possint modus esse ligamenta illa exprimendi.

11. 11. 11



TAB. XIII.



T A B U L A XIV.

FIGURA PRIMA.

- AAAA **P** Eritonaeum esse videtur.
 B Intestinum rectum.
 C Uterus.
 D Vesica, cum superinducto, ut opinor, peritonaeo.
 E: E Venae & arteriae spermaticae. De conjunctione earum vide Y tabulae XIII.
 FF: FF Tubae Falloppianae.
 G: G Arteriae crurales.
 H: H Venae crurales.
 I: I Arteriae epigastricae.
 K: K Venae epigastricae.
 L Venae & arteriae epigastricae dextri lateris rami, qui per ligamentum uteri rotundum ad uterum pertinent. Vide ϵ ζ & θ tabulae XIII.
 Vide annotationem ad tabulae x. figurae secundae MMM.
 M Earundem rami, qui cum extremo ligamento rotundo in pubem pertinent. Venam arteria comitatur, contra quam tabula XIII, ubi venae η nulla comes arteria.
 N Vena, quae est loco rami, qui à vena epigastrica dextra ortus, per ligamentum rotundum pertinet. Vide μ tabulae XIII.
 Vide annotationem ad tabulae x. figurae secundae MMM.
 O Ramus venae N, una cum ramo arteriae epigastricae sinistrae ad uterum per ligamentum rotundum pertinens. Vide κ & ξ tabulae XIII.
 Hic sculpturae in tabula archetypa, ni fallor, vitium. Nempe ligamentum Q à vena O lineola distinctum esse deberet, ut est in dextro latere. Confirmat tabula XIII.
 P Ejusdem venae N ramus, una cum ramo arteriae epigastricae sinistrae in pubem cum extremo ligamento rotundo pertinens. Vide λ & ν tabulae XIII.
 Q: Q Ligamenta rotunda uteri. An inter ea uterumque etiam lata uteri ligamenta indicata?
 Vide annotationem ad O.
 R: R Venae saphaenae.
 S Synchondrosis pubis.
 T Clitoris.
 V: V Crura clitoridis.
 W: W Ereectores clitoridis.
 XX Constrictor cunni.
 Y Sphincter ani, cum constrictore cunni connexus.
 Z: Z Glutei magni.
 Γ: Γ Semitendinosi.
 ΔΔ: ΔΔ Adductores magni femorum.
 a: a Graciles.
 b: b Adductores longi femorum.
 c: c Pectinei.

V

d: d

d: d Pfoae magni.
 e: e Iliaci interni.
 f: f Ossa ilium.
 g: g Sartorii.
 h: h Recti crurum.
 i: i Tensores vaginarum femorum.

FIGURA SECUNDA.

ABCC Uterus integer, cum vagina integra, cunniq[ue] parte, à priori parte.
 A. Fundus uteri.
 B Cervix uteri cum CC vagina, cunnoq[ue], ad nymphas usq[ue], & clitoridem.
 D: D Tubae Falloppianae, prope uterum recisae.
 E: E Ligamenta uteri rotunda, prope uterum recisa.
 Confer tabulam XIII.
 Æ: Æ Venae & arteriae, quae per ligamenta rotunda pertinent ad uterum.
 Confer tabulam XIII.
 F Vesica, in latus sinistrum deorsum sic versa, ut appareat pars ejus, quae vaginae adjacet.
 G Ligamentum, in quod urachus versus.
 H Urethra vaginae inserta.
 I: I Ureteres. K: K Ubi vesicae inseruntur.
 L Clitoris. M: M Crura ejus.
 N: N Erectores clitoridis.

FIGURA TERTIA.

Utero & vagina aequaliter per laterum longitudinem bifariam dissectis, partem priorem ex interiore parte exhibet, cum parte cunni.
 Lancisus *vaginam per longum parte posteriori divisam* tradit.
 AA'A' Incisus uterus, BBBB cervix uteri, CCC vagina cum parte cunni.
 D Cavum uteri, triangulare, acquabile.
 E: E Cavi uteri anguli superiores duo, in tubas Falloppianas migrantes.
 F: F Tubae Falloppianae prope uterum recisae.
 G Cavi uteri angulus inferior, qui in cervicem uteri migrat.
 H Cavum cervicis uteri, inaequabile, utrumq[ue] versus angustatum.
 II Pars dimidia ostii, quo cervix in vaginam patet.
 K Cervicis, qua ostium ejus est, tumor in vaginam prominens.
 L Vaginae pars interior.
 M Cunni pars interior, quae inter exitum urethrae, clitoridemq[ue], ac nymphas.
 N Urethrae exitus.
 O: O Sinus ab utroq[ue] exitus illius latere.
 P Pars vaginae insigniter rugosa, ultra exitum urethrae prominens.
 An, quod Lancisio visum, *folliculorum oscula, quae clarissimus postea Malpighius stygmata appellavit, tum supra orificium, tum infra per vaginam distributa in hac & in sequenti IV. figura delineantur?* Et an in iisdem *uterus in cavitate sua interna pertunditur plurimis hiatis exiguis?* quod Boerhavius in institutionibus §. 10CLXIV. i.

F I-

FIGURA QUARTA.

Ejusdem uteri vaginaeque pars dimidia posterior, ex interiore parte.
 AAA Incisus uterus, BBBB cervix uteri, CCC vagina.
 D Cavum uteri, triangulare, aequabile.
 E:E Cavi uteri anguli superiores duo, qui in tubas Falloppianas migrant.
 F:F Tubae Falloppianae prope uterum recisae.
 G Cavi uteri angulus inferior, qui in cervicem migrat.
 H Cavum cervicis uteri, inaequabile, uterumque versus angustatum.
 II Pars dimidia incisus ostii, quo cervix in vaginam patet.
 KL Vaginae pars interior. L Pars, quae juxta anum incipit, rugas habens transversas.

FIGURA QUINTA.

Secundae humanae, quibus embryo continetur, integrae.
 AAA Chorion.
 B Placenta, qua parte ad uterum adnectitur.

FIGURA SEXTA.

Secundae similes dissectae.
 AB Chorion incisum, detractum, inversum. A Pars exterior, B interior.
 CCDD Amnios incisa. CC Pars exterior, DD interior.
 E Embryo, eo posito membrorum, in quem illa in utero componere solet.
 FFG Funiculus umbilici. FF Hac parte nudus: G hac per amnion hic apparet.
 H, H, H, I, I Venae & arteriae ab umbilici funiculo per chorion ramosae. Videntur autem H, H, H venae esse; I, I arteriae; si ex magnitudine & conjunctione colligere licet.

FIGURA SEPTIMA.

Secundae caninae integrae, cum foetu, quem continent.
 AA Chorion, per quod vasa ducuntur.
 B Placenta zonae similis.
 CC Foetus.

FIGURA OCTAVA.

Similes secundae caninae, incisae.
 AA Chorion.
 B Placentae locus.
 CC Allantoïdes.
 DD Amnios, foetum continens.
 Caeterum vasa apparent, quae per has membranas placentamque ducuntur.
 Inter quae E, E venae duae, quas arteriae comitantur.

FIGURA NONA.

Secundae, aut vaccinae, aut ovillae, integrae.

A A A Chorion.

B, B, B, B, B, B, B, &c. Placentulae.

C Locus, ubi intus ad chorion funiculus umbilici definit, undeque arteriae & venae umbilici ducuntur per chorion, ad placentulas pertinentes.

FIGURA DECIMA.

Similes secundae, ac figurae nonae, incisae.

A Foetus.

B B Pars chorii explicata: in qua apparent placentulae, ut figura ix.

C Amnios pars, explicata.

D Funiculus umbilici.







E Vasa, quae ex funiculo umbilici ducuntur per chorion, pertinentque ramis suis ad placentulas.

F Urachus, qui ex funiculo umbilici emergens dilatatur, fitque


G Allantoïdes.

In ovilla allantoïde Fabricius ab Aquapendentè appendices notat, de formato foetu tabula xii. E, E: & tabula xiii. F, F: & tabula xiv. figura xxix. E, E.

2-65



TAB. XV.



T A B U L A X V.

Iconum ordo hac in tabula per appositos numeros perturbatus fuisse videri posset; quum ex re ipsa appareat, post superiores duas ordine partium sequi medias; post has imas. Quod an Pino auctore factum sit, quem numeris, qui ordinem tabularum indicant, signasse tabulas post octo primas, Soldatus in monitis conjicit, hic non expendam. Monendum autem, apparere ex octo primis tabulis posse, Eustachium in ordine explicationis iconum non plane incuriosum fuisse. In tabulae septimae explicatione alium quoque ordinem tenuit, atque iconum in ea dispositio videatur requirere: primum enim mediam explicat, dein superiorem & inferiorem. Ex quo suspicari possemus, etiam in his nuper repertis tabulis, in illis scilicet earum, quibus plures una icones comprehendit, alio, ubi poscat res, ordine explicaturum eas fuisse, atque aut dispositae in iis sint, aut appositis numeris ordinatae. Videtur hoc nobis non modo in hac tabula, sed etiam in aliis, quaedam iconum series indicare.

F I G U R A P R I M A.

Thoracis viscera à parte priori, positu integro.

ABC Larynx. A Epiglottis. B Cartilago thyreoidea. C Cartilago cricoidea.

Inter B & C indicatum videri cuipiam posset ligamentum, quo cartilago thyreoidea & cricoidea hic colligatae inter se. Similiter in figura 11. & 14.

D Aspera arteria.

EFGHI Pulmones. E, F, G Pulmo dexter, ejusque fibrae tres. H, I Pulmo sinister, fibraeque ejus duae. K Lunatus defectus fibrae superioris pulmonis sinistri, cedentis mucroni cordis.

LL Pericardium, cor continens.

MM: MM Pleurarum, qua parte mediastinum vocantur, à sterno & costarum cartilaginibus rescissarum reliquiae.

Nervos esse, hic quoque Lancisius ponit. Non esse, supra jam expositum, ad tabulae 11. s, t.

N Thymus.

O: P Venae subclaviae.

QQQ Diaphragma, à thorace rescissum.

F I G U R A S E C U N D A.

Haec ordine partium post quartam proxima sequitur. Inciso apertoque pericardio, cor cum auricula dextra magnisque venis & arteriis positu integro exhibet. Caeteris maximam partem quartae respondet.

ABC Larynx. A Epiglottis. B Cartilago thyreoidea. C Cartilago cricoidea.

D Aspera arteria.

EFGHI Pulmones in latera reclinati. E, F, G Dextri fibrae tres. H, I Sinistri duae.

X

KKK

KKK Diaphragma, à thorace rescissum.

LLLL Pericardii, quadrifariam incisi, reclinati anguli.

M Cor.

N Auricula dextra cordis.

OO Vena cava superior.

P:Q Venae subclaviae.

R Arteria aorta.

S Pericardium ad aortam adhaerens.

T Radix communis arteriae subclaviae dextrae & carotidis dextrae.

V Arteria carotis sinistra.

W Arteria subclavia sinistra.

X Arteria pulmonaris.

Y Arteria cordis coronaria dextra.

Z Vena cordis coronaria dextra: quae in auriculam dextram patet.

a, b Rami arteriae & venae coronariae sinistrae. lidem, qui V, W figurae 1. tabulae xvi.

FIGURA TERTIA.

Haec partium ordine proxima est à quinta. Exhibet eadem viscera à parte posteriore, positu integro.

ABBCCD Larynx. A Epiglottis. BB Cartilago thyreoidea. C: C Cartilagine aryaenoideae. D Cartilago cricoidea.

E Aspera arteria. F Pars ejus postica tota membranacea. G: G Bronchi, qui & ipsi à posteriore parte membranacei.

HIKLM Pulmones. H, I Pulmonis sinistri fibrae duae. K, L, M Pulmonis dextri fibrae tres.

NN Diaphragma.

O Foramen, per quod stomachus penetrat ad ventriculum: ut videtur.

PP Pericardium, cor continens.

Q Arteria carotis sinistra.

R Arteria subclavia sinistra.

S Arteria aorta, quae circum bronchum sinistram flectitur primum, dein demittitur.

T, T, T Arteriae intercostales.

V Vena azyga, quae inflectitur circum bronchum dextrum, ac deinde demittitur.

Super dextrum truncum arteriae asperae, dextrorsum quidem parum, retrorsum vero multum, versus spinam flectitur. De vena sine pari antigrammate XII.

W, W, W Glandulae bronchiales.

FIGURA QUARTA.

Haec ordine partium post primam proxima sequitur. Exhibet eadem viscera, similiter à parte priore. Sed detracta thymus, cum mediastini reliquiis; ac pulmones in latera reclinati. Pericardium, vena cava superior, & arteria aorta, positu integro.

ABC Larynx. A Epiglottis. B Cartilago thyreoidea. C Cartilago cricoidea.

D Aspe-

D Aspera arteria.

EFGHI Pulmones, in latera reclinati. E, F, G Dextri fibrae tres. H, I Sinistri duae.

K K K Diaphragma, à thorace rescissum.

L Pericardium nudum, cor continens.

MM Pericardii adhaesio ad diaphragma, N ad venam cavam superiorem, O ad arteriam aortam.

P Vena cava superior.

Q Arteria aorta.

R Arteriae aortae ramus, qui est radix communis arteriae subclaviae & carotidis dextrae.

S Arteria carotis sinistra.

T Arteria subclavia sinistra.

V: V Venae pulmonares, in pulmones penetrantes.

Explicat figura v.

FIGURA QUINTA.

Haec partium ordine proxima post secundam sequitur. Pulmones à parte prior exhibet, reclinatos in latera. Sinum praeterea venarum pulmonarium, venas pulmonares quatuor, & arteriam pulmonarem, positu integro.

ABCDEFGH Pulmones. A, B, C D Pulmonis dextri fibrae tres. E, F, G Pulmonis sinistri fibrae duae. D, G Pars pulmonum inferior sinuata, diaphragma contingens.

Scriptissem Lancisium doleo, *proponi observanda pulmonum posteriora*. Nam posteriora sane exhibuit figura III, & VI: à quibus haec quinta in totum discrepat, quartae, si quid video, satis respondens fibris tribus pulmonis dextri, sinistri duabus, itemque parte inferiore pulmonis dextri sinuata, & venis pulmonaribus in pulmones penetrantibus. Adde positum sinus venarum pulmonarium, principique ejus à corde rescissi, ac pulmonaris arteriae: quae simili plane modo exhibita sunt figura XIII. tabulae XXVII. De qua dubitari nequit, quin partem priorem exprimat, eo quod in compositione vasorum pulmonarium, bronchia certe, in quae aspera arteria dividitur, posteriora sunt, antequam ea arteria pulmonaris ponitur, atque infra illam sinus venarum pulmonarium: quemadmodum in figura illa XIII. expressum videmus.

H Arteria pulmonaris, I hic, qua parte à corde proficiscitur, resecta.

Ex contextu intelligimus Lancisium hanc aortam esse velle, *quae supra arteriam pulmonicam inflectatur, & cujus hic foramen per cultrum apertum se offerat*: eoque pro numeris his, 45. 42. quibus ejus in explicatione designata est, reponendos hos, 45. 43. Apparet autem ex his ipsis tabulis, aortam non esse. Si enim esset, esset quoque aorta, cui d inscripti figura XIII. tabulae XXVII: quippe comparatione facta manifestum est, vas esse idem. In illa autem figura XIII. vas, cui litteram d inscripsi, aortam non esse vides: quoniam si esset, non ante bronchum sinistram flecteretur, sed super eum; ut recte exhibuit hujus tabulae xv. figura XII. S. Restat igitur, ut arteria pulmonaris sit; quod ipsa quoque anatome declarat.

K: L Rami duo, in quos arteria pulmonaris dividitur, ad pulmones pertinentes.

X 2

Esse

Esse arteriae pulmonaris ramos duos anatome docet. Idemque, si modo comparentur cum tabulae xxvii. figurae xiii. e: e, apparet.

M Sinus communis venarum pulmonarium. N Ejus principium, rescissum à corde.

O, P: Q, R Venae pulmonares quatuor: quae in ramos S, S: S, S divisae, in pulmones ducuntur.

FIGURA SEXTA.

Haec partium ordine proxima post tertiam sequitur. Eodem positu exhibet pulmones & cor, cum magnis arteriis & venis.

ABCDE Pulmones. A, B Pulmonis sinistri fibrae duae. C, D, E Pulmonis dextri fibrae tres.

F Cor.

G Vena cordis coronaria magna, sinistra. Vide c figurae xi. tabulae xvi.

Hanc qui cum secunda tabulae xvi. comparabit, facile videbit, ut in illa sit vena cava infra cor recisa, cui D inscripti; sic in hac esse, cui H: eoque, ut in illa vena sit coronaria major, cui c; sic in hac esse, cui inscripti G. Obstat hoc Lancisii hīce, *seriem ostendi nonnullorum ramusculorum venae, quae sanguinem à pericardio, ac mediastino in cavam regerat*: quae quamvis numeris non designet, de aliis tamen, atque hujus ipsius venae G ramis intelligi non posse puto. Magis tamen excusandus, quod, tanquam si ipse subdubitaret, addit hoc, *nisi se veri species fallat*.

H Vena cava inferior, infra venam coronariam magnam recisa.

I Sinus communis venarum pulmonarium.

K, L: M, N Venae pulmonares quatuor.

O, P, Q, R Vestigia originis pericardii à venis pulmonaribus quatuor.

De pericardii origine & adhaesione vide de vena sine pari antigramma x.

S: T Bronchia, juxta ingressum in pulmones rescissa.

V Arteria pulmonaris.

W: X Rami arteriae pulmonaris duo, in quos dividitur: quorum alter ad dextrum pulmonem pertinet, alter ad sinistrum.

Y, Z Vestigia originis pericardii à ramis arteriae pulmonaris.

a, a: a, a Rami, in quos rami duo magni arteriae pulmonaris, ubi in pulmones ingressuri sunt, dividuntur.

bb Arteria aorta.

c Ligamentum, quod in embryone est canalis, quem vocant arteriosum.





d Vestigium originis pericardii ab arteria aorta.

e Radix communis arteriae subclaviae dextrae & carotidis dextrae.


f Arteria carotidis sinistra.

g Arteria subclavia sinistra.

۲-۳۵



TAB. XVI.



T A B U L A XVI.

FIGURA PRIMA.

COr cum auricula dextra, arteriisque & venis suis, posito integro, à parte priore.

A Cor.

B Auricula dextra.

C Vena cava inferior, recisa juxta auriculam dextram.

D Vena cava superior.

E, F Venae subclaviae.

G, H Venae r: q figurae III. tabulae XXVII.

Iis respondent certe magis, quam mammariis, quibus eadem in figura g: g apposui. Lancisius autem *ramusculos* esse tradit *sanguinem ex mammis reducentes*.

IK Arteria aorta. K Ejus curvatura, quem vocant angulum.

LL Radix communis arteriae subclaviae dextrae & carotidis dextrae.

M Arteria subclavia dextra.

N Arteria carotis dextra.

O Arteria carotis sinistra.

P Arteria subclavia sinistra.

Q Arteria pulmonaris.

R Arteria cordis coronaria minor, sive dextra, ex arteria aorta oriens, interque auriculam dextram arteriamque pulmonarem emergens.

S Vena cordis coronaria minor, sive dextra, in aurem dextram patens.

T Continuatio rami i figurae II.

V Continuatio ramorum k figurae II.

W Continuatio ramorum l figurae II.

X Continuatio rami m figurae II.

Y Hujus rami continuatio est ramus n figurae II.

Z Hujus continuatio est ramus o figurae II.

a Hujus continuatio est ramus p figurae II.

b Horum continuationes sunt rami q figurae II.

c Continuatio rami r figurae II.

d Continuatio rami s figurae II.

e Hujus rami continuatio est ramus t figurae II.

f Conjunctio venae coronariae dextrae & sinistrae.

FIGURA SECUNDA.

Idem cor à parte posteriore.

A Cor.

B Auricula sinistra.

CC Auricula dextra.

D Vena cava inferior, juxta auriculam dextram recisa.

E Vena cava superior.

F Venarum cavarum continuatio.

T

G Vc-

G Vena azyga.

Ortus venae sine pari non est, ut Vesalius male scribit, à dextro cavae latere, sed ex posteriori & humiliori ejus sede vertebrae respiciente; non quidem in centro, sed dextrorsum magis. De vena sine pari antigrammate iv.

Ab hujus venae (sine pari) principio, ad illius arteriae (magnae) originem, (ubi, puto, de quo paulo ante dixerat, à corde enata deorsum fertur) rectam fere lineam protrahi posse, sectio ipsa ostendit. De vena sine pari antigrammate vi.

H:II Venae subclaviae.

K L Arteria aorta. L Ejus curvatura.

M Radix communis arteriae subclaviae dextrae & carotidis dextrae.

N Arteria subclavia dextra.

O Arteria carotis dextra.

P Arteria carotis sinistra.

Q Arteria subclavia sinistra.

R Arteria aorta, quae vocatur descendens.

S Truncus arteriae pulmonaris.

T:V Rami duo, in quos arteria pulmonaris dividitur, ad pulmones pertinentes.

W Sinus communis venarum pulmonarium. X:Y Ab utroque latere juxta venas pulmonares recisus.

Z Arteria cordis coronaria major, sive sinistra, ex arteria aorta oriens, atque inter arteriam pulmonarem sinistramque auriculam emergens.

a,b Dividitur in a ramum superiorem eundemque minorem, & b inferiorem eundemque majorem.

c Vena cordis coronaria major, sive sinistra, è vena cava inferiore oriens.

d,e Dividitur in d ramum superiorem eundemque majorem, & e inferiorem eundemque minorem.

f Venae coronariae majoris ramus ad sinum venarum pulmonarium pertinens.

g,g Venarum conjunctiones.

h Conjunctio rami majoris & minoris venae coronariae majoris.

i Hujus rami continuatio est ramus T figurae 1.

k Horum continuatio sunt rami V figurae 1.

l Horum continuatio sunt rami W figurae 1.

m Hujus continuatio est ramus X figurae 1.

n Hujus continuatio est ramus Y figurae 1.

o Hujus continuatio est ramus Z figurae 1.

p Hujus continuatio est ramus a figurae 1.

q Horum continuatio sunt rami b figurae 1.

r Hujus continuatio est ramus c figurae 1.

s Hujus continuatio est ramus d figurae 1.

t Hujus continuatio est ramus e figurae 1.

FIGURA TERTIA.

Respondet sextae tabulae octavae.

Dextrum cordis ventriculum secundum ejus longitudinem incisum, cum tribus membranis orificio venae cavae praefectis ostendit; & praeterea internam partem auriculae dextrae, quae à vena cava, qua parte ei adhaeret, divisa est.

AAAA Dex-

AAAA Dexter ventriculus cordis incisus.

B Interiora dextri ventriculi cordis.

CCDD Ostium venosum ventriculi dextri cordis. Cujus ostii orae continua-
ta CC auricula dextra, & DD vena cava.

Venam cavam appello, quod in figurae hujus explicatione sic appellat
ipse continuitatem cavarum duarum, quam sinum venosum dextrum vulgo
nominant.

E, E, Æ Æ Tres valvulae tricuspidales ostii venosi cordis ventriculi dextri: qua-
rum una Æ Æ media dissecta. FFF Una à principio membrana est, quae
ab ostio illo oritur, scinditurque in membranas illas tres.

G, G, &c. Columnae carnea dextri ventriculi, quae in H, H, &c. tendines
vertuntur, diversimode conjunctos inter se, pertinentesque ad valvulas tri-
cuspidales.

IK Auricula dextra. I Pars exterior. K Pars interior, concava: in qua co-
lumnæ carnea.

LLL Ora incisa, resecta tum vena cava superiore, tum continuitate vena-
rum cavarum, quam sinum venosum dextrum vulgo appellant.

MMM Ora incisae venae cavae superioris, & continuitatis cavarum.

N Pars interior continuitatis cavarum.

*Sinum vocat Galenus id spatium, quod est ante cor, factum ab inferiori
pariete venae cavae, & à dextra cordis auricula. -- Hic sinus ante cor maxi-
mam habet latitudinem, & perinde atque ejus basis, quatuor vertebrarum
spatio comprehenditur. De vena sine pari antigrammate x.*

*Vena cava, ubi auriculae dextrae conjungitur, antequam in sinistro la-
tere, anteriorique ipsius parte latissime scindatur, deposita ejus lateris substan-
tia ac rotunditate, in dextram cordis aurem degenerat, atque spatiosum si-
num ante cor efformat; denique amissa pene venae specie, in cordis ventri-
culum, non admodum alte penetrans, infigitur. De vena sine pari anti-
grammate xi.*

*Ab hac membrana Q sinus ante cor positus est, cujus eminentior ora finis
est conjunctionis dextrae auriculae è regione spatii, quod est inter quantam &
quintam thoracis vertebram, quo loco vena cava rursus suam teretem speciem
sumit. De vena sine pari antigrammate xi.*

O Superius orificium venae cavae ad jugulum ascendens, quae, ut Galenus
scribit, ab elatiori auriculae dextrae extremo principium quodammodo sumere
videtur.

P Vena cava superior.

Q Membrana artificii, & admirationis plena, nemini anatomicorum haecenus
non incognita; quae foramini venae cavae à jecore ascendens, quum pri-
mum haec in dextram auriculam degenerat, praefecta est, nimirum dimidia-
tam partem, eamque anteriorem illius occupat, & deinceps R reticulum ef-
format.

*Adhaeret sane interiori anteriorique venae cavae parieti sternum respicien-
ti, ab eaque sede principium sumere videtur: ubi autem ad medium fere am-
bitus foraminis pervenit, in multiplices fibras, easque satis crassas, desinit,
quae, ceu reticulum, vario modo complicatae, & intextae reliquum semicir-
culum complent, & toti foraminis capedini solute, ac sine conjunctione obdu-
cuntur; ita ut possint ab irruente materia hinc inde impelli, atque repelli:
aliquando tamen haec membrana ejusmodi contextu fibrarum destituitur, &
pariter atque illa, quam orificio venae coronariae praefici dixi, quasi cornu-*

tae lunae speciem refert; aliquando adeo parva & angusta est, ut nisi diligenter animum quis advertat, quasi nulla sit, praetereatur. De vena sine pari antigrammate XI.

- S Membrana cornusae lunae figuram referens, orificio majoris venae coronariae, ceu operculum ultra medium obducta, quam caeteri anatomici oscitanter praetereunt.

Vesalius --- ignorat cum caeteris anatomicis ei additis, osculum venae coronariae elegantissima membrana, quae dimidiatae lunae speciem habet, robustiori altera earum, quae orificio cavae in corde praefectae sunt, ceu operculo obtegi, & ceu valvula claudi. De vena sine pari antigrammate X.

- T Ostium venae coronariae majoris, sive sinistrae.

- V Lunatus sinulus, qui superest postquam valvula foraminis ovalis continuata parieti intergerino sinuum venosorum cordis.

Certe circa hunc locum reliquiae foraminis illius inveniuntur, eaeque tam conspicuae, ut praetere non potuerit. Neque in icone aliud quid est, quod eas vel significet. Cor ad exemplum hoc dissectum pone in aqua, quo integriorem in ea formam recipiat: cerneque, ubi exhibitum, valvulam cavae inferioris Q, infraque eam ostium venae coronariae majoris T cum valvula sua S, supraque è regione exitum cavae superioris O, interque eum, valvulamque cavae inferioris, reliquias foraminis, quas puto, V. Easque in figura VI. à parte sinus sinistri exhibet D, ut in hac III. non videatur à parte dextri omisurus. In icone utraque fere peraeque ab ostio cordis distat. Ut in sexta tendit oblique dextrorsum, sic in hac III. dextrorsum oblique patet. Haec movent me.

- W Arteria aorta.

- X Arteria pulmonaris.

- Y Cordis pars exterior.

- Z Ramus major venae cordis coronariae majoris, sive sinistrae. Cujus rami comes ramus minor arteriae coronariae majoris, sive sinistrae.

FIGURA QUARTA.

Cor, cujus arteria pulmonaris & ventriculus dexter per longitudinem incisa, & quidem à sinistra parte, juxta ventriculum sinistrum: ac postea diductus ventriculus una cum arteria.

- AA Incisa arteria pulmonaris.

- BBBB Incisus cordis ventriculus dexter.

- CC Interiora ventriculi dextri.

- D Interiora arteriae pulmonaris.

- E, E, E Tres valvulae semilunares, ad ostium arteriae pulmonaris appositae. Basi sua affixae cordi; cornubus, arteriae.

- F Arteria aorta.

- G Ramus major venae coronariae majoris, sive sinistrae. Cujus rami comes ramus minor arteriae coronariae sinistrae.

- H Exteriora ventriculi sinistri.

- I Exteriora ventriculi dextri.

FIGURA QUINTA.

Cor, cui per longitudinem incisus diductusque ventriculus sinister una cum radice arteriae aortae. Incisa autem aorta ab illa parte, quae est juxta partem priorem auriculae sinistrae.

AA Incisa arteria aorta.

BBBB Incisus cordis ventriculus sinister.

CC Interiora ventriculi sinistrae.

D Interiora arteriae aortae.

E Ostium arteriae coronariae dextrae.

F Ostium arteriae coronariae sinistrae.

G,G,G Tres valvulae semilunares ostii arteriae aortae. Basi sua ad cor annexae; cornubus ad aortam.

H Pars valvulae tricuspidis ostii venosi cordis ventriculi sinistrae.

I,I Columnae carnaeae, à quibus tendines ad valvulam modo dictam pertinent.

K Auricula sinistra.

LL Exteriora cordis ventriculi sinistrae.

FIGURA SEXTA.

Cor, cui sinus venarum pulmonarium statim pone auriculam sinistram dissectus, ac deinde porro continuata sectio per ventriculum sinistrum, ad mucronem usque cordis: posteaque cor diductum una cum sinu.

A Auricula sinistra.

B Pars sinus venarum pulmonarium resecta ab auricula.

CC Interiora sinus venarum pulmonarium.

D Lunatus sinulus, qui superest postquam valvula foraminis ovalis continuata parieti intergerino sinuum venosorum cordis.

Vide V figuræ III.

EEEE Incisus ventriculus sinister cordis.

FFF Ostium venosum cordis ventriculi sinistrae. Cui ostio ab exteriori parte continuatus sinus venarum pulmonarium cum auricula: ab interiori,

GGG Membrana continua, postea migrans in valvulas tricuspidis duas.

H Una ex valvulis tricuspidibus: illa, pone quam est ostium arteriae aortae. Alterius, cum ostio incisae, ab utraque parte pars dimidia.

I,I Columnae carnaeae, è quibus tendines nascuntur, ad valvulas tricuspidis pertinentes.

K Interiora ventriculi sinistrae. LL Exteriora.

T A B U L A XVII.

FIGURA PRIMA.

- E** Ncephalus à latere dextro, cum meninge crassa.
A A B B Cerebri hemisphaerium sinistrum. **B B** Pars, qua dextro obversum.
C C D D D Hemisphaerium dextrum hinc ex transverso non longe à corpore calloso rescissum. **C C** Incisus cortex, una cum interfertis medullae portionibus. **D D D** Incisa medulla media.
E Corpus callosum.
F F F F Meninx crassa, quadrifariam incisa, dependentibus angulis.
G Medulla oblongata.
H Cerebellum. Certe locus ejus.

FIGURA SECUNDA.

- A A** Cerebellum à superiore parte. Medium autem per longitudinem capitis in duas partes aequaliter dissectum, deductaque altera ab altera.
B B C C D D **B B C C D** Cerebelli partes sectae. In quibus **C, C,** &c. medulla ramosa è cortice origo. **D: D** Trunci medullae cerebelli, ad medullam oblongatam pertinentes.
E E: E E Truncorum medullae cerebelli partes, quae pertinent ad medullae oblongatae partem priorem. **F: F** Partes, quae ad posteriorem.
G: H Crura medullae oblongatae hic rescicta.
 Hic à Lancisio, qui *nervos funiculos* esse tradit, dissidere me anatome cogit. Nam in textu ejus pro 3. 31. reponendam esse 3. 32, perspicuum primum est ex re ipsa. Deinde etiam ex eo, quod partem, cui **H** apposui, hic designari constat, eo quod in dextro latere designata est pars **G** per numeros 3. 28: cui in sinistro respondet pars **H**, quam numeri, per quos designata, 3. 31. non designant, sed, quos repono, 3. 32. Qui autem crura medullae oblongatae hic loci ex transverso eo ductu, qui in icone, rescindet, eamque deinde comparabit; is, ni totus fallor, sectam crurum illorum partem hic exhiberi inveniet. Adde quod partes illae **G** & **H** *nervosorum funiculorum* speciem non referunt.
I Glandula pinealis.
K: K Nates.
L: L Testes.
M N: M N Nervi paris quarti, pathetici vulgo, **M: M** à medulla oblongata pone testes orientes.
Nervi, qui prope cerebri nates oriuntur. Ossium examine.
O O P Pars medullae oblongatae, quae subiecta cerebello superimminenti, cum eo efficit ventriculum quartum. **P** Incisura in ea, quae calamus scriptorius appellatur.
Q Q Spinae medulla, à parte posteriore.
R Cauda equina.
 1, 2, &c. Nervi à spinae medulla orientes.

Z 1

S, T Ra-

S, T Radices, quibus nervi à spinæ medulla oriuntur: quarum aliae S nascuntur è posteriore ejus parte: aliae T è priore. Ex quo radices reliquorum intelligi possunt.

FIGURA TERTIA.

Cerebri parte superiore ex transverso ad ventriculos anteriores resecta, pars inferior exhibita, qua parte secta est.

A: A Cerebri lobi anteriores. B: B Posteriores.

CCC &c. Cortex cerebri incisus una cum medullae portionibus, quas complectitur.

DDD &c. Media medulla incisa.

E Pars, à qua corpus callosum resectum.

FGGHH: FGGHH Ventriculi anteriores cerebri.

GG: GG Corpora striata.

HH, HH Plexus choroidei. In quibus venae crebre conjunctae inter se: quae è ventriculis anterioribus oriuntur. Indicati rami, tum qui è priore parte ventriculorum veniunt, tum qui è posteriore, tum qui è corporibus striatis.

FIGURA QUARTA.

Haec proximae superiori respondet. Hoc autem differt, quod fornix à priori parte resecta, ac deinde cum plexibus choroideis venisque, quae in plexibus illis sunt, in posteriora reflexa est.

A Percussae fornicis pars prior.

Infundibulum, cujus Lancisus hic meminit, neque apparet ullibi, neque hic locus ejus est. Hunc autem locum apud Lancisium per numeros 44. 15. designari planum esse puto: qui tamen accuratius designaretur his, 44. 15½.

B Fornicis pars, quae à parte priore A abscissa.

CC Fornicis in posteriora reflexae pars inferior.

D: D Plexum choroideorum, una cum fornice in posteriora reflexorum, pars inferior. Cum plexibus reflexae sunt venae, quae in iis sunt, ramis suis conjunctae inter se. Trunci E: E subeunt fornicis partem priorem, ac deinde

F: F sub fornice, per plexum sub ea positum, ad sinum quartum meningis crassae pertinent: conjunguntur inter se emissis ramis.

G Cerebellum, ut videtur.

H: H Testes.

I: I Nates.

K Glandula pinealis.

L Fissura inter thalamos nervorum opticorum.


M: M Thalami nervorum opticorum.


N: N Corpora striata.

FIGURA QUINTA.

AAA: AAA Hinc resecta cerebri pars superior secundum ventriculos anteriores. B: B Hinc resecti lobi anteriores

C: C Pars





C: C Pars ventriculorum anteriorum.

D Fornix: cujus E pars prior recifa.

F: F Crura fornix.

G: G Thalami nervorum opticorum.

Sunt M: M figurae iv. Cujus ex comparatione haec intelligitur melius.

H: H Hic recifa crura medullae oblongatae, sectione oblique inter corpora striata & thalamos ducta.

I Fissura inter thalamos nervorum opticorum.

Est L figurae iv. Ex qua intelligitur haec melius.

K Continuitas nervorum opticorum.

L: L Nervi optici.

FIGURA SEXTA.

Cerebrum à parte inferiore.

AAA: AAA Hinc cerebri pars inferior, à lobis mediis usque ad posteriores, resecta, secundum medios ventriculos anteriores.

B, B Ventriculorum anteriorum, qua parte & in lobos posteriores cerebri, & in medios pertinent, lacunaria.

CD, CD Lobi anteriores cerebri. D: D Partes, quibus alter alterum contingit, hic, diductis aliquantum ab inferiore parte lobis, apparentes.

E: E Processus mammillares cerebri: quorum dexter recifus.

F Fornix & G corporis callosi pars inferior. Non distincta fornix à corpore calloso.

H: H Radices fornix.

I Portio transversa, qua radices fornix conjunctae. Inter portionem illam & radices fornix, spatium triangulare.

K L M: K L M Nervi optici. Percissa continuitate eorum, alter ab altero deductus. K: K Partes eorum, quae crura medullae oblongatae ambiunt.

L L Continuitas percissa.

N: N Crura medullae oblongatae recifa.

OP: OP Thalami opticorum, altero ab altero separato, & deducto. O: O Partes eorum, quae sunt parietes ventriculi tertii. P: P continuitate thalamorum, qua supra ventriculum tertium conjuncti sunt, percissa, haec sectae partes sunt.

FIGURA SEPTIMA.

Cerebellum à parte inferiore simul & aliquantum priore.

AABBCC Cerebelli pars inferior, in qua indicatus varius positus incisuratum, quae extrinsecus in ea sunt.

D Eminentia annularis. A cujus priore parte recifa crura medullae oblongatae: à posteriore, truncus medullae illius.

E Cerebelli processus vermiformis anterior.

FF Cerebelli pars medullaris, quae superimminens medullae oblongatae, lacunar quarti ventriculi est.

G Processus vermiformis posterior.


H: H An partes illae, quae utrimque à processu vermiformi posteriore deductae ad cerebellum, lamellis tenuibus similes?

I Cerebelli tuber, sive processus, qui est pone processum vermiformem posteriorem.


Aa

T A-

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



TAB. XVIII.



T A B U L A XVIII.

FIGURA PRIMA, TERTIA, QUARTA,
ET QUINTA.

Hoc differant, quod in tertia, quarta, & quinta seorsim aliqui tantum nervi exhibentur ex illis, quos prima simul omnes continet. In qua qui ob multitudinem illam cognosci facile nequeunt, ii in tertia, quarta, & quinta, relictis reliquis, apparent melius.

Encephalo cum principio spinæ medullæ per longitudinem mediam dissectis, partem dimidiam ab inferiore parte exhibent, una cum nervis.

Quum, quo pertineant nervorum rami, hic non appareat; comparavi eos cum corporibus, esseque, quos scripsi, putavi. Addi multa ex anatomico potuissent; quæ, quoniam non exhibita, præterii. Neque enim neurologiam tradere suscepi, sed indicare nervos exhibitos.

Figura I. III. IV. V. a Processus mammillaris.

I. III. IV. V. bcd Nervus opticus. c Pars ejus, quæ est ante continuitatem opticorum. d Continuitatis illius, mediæ per longitudinem divisæ, pars dimidia.

I. e Retina.

Retinam esse existimo potius, quam, quod videri etiam posset, globi oculi portionem. Nihil equidem causæ invenio, cur, si globum voluisset, ejus tantummodo portionem exhibuisset; quum non obftet in icone quicquam, quo minus integrum addere potuisset.

IV. III. I. V. f Truncus nervi tertii paris cerebri, juxta partem priorem emittentiae annularis oriens: quod par oculos motorium vocatur. Ramos emittit

IV. III. I. g ad rectum adducentem oculi pertinentem.

IV. III. I. h ad obliquum inferiorem oculi.

IV. III. I. i ad rectum deprimentem oculi.

IV. III. I. k qui dividitur in duos; quorum

IV. III. l alter ad rectum attollentem oculi,

IV. III. m alter ad levatorem palpebræ superioris pertinet.

V. III. I. IV. n Nervus quarti paris cerebri, ad obliquum superiorem oculi perticiens: quod par patheticum vocant.

IV. I. III. V. o Nervus sexti paris cerebri, ad rectum abducentem oculi, oriens juxta priorem partem corporis olivaris & pyramidalis.

I. IV. p Nervi intercostalis ramus, qui cum nervo sexti paris cerebri conjungitur. Vide §§ figuræ II.

Hic in prima, & in quartæ loco, qui huic respondet, difficultatem iconæ affert, quam Morgagnus quoque animadvertit, ut est ad omnia laudabiliter attentus; ita nempe hunc ramum *appictum conspici, ut cum sexto non communicare videatur*. Epistola anatomica XVI. §. LII. Quod quum ita sit, & tamen hic ramus satis respondeat illi nervi intercostalis ramo, qui ad sexti paris nervum pertinet, ut Morgagnus quoque *nexum* intercostalis cum nervo illo *pictum* hic esse, *non pertinaciter negat*; idcirco expendendum propono, anne vitium hoc sit in sculptura, & debuissetne nexus

Aa 2

ille

ille sic expressus fuisse, ut expressi in lineari figurae IV. p. Sic certe in hac eadem figura I. chordam tympani T ita ad nervum R pertinere videmus, ut communicare cum eo non videatur; quum tamen aliter, & ut esse revera debet, expressum in figura III. videamus: de qua re conferantur, quae mox annotabo ad T. Et vitia talia aliis quoque in locis animadvertimus. Accedit autem difficultas altera, quae non effugit quoque Morgagni attentionem. Scilicet, *si truncum quinti in his* (prima, & quarta) *& secunda species; continuo intelligas, non eodem loco fuisse nexum delineatum.* Quaerenti autem mihi, quo minui difficultas haec posset, occurrit hoc: sic etiam quarti paris nervos T: T in figura II. aliter positos inveniri, atque n in prima & tertia, quos tamen utrobique eosdem quarti paris esse, manifestum sit: & discrepare etiam posito portiones molles nervorum acusticorum in prima & secunda; ut mittam ejus generis alia. Equidem, quum, quae proposui, consideravi, hunc ramum p esse nervi intercostalis ramum, qui cum nervo sexti paris conjungitur, ut & figuræ II. minus dubitavi affirmare.

x. III. IV. v. q Truncus nervi quinti paris cerebri, nascens è latere eminentiae annularis. Dividitur in ramos tres; primum, secundum, tertium.

v. III. I. IV. r Primus ramus nervi quinti paris cerebri; qui ramus ophthalmicus appellatur.

v. III. I. s Ophthalmici ramus, qui pertinet secundum anteriorem partem cavi ossei oculi, juxta nasum. Ramos emittit t, u, w, x. Quorum

v. III. I. t an ad nervos ciliares pertinet?

v. III. I. u, w per canaliculum qui ad commissuram ossis frontis cum plano incipit, inter os frontis & cribriforme in cavum calvariae è cavo oculi penetrat, porroque u in nasum.

Viam illam apertam vide in tabulae v. ossium humanorum figura II. fg; & figura III. S. Integram, in tabulae IV. figura VIII. s: dein figura II. t: dein figura I. u.

v. III. I. x juxta angulum majorem oculi penetrat, juxtaque radicem nasi sursum flectitur ad frontem.

v. III. y (idem I.) Ophthalmici bipartitio in ramum z, & AB. Quorum

v. III. I. z alter juxta angulum majorem oculi ad frontem penetrat:

v. III. I. AB alter modicatum fere ad supercilium usque proxime comitatus, penetrat per foramen supercilii, B flectiturque ad frontem: ubi est a tabulae XIX. n°. II.

x. III. IV. v. C Secundus ramus nervi quinti paris cerebri. Ramos emittit DE, F, GH. Quorum

x. D in palatum ducitur. Is pertinet primum per canalem, qui fit ex osse maxillari superiore & palati: posteaque E flectitur in priora ad palatum.

x. F in nasum ducitur: qui esse videtur. Penetrat in posteriorem partem nasi, per foramen quod fit ex osse palati & multiformis basi ad partem nasi posticam & eandem superiorem lateralemque.

x. G in foramen oculi ducitur. Is, quum per canalem, qui in osse maxillari secundum inferiorem partem cavi ossei oculi ductus, foramine, quod infra orbem ejus est, finitur, penetravit, H flectit se, ramosque per profunda illius partis faciei, quae infra oculum est, spargit: ubi exhibuit tabula XIX. n°. II. b.

x. III. IV. v. I Tertius ramus nervi quinti paris cerebri, qui dividitur in K anteriorem, & L posteriorem.

- x. iv. v. III. K Ramus anterior tertiæ rami nervi quinti paris cerebri emit-
tit ramos M, N, O, P. Quorum
xv. i. v. M unus per anteriorem partem buccinatoris ducitur.
v. i. iv. N alter ad temporalem pertinet.
iv. i. v. O tertius ad pterygoideum externum.
iv. i. v. P quartus ad malleterem.
i. III. iv. v. L Ramus posterior tertiæ rami nervi quinti paris cerebri emit-
tit ramos Q, R. Quorum
III. i. Q unus ad linguam pertinet.
Vide annotationem ad R.

- III. i. R alter penetrat in canalem maxillæ inferioris.

Raras propagines emittit, ne dicam ullas. De dentibus capite xx.

Q, R Horum alterum linguae esse, maxillarem alterum, dubitari posse non videtur. Maxillarem autem esse eum, cui R inscripti, collegi potissimum ex his. Primum, quod emittit ramum S, qui respondet illi, quem maxillaris, paulo ante quam penetrat in canalem maxillæ inferioris, emittit, pertinentem primum inter pterygoideum internum & glandulam submaxillarem ab una parte, & maxillam ab altera, per quendam maxillæ oblongum sinum, qui aliis canalis integer est, aliis ex parte integer: deinde infra mylohyoideum; cui, biventrisque maxillæ ventri secundo, ramos dantem vidi. Deinde, quod mox, postquam ramum mododictum emisit, hoc est, ubi penetrat in canalem maxillæ, incurvatur; ut canalis illius principium; posteaque rectior est, ut canalis idem. Praeterea, quod longior est altero Q, ut maxilla quoque longius porrecta, quam lingua. Postremo, quod extremum ejus ramosum respondet ramis per foramen exterius maxillæ à latere menti penetrantibus, c. tabulae XIX. n°. II. Addi etiam posset, quod de caetero simplex sine ramis exhibitus est, eoque satis respondere videri potest illis, quae in libro de dentibus tradit, *raras propagines emittere, ne dicat ullas.*

- III. i. S Nervus, qui à maxillari R, antequam is penetrat in canalem maxillæ, emissus, ducitur per anteriorem partem maxillæ in priora, pertinetque ad mylohyoideum, biventris ventrem secundum, &c.
i. III. T Chorda tympani, conjuncta ab una parte cum ramo maxillari R; ab altera cum portione dura septimi paris nervorum cerebri Z.

Ab altero ejusdem visceris (cerebri) quarti jugi nervorum ramo exilis quaedam propago, reflexo itinere juxta illum, quem modo descripsi, osseum canalem, aurium cavum, in quo ossicula auditus continentur, ingreditur, & oblique tympano, ac deinde ossiculo malleum imitanti supra musculi insertionem adhaerescit, nec ibi desinit, sed ulterius procedens os lapideum in posteriori sede meatus auditorii perforat, deorsumque reflexa parumper repit, ac tandem cum tenuiori duriorique ramo quinti paris nervorum cerebri jungitur, & coit. De auditus organis.

Ad utrumque hujus chordae extremum vitium quoddam scalpturae est. Deberet enim hic nervus ab altera parte cum ramo nervi quinti paris R, ab altera cum portione dura Z conjungi; non autem, ut in figura archetypa apparet, distinctus ab eis esse. Vitium scalpturae indicat locorum commaculatio: quae, si probe attendas, ex eo orta esse videtur, quod lineolas à nervis R & Z hanc chordam T dividentes, quae certe apparent, eradere scalptor voluit, erasit autem nec plene, nec pure. In figura autem tertia, ubi nulla commaculatio, chorda illa cum ramo nervi quinti

Bb

pa-

paris evidenter conjungitur: ex quo in hac prima conjungi quoque debere intelligimus. Cum portione autem dura conjungi debere ex ipso Eustachio discimus, tradente in epistola de auditus organis, *ab altero ---- quarti jugi nervorum ramo exilem quandam propaginem (T) ---- tandem cum tenuiori duriorique ramo (XY) quinti paris nervorum cerebri jungi, & coire (Z).*

- x. III. V Rami L posterioris tertii rami nervi quinti paris cerebri ramus, qui cum portione dura septimi paris nervorum cerebri conjungitur.
- x. III. IV. v. W Septimi paris nervorum cerebri, qui auditorii appellantur, portio dura, oriens à priore parte lateris externi corporis olivaris. Primum autem
- x. X comes portionis mollis, cum ea penetrat per canalem communem in osse petroso. Dein penetrat ex eo in aquaeductum Fallopii, flectiturque se Y, ingressura aquaeductus partem, quae secundum tympanum ducta. Per quam dein pertinet, Z conjungiturque cum chorda tympani. Post ubi penetravit, conjungitur α cum ramo V tertii rami quinti paris nervorum cerebri.
- x. III. IV. v. γ Septimi paris nervorum cerebri, qui auditorii vocantur, portio mollis, oriens à priore parte corporis olivaris, propter externum latus portionis durae.

Quantum nervorum cerebri jugum ex duobus tantum nervis, ut alii arbitrantur, minime constat, sed duas utrimque propagines inaequales habet, quarum major secundum longitudinem, instar semicirculi, eleganter excavatur, minoremque, quod alios fugit, amice suscipit & amplectitur, eoque modo ambae simul junctae oblique in anteriorem & posteriorem partem, usque ad extremum sinus in osse petrae simili earum gratia exsculpsi, procedunt; ubi minor propago a majore recedens, parvum foramen sibi paratum invenit, & ingreditur, miveque admodum flexuoso incessu, de quo nunc loqui non est opportunum, extra calvariam elabatur; major autem propago videtur in tres portiones parum invicem distantes terminari, ex quibus praecipua exigua foramine, in cochleatum os pervio, obducitur. De auditus organis.

- x. δ Cochlea esse videtur, ad quam portio mollis pertineat.
- x. III. IV. v. ε Nervus octavi paris cerebri, à latere externo corporis olivaris aliquot principiis oriens.
- x. III. ζηθ: Nervus spinalis recurrens, ζ, η, θ tribus principiis oriens, ac post conjunctus cum trunco paris octavi nervorum cerebri.

Tres propagines sexti jugi nervorum cerebri a medulla spinali principium sumentes. Ossium examine.

- x. III. IV. v. κ Nervus noni paris cerebri, aliquot principiis oriens à posteriore parte lateris externi corporis pyramidalis.
- x. III. IV. v. λ Nervorum spinalium primus.
- x. III. IV. v. μ Nervorum spinalium secundus.
- x. III. IV. v. ν Nervorum spinalium tertius.
- x. III. IV. v. ξ Spinae medulla.
- x. III. IV. v. ο Corpus pyramidale.
- x. III. IV. v. π Corpus olivare.
- x. III. IV. v. ς Truncus medullaris cerebelli, ad medullam oblongatam pertinens.
- x. III. IV. v. σ Eminentia annularis.

1. III. IV. v. τ Crura medullae oblongatae.
 1. III. IV. v. ν Spatiolum, inter eminentias candicantes, crura medullae oblongatae, & eminentiam annularem.
 1. III. IV. v. ϕ Eminentia candicans, pone infundibulum.
 1. III. IV. v. χ Corpus cinereum, in angulo posteriore continuitatis nervorum opticorum, inter crura medullae oblongatae situm. In eoque tertii ventriculi cerebri ostium imum, unde infundibulum procedit.
 1. III. IV. v. ψ, ω Cerebri lobi, ψ prior, ω medius.
 1. III. IV. v. Γ Cerebellum.

FIGURA SECUNDA.

AAABB Cerebrum à parte inferiore. AA: AA Lobi priores, B: B medii.
 CC Cerebellum, à parte inferiore.

D: D Extremi processus transversii atlantis.

E: E Eminentes orae illorum sinuum atlantis, qui recipiunt & sustinent processus coronoides ossis occipitis.

Nemini, puto, dubium esse potest, quin Lancisius has duas partes designet, quum tradit, *decimum par in ortu suo utrinque recisum apparere ad latera flexurae parvis ossibus, ubi minima alba capitula, veluti duo puncta cernuntur*. At non modo ex eo, quod duae illae partes in reliquis quatuor hujus tabulae cerebri figuris non existant, satis apparet, non esse *decimum par in ortu suo utrinque recisum*, ut recte annotatum à Winslowo, explicatione tabulae B B. q, q; sed figura etiam non est, quae nervorum. Et qui paulo diligentius atlantem considerabit, facile, ut opinor, adducetur ad existimandum, esse partes ejus illas, quas dixi.

F: F Trunci medullares cerebelli, ad medullam oblongatam pertinentes.

G: G Corpora pyramidalia.

H: H Corpora olivaria.

III Eminentia annularis.

K: K Crura medullae oblongatae.

L Spatiolum inter eminentiam annularem, crura medullae oblongatae, & eminentias candicantes.

M Eminentiae candicantes, pone infundibulum sitae.

N Corpus cinereum, quod in angulo posteriore continuitatis nervorum opti-
 corum positum, inter crura medullae oblongatae. In corpore illo ostium
 imum ventriculi tertii cerebri: à quo ostio infundibulum procedit.

O: O Processus mammillares.

P: P Nervi optici.

Q Opticorum continuas.

R R: R Optici, antequam conjungatur alter cum altero.

S, S Tertium par nervorum cerebri, quod oculos motorium vocant, juxta
 priorem partem eminentiae annularis oriens.

T, T Quartum par nervorum cerebri, quod patheticum appellant.

*Quartum par à recentioribus patheticorum nuncupatum, oriri ab inferiori
 parte medullae oblongatae, juxta oculorum motorios, & ejus fibras ad fron-
 tis cutem, ad musculos labii superioris, narium, & attollentes maxillam in-
 ferioriorem, nec non ad linguam, & dentes exporrigi; id à Lancisio tradi-
 tum. Quibus praeterquam quod anatome refragatur, praeterea etiam re-*

Bb 2

fra-

fragatur Eustachius, qui oriri nervos patheticos à superiore parte medullae oblongatae, pone testes, exhibuit tabulae xvii. figura 11. M: M. Et neque ad partes illas, neque omnino ad tot partes pertinere, simplici eorum figura in tabulae hujus xviii. figura 1. & 111. & v. n satis declarat: ubi etiam ad obliquos superiores oculorum pertinere eos voluisse, ex loco & sede eorum haud difficulter apparet; ut pertinere anato-me docet.

V: V Quintum par nervorum cerebri, oriens à latere eminentiae annularis. Dividitur in ramos tres; W primum, X secundum, Y tertium.

Z: Z Sextum par nervorum cerebri, oriens juxta priorem partem corporum olivarium & pyramidalium.

Hi, quos Lancisius nervis, quos intercostales nunc appellant, accensuit, sunt profecto, quod appellant sextum par nervorum cerebri, oriens juxta priorem partem corporum olivarium & pyramidalium, & ad abductores oculorum pertinens. Cum quo pari conjunguntur summa initia nervorum intercostalium ξ : ξ .

a: a Septimi paris nervorum cerebri portiones durae, orientes à priore parte lateris externi corporum olivarium.

Lancisius quidem *sextum par* esse tradit: at omnino sunt portiones durae septimi paris, quod auditorium appellant. Conferri Eustachii locus potest, quem ex epistola de auditu organis adjeci ad γ figurae 1: quo eandem ibi illam portionem duram, W X Y, ipse interpretatur.

b: b Portiones molles septimi paris nervorum cerebri, orientes à latere corporum olivarium, statim pone portiones duras.

c: c Cochleae esse videntur, ad quas portiones molles pertineant.

d: d Par octavum nervorum cerebri, aliquot principii oriens à posteriore parte lateris externi corporum olivarium.

Eustachius in examine ossium tradidit, octavi paris, olim *sexti*, tres *propagines a medulla spinali principium sumere*. Quod, ut apparet, non ad hanc, ad quam Lancisius retulit; sed ad tria principia spinalis recurrentis ζ , η , θ figurae 1. & 111. pertinet.

e: e Nervi spinales recurrentes: qui adjunguntur pari octavo nervorum cerebri.

f: f Octavi paris nervorum cerebri trunci, conjuncti cum truncis spinalium recurrentium.

g: g Spinales recurrentes, postquam ab octavo pari nervorum cerebri fecesere.

Non ignoravit, à collo in dorsum, perque illud duci: quippe exhibuit tabula xix. n°. 11. f g; & tabula xx. n°. 11. a. Qui igitur factum, ut in hac secunda tabulae xviii. dexter ante nervorum cervicalium conjunctionem & commisionem 28, unde brachiales deinde fiunt, expressus sit; non pone?

Lancisius *ramum octavi paris vagi disti* appellat; ut haberi solet.

h Spinalis recurrentis ramus, qui pertinet ad cleidomastoideum & sternomastoideum.

i Spinalis recurrentis ramus, quo conjunctus cum pari tertio cervicalium. Confer h tabulae xix. n°. 11.

Inter nervum i & 15 vitium est in archetypa: apparet enim tanquam si nervus ibi esset à spinali recurrente g ad nervum i pertinens, eosque con-

conjungens inter se. Satis, puto, perspicuum, lineas esse, quibus cerebellum expressum, vitio sculpturae continuatas nervis illis: quum deberent lineae, quae latera eorum terminant, ad extrema illarum linearum, quas ad cerebellum pertinere dixi, non desinere, sed continuari. Confirmat tabula XIX, lineas illas, aut quae eis respondeant, nullas habens. Confer eam circa h n°. 11.

k Spinalis recurrentis ramosus finis, quo praecipue ad cucullarem pertinet.
 III:III Par octavum nervorum cerebri.

m:m Octavi paris nervorum cerebri rami, qui praecipue ad linguae radicem pertinent, itemque ad vicinam pharyngis partem, &c.

De his nervis invenio in annotationibus meis, vidisse me eos cum octavo quidem pari penetrantes per cranium, sed per singulare sibi quae proprium meningis crassae foramen.

n:n Octavi paris nervorum cerebri rami laryngaei superiores, qui inter os hyoides & cartilaginem thyreoideam penetrant in interiora laryngis: ubi alter hic conjungitur cum laryngaeo recurrente.

p Laryngaeus recurrens, sive inferior, sinister, gemino principio oriens à dextro nervo octavi paris cerebri.

q Laryngaei recurrentis dextri conjunctio cum nervo intercostali dextro.

r Laryngaeus recurrens, sive inferior, sinister, gemino quoque principio oriens à sinistro nervo octavi paris cerebri; sed demissus.

Hujus principia quum commaculata sint in archetypa, non apparent illa quidem oriri ab octavo pari, quum videatur tamen exhibere id voluisse.

s Nervus, quo cardiacus sinister conjungitur cum laryngaeo recurrente sinistro.

t Laryngaeorum recurrentium finis ramosus, quo pertinent ad glandulam thyreoideam, pharyngem, cricoarytaenoideos posticos, arytaenoideos, thyreoarytaenoideos.

uwx Nervus cardiacus dexter, principii oriens duobus, w altero à laryngaeo recurrente dextro, x altero à dextro nervo octavi paris cerebri.

yza Nervus cardiacus sinister, principii oriens duobus, z altero à nervo sinistro octavi paris cerebri, a altero à nervo intercostali sinistro, ut ex icone apparere videtur.

Quoniam initia horum nervorum in archetypa commaculata sunt, difficile judicatu, unde oriri eos voluerit. Alterum quidem z ab octavi paris nervo oriri voluisse, ex comparatione nervi x colligas; cui respondet, quique ab octavi paris nervo oritur. Alter vero apparet tanquam si nervi intercostalis ramus potius esset, quam paris octavi. Neque multum repugnaverim, si cui aliter videatur.

Cordis nervi magni non sunt, --- certe haud majores & minores fortasse sunt, quam illi, qui in portas jecoris atque in renes inseruntur. De renibus capite XXIV.

Cor à cerebro, aut nullos, aut omnium minimos accipit nervos. --- Cordis nervi longe minores sunt, quam illi, qui in portas jecoris inseruntur. De multitudine capite XXXII. pagina CL. B.

Ad cor exiles ac rari nervorum furculi feruntur. De multitudine capite XXXII. pagina CLI. A.

β Nervus, quo cardiaci conjuncti inter se.

γ Cardiacorum ramosus finis, quo ad cor, partesque ejus pertinent.

δ:δδ Nervi pneumonici, orientes ab octavo pari nervorum cerebri.

ε,ζ:ε,ζ Octavi paris cerebri nervorum divisio in ramos duos, rursus deinde
 Cc con-

- confluentes, ac sic insulam quandam efficientes: quarum sinistra minor. Dextrae insulae rami conjunguntur transverso.
- η, η, η Rami, quibus trunci octavi paris cerebri conjunguntur inter se, tum ante stomachum, tum pone.
- θ Trunci sinistri octavi paris cerebri ramus, qui per superiorem partem ventriculi à stomacho ad pylorum pertinet, ramosque ventriculo dat, priori maxime parti ejus.
- ι Trunci sinistri nervorum cerebri octavi paris ramosus finis, ad sinistram & eandem priorem partem ventriculi pertinens, juxta finem stomachi.
- κ Trunci dextri nervorum cerebri octavi paris ramosus finis, ad sinistram & eandem posteriorem partem ventriculi, quae est juxta finem stomachi, pertinens.
- λ Trunci dextri nervorum cerebri octavi paris ramus, qui respondet ramo θ sinistri, ramosque dat posteriori maxime parti ventriculi.
- Nervus sexti jugi eorum, qui a cerebro profisciscuntur, propagines tum ori ventriculi offert, tum aliis visceribus distribuit.* De dentibus capite xxv.
- μ Dexter truncus pone ventriculum demissus, ac deinde ν conjunctus cum nervo intercostali sinistro.
- ξ, ξ Summum nervorum intercostalium principium, quo conjuncti cum sexto pari nervorum cerebri.
- ο, π, ρ Rami duo, in quos dividuntur trunci nervorum intercostalium, post rursus coeuntes in unum, ac sic fissuram efficientes, per quam arteria carotis interna pertinet, qua una cum his ramis continetur canali ossis petrosi, per quem in cranium penetrat.
- ς, ς Trunci nervorum intercostalium.
- Nervi, qui juxta spinam procedunt.* Ossium examine, ut videtur.
- σ, σ Nervorum intercostalium ganglia cervicalia superiora.
- τ τ τ τ τ τ τ τ Trunci nervorum intercostalium, qua secundum spinam ducti, in collo, thorace, abdomine, pelvi.
- υ, υ, &c. Ganglia nervorum intercostalium. Quorum tantummodo nonnullis litterae inscriptae, ne obrueretur icon.
- φ, φ, φ, &c. Rami, quibus nervi intercostales cum nervis spinalibus conjunguntur.
- χ, χ, χ, χ Extremorum nervorum intercostalium conjunctio cum trunco primi & secundi eorum, qui per os sacrum à priori parte penetrant.
- Sinister cum trunco primi conjunctus esse non apparet: haud dubie propter offulcantem umbram. Quoniam vero dexter conjunctus est, sinistram quoque conjunctum esse videtur existimandum. Omnemque dubitationem tollere potest tabula xix; in qua conjunctum clare exhibuit, r n^o. 11.
- ψ, ψ, ψ, ψ, ψ, ψ, ψ, ψ, ψ Nervorum intercostalium rami, quibus conjunctis oriuntur
- ω, ω, ω trunci insignes, qui secundum corpora dorsi vertebrarum demissi, per diaphragma penetrant, posteaque commiscuntur & conjunguntur, tum Γ, ν cum dextro nervo paris octavi cerebri, tum Δ inter se.
- Θ, Θ Nervorum intercostalium rami, qui cum ramis truncorum ω, ω conjunguntur.
- A nervorum intercostalium truncis ω, ω, atque octavo pari nervorum cerebri, eorumque ramis, ac conjunctione, emittuntur sequentes nervi ad renes, renes succenturiatos, jecur, lienem, ventriculum, intestina, &c. pertinentes.

Quum

Quum vero non ita facile sit, eos, qui in viscera abdominis, proximisque renes, ducuntur, extricare; hoc etiam in plerisque eorum hic intelligendis difficultatem non mediocriter auxit; quod, ut saepe alias fecit, quae animo de iis conceperat potius, quam ipsum aliquid eorum exemplar expresserit; non additis praeterea visceribus. Quo factum est, ut quamvis videar mihi assecutus cum esse, tamen non tam quo nervi illi pertineant, quam quo pertinere eos putem, dicendum mihi fuerit.

A varia complicatione nervorum, quae fit circa principia arteriarum mesenterii, non pauci nervorum furculi vario modo invicem mixti oriuntur, quorum pars in hepar juxta ingressum venae portae, atque in ejus vesicam inferitur, pars renes & incumbentes eis glandulas adit, & hisce particulis, non modo exteriori in sede furculos offert, verum etiam quidam ex eis una cum arteriis cavum renum subeunt, & in ipsorum corpus digeruntur. De renibus capite XXI.

ΛΛΛΛ Rami ad jecur: unde multi etiam ad duodenum. Apparet ramorum conjunctio.

Ad jecur pertinere puto, quoniam circa hunc locum situm est. Fortasse etiam ad cistam fellis; quippe tradit, *a varia complicatione nervorum, quae fit circa principia arteriarum mesenterii, non paucos nervorum furculos vario modo invicem mixtos oriri, quorum pars in hepar juxta ingressum venae portae, atque in ejus vesicam inferatur.* De renibus capite XXI.

Cordis nervi magni non sunt, -- & certe haud majores & minores fortasse sunt, quam illi, qui in portas jecoris inferuntur. De renibus capite XXIV.
Cordis nervi longe minores sunt, quam illi, qui in portas jecoris inferuntur. De multitudine capite XXXII. pagina CL. B.

Ad jecur exiles ac rari nervorum furculi feruntur. De multitudine capite XXXII. pagina CL. A.

ΞΞ Nervus gastrophyploicus dexter: qui secundum ventriculi fundum, qua parte omentum adhaeret, à dextra parte ducitur. Ramos emittit Π, Π, Π ad ventriculum pertinentes, & Σ, Σ, Σ, Σ, Σ ad omentum.

Ab eo etiam ramos ad duodenum pertinentes inveni.

ΥΥΥ Nervus, ut puto, ad renem dextrum, & ad succenturiatum.

Nimirum circa haec loca siti sunt: inque loco modo dicto, de renibus capite XXI, subjicit haec, *partem renes & incumbentes eis glandulas adire.*

Cordis nervi haud majores & minores fortasse sunt, quam illi, qui in renes inferuntur. De renibus capite XXIV.

ΦΦ Rami, puto, ad lienem: qui circa hunc locum situs est.

Ψ Nervus gastrophyploicus sinister: qui secundum ventriculi fundum, ubi omentum adhaeret, à sinistra parte ducitur, ramosque dat Ω, Ω ventriculo, & γ, γ, &c. omento.

2, 2, 2, 2 Rami, puto, ad renem sinistram, & renem succenturiatum.

Cur putem, attuli in annotatione ad U. Ubi etiam Eustachii verba adducta.

3 3 3 3 3 Rami, qui comites vasorum spermaticorum, ad testes pertinent.

4, 4, 4 &c. Rami, ut puto, ad mesenterium & intestina.

Puto primum, quod hi rami in icone subjacent nervis gastrophyploicis, eorumque ramis gastricis, & hyploicis; ut ventriculo & omento intestina cum mesenterio subjacent. Deinde, quod positi ante ramos, qui secundum spinam ducti; sic ut ante spinam intestina cum mesenterio posita.

5, 5, 5 &c. Rami, qui crebre conjuncti inter se, secundum corpora vertebrarum

rum lumborum & ossis sacri, ad imam pelvem pertinent: ubi ramis, quos emittunt, conjunguntur 6 cum tertio, 7 quartoque pari eorum, qui per foramina priora ossis sacri penetrant.

6 in sinistro, & 7 in utroque latere. Hic umbrae in archetypa offuscant conjunctionem, quam clare exhibet tabula XIX. n^o. 11. 2, A, A.

8, 8, 8, &c. Rami, quos rami 5, 5 accipiunt à truncis nervorum intercostalium.

9, 9, 9, &c. An rami ad mesocolon, colique partem sinistram?

10, 10: 10 Nonum par nervorum cerebri, quod linguale appellant, aliquot principiis oriens à latere corporum pyramidalium.

11 Trunci noni paris nervorum cerebri ramosus finis, quo pertinet ad biventrem maxillae, hyoglossum, geniophyoideum, genioglossum, linguam, &c.

12, 12 Nervi noni paris cerebri ramus insignis, qui per collum demissus, ramis suis pertinet ad sternothyreoideum, coracophyoideum, sternophyoideum, &c. Occurrerunt, ut solet, ramorum diversitates.

13 Ramus, quo nervorum cervicalium secundus conjunctus cum ramo illo 12 nervi noni paris cerebri.

14: 14, &c. Nervi cervicales. 14: 14 Secundi. 15: 15 Terti. 16: 16 Quarti. 17: 17 Quinti. 18: 18 Sexti. 19: 19 Septimi. 20: 20 Octavi.

21 Ramus, quo nervorum cervicalium secundus cum tertio conjunctus.

22: 22 Rami, quibus nervorum cervicalium tertii cum quartis conjuncti.

23 Ramus nervorum cervicalium quarti, qui accedit ad spinalem recurrentem. Vide b tabulae xx. n^o. 11.

24, 25: 24, 25 Nervorum diaphragmaticorum principia: 24 alterum à nervorum cervicalium quarto, 25 alterum à quinto.

26: 26 Nervi diaphragmatici. Quorum dexter rector, non impeditus à corde. Sinister autem, ut cor oblique in sinistram partem deorsum vergit, ita etiam oblique descedit, ac longior est.

27: 27 Nervorum diaphragmaticorum ramosus finis in diaphragmate.

28: 28 Nervorum cervicalium inferiorum quatuor, & dorsalium primi, implicatio & commissio; unde brachiales deinde fiunt.

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 Nervi dorsales.

40, 41, 42, 43, 44: 40, 41, 42, 43, 44 Nervi lumbales.

45, 46, 47, 48: 45, 46, 47, 48 Nervi ossis sacri.


49 Ramus, quo nervus secundus ossis sacri conjunctus cum tertio.

Umbra offuscata in archetypa conjunctionem hujus cum secundo ossis sacri: quae conjunctio clare exstat in tabula XIX. n^o. 11. inter A & II dextras.


50: 50 Rami ab ultimis lumbalium, & 51: 51 à quartis: qui conjuncti inter se, accedunt ad sacri nervos primos, in dextro latere tres, in sinistro duos; à quibus fiunt nervi ischiadici.

52: 52 Nervi ischiadici.


Vertebrae, & ligamenti earum intermediis, ossique sacro, ac coccygi, litteras non inscripti, quum & per se satis cognosci queant, & notarum nimis jam plenam iconem hanc magis obruere non conveniat.



TAB. XVIII. N° 1.



TAB. XVIII. N° II.



T A B U L A XIX.

Nº. I. MUSCULI, &c.

- M**asseter.
b Osseus auris introitus.
c Rectus lateralis capitis.
d Trachelomastoideus.
 Ex loco, in quo positus, eum esse colligo.
e Splenius capitis.
 Hunc esse, ex comparatione tabulae xx. i nº. i. apparere puto.
f: f Levatores scapularum.
 Sinistrum esse levatorem illum docet comparatio tabulae xx. k nº. i. Cui dexter similis quum sit, eum quoque levatorem esse apparet.
g: g Aut scaleni medii, aut loci eorum.
 Confer tabulae xxxviii. g: g.
h h Rectus internus major capitis.
i, i, i, &c. Processus transversi vertebrarum colli septem.
k Longus colli.
l, l, l, l, l, l Colli vertebrae septem.
m, m, &c. Vertebrae dorsi duodecim.
n, n, &c. Vertebrae lumborum quinque.
o Os sacrum.
p Coccygis os primum.
 Ligamenta inter corpora vertebrarum intercedentia apparent per se.
q, q, &c. Costae.
r, r, &c. Intercostales interni.
s, s, &c. Intercostales externi. Certe locus eorum.
t Serratus magnus.
u Latissimus dorsi.
v w Obliquus externus abdominis. **w** Inversi pars interior.
x Obliqui interni abdominis inversi pars interior.
y z: z Transversi abdominis. **y** Pars exterior, **z** interior.
A Quadratus lumborum.
B: B Psoae magni. Dexter truncatus.
C: C Cristae ossium ilium.
D: D Iliaci interni.
E Videtur indicare voluisse membranam tenuem & tendinosam, quae nervo hic adhaerens, superinducta vicinae parti iliaci interni.
F: F Glutei minores.
G Trochanter major.
H: H Ossa pubis.
I Synchondrosis pubis.
K Obturator externus.
L Obturator internus.
M, N: M, N Adductores breves femorum, hic constantes è partibus duabus.
 In dextro femore truncatae.
O: O Pectinei, truncati.
P: P Adductores longi femorum, truncati.

Dd

Q:

Q: Q Adductores magis femorum.

R Gracilis.

S: S Vastus interni.

T: T Crurales.

V: V Vastus externi.

W X Rectus cruris. W In exteriora inversi pars interior.

Y: Y Rectorum crurum extremi tendines truncati & deorsum inflexi.

Z: Z Extrema communia vastorum & rectorum.

aa: aa Fibulae.

β Gracilis tendo.

γ: γ Semitendinosorum tendines.

δ: δ Gemelli crurum.

ε Plantaris.

ζ: ζ Solei.

η ηη Tibiae.

θ: θ Extensores longi digitorum pedum. θ: θ In exteriora inversorum partes interiores.

κ: κ Peronei longi.

λ: λ Peronei breves.

μ: μ Extensores longi pollicum pedum.

Extremis pedibus lineamenta ossium tarsi & metatarsi inscripta.

ν Pectoralis, detracti, & inversi, pars interior.

ξ Serrati antici, detracti, & inversi, pars interior.

ο Deltoides.

π Supraspinatus.

ρ Processus coracoideus.

σ Subscapularis.

ς Bicipitis brachii caput brevius, truncatum.

ε Os humeri.

τ: τ Coracobrachiales.

υ φ: υ φ Tricipites brachiorum. υ: υ Partes, quae longi vocantur. φ: φ Partes, quae brachiales externi.

χ: χ Brachiales interni.

ψ Tricipitis brachii pars, quae brevis appellatur.

ω Condylus major ossis humeri.

Γ: Γ Supinatores longi, truncati.

Δ: Δ Radiales externi.

Θ: Θ Supinatores breves.

Α: Α Flexores longi pollicum manuum.

Ξ: Ξ Profundi.

Π Ulnaris interni, non longe ab extremo truncati, & inversi, pars interior.

Σ: Σ Abductores longi pollicum manuum.

Dextro in brachio nisi abductor ipse, locus ejus.

Φ Extensor minor pollicis manus.

Ψ Extensor major pollicis manus.

Ω Tendines radialium externorum.

ι Supinatoris longi truncati extremum.

ο Opponens pollicis manus.

Opponentem esse puto, quod & similior est opponenti, quem puto,
69 tabulae xxxiii, quam abductori, quem puto, brevi, 43 tabulae

xxxiii;

xxxii; & opponens sequitur post abductorem brevem, quem hic deductum esse ex eo colligimus, quod ramus nervi 44 n°. 11, qui ad eum pertinet, hic truncatus est.

- 3 Flexor brevis pollicis manus.
- 4 Carpi ligamentum interius, armillam referens.
- 5, 5, 5 Sublimis tendines, 5 truncati.
- 6 Ulnaris interni extremum truncatum.
- 7 Abductor digiti minimi manus.

N°. 11. N E R V I.

Nervos interiores exhibet, ut secundum musculos, ossa, aliaque ducti sunt.

a: a Primorum ramorum quinti paris nervorum cerebri, qui ophthalmici vocantur, rami ex cavis ossibus oculorum ad frontem pertinentes. Sunt B figurae v. 111. 1. tabulae xviii.

b: b Secundorum ramorum quinti paris nervorum cerebri rami, qui ex foraminibus, quae in ossibus maxillaribus infra orbes oculorum sunt, ad profunda faciei infra oculos pertinent. Est H figurae 1. tabulae xviii.

c: c Ramorum maxillarium, qui sunt rami ramorum tertiorum quinti paris nervorum cerebri, rami, è canalibus maxillae inferioris per foramina, quae sunt à latere menti, emissi; perque mentum labiumque inferius ramosi.

Postquam a molaribus ad minores dentes descensum est, nervus cum arteria, quae illum comitatur, bipartito scinditur, cujus pars una per foramen eo loco sculptum, ad labium inferius emergit; --- quod quidem etiam in homine ab his, qui sectionem docte & accurate tractant, cerni non difficulter potest. De dentibus capite xxi.

d Truncus octavi paris nervorum cerebri cum nervo spinali recurrente conjunctus; ut f figurae 11. tabulae xviii.

e Octavi paris nervorum cerebri truncus rescissus.

f Nervus spinalis recurrens. g Ramus ejus ad cleidomastoideum & sternomastoideum pertinens. Est g, h figurae 11. tabulae xviii.

h Nervi spinalis recurrentis conjunctio cum tertio nervorum cervicalium. Est i figurae 11. tabulae xviii. Post spinalis recurrens retrorsum ducitur: vide a tabulae xx. n°. 11.

iii Nervus intercostalis sinister.

k Nervi intercostalis ganglion cervicale superius.

l Ramus nervorum cervicalium secundi, ad ganglion k accedens.

m Ramus nervorum cervicalium primi, ad idem ganglion k.

n, o Rami à nervis cervicalibus ad nervum intercostalem accedentes.

p Nervi intercostalis ganglion in principio thoracis. Ad sequentes, quum per se appareant, notas non apposui.

q, q, &c. Rami, quibus nervus intercostalis conjunctus cum nervis spinalibus: nempe cervicalium septimo, & octavo; costalibus, & lumbalibus omnibus. Quorum illi, quibus conjunctus cum costalium infimo, & lumbalium proximis quatuor, per psoam magnum penetrant.

r, s Extremus nervus intercostalis, pertinens ad ossis sacri nervum primum r, & secundum s.

t Nervus insignis, juxta dorsi vertebrae oriens à nervo intercostali: hic quidem principiis sex, juxta ramos, quibus intercostalis conjunctus cum dor-

Dd 2

fa-

salium quarto, quinto, sexto, septimo, octavo, nono. Est $\omega\omega$ figurae 11. tabulae XVIII. Qui nervus, hic truncatus, per diaphragma penetrat in abdomen: ubi cum octavo pari nervorum cerebri, & cum aliis nervi intercostalis ramis conjungitur, &c. Vide tabulae XVIII. figuram 11.

u Nervi intercostalis ramus Θ figurae 11. tabulae XVIII.

w, w, &c. Rami, quibus nervus intercostalis dexter conjunctus cum spinalibus. Vide ϕ, ϕ , &c. figurae 11. tabulae XVIII.

x, y Intercostalis dextri rami, qui r, s sinistri.

z: z Rami, qui $\delta: \delta$ figurae 11. tabulae XVIII.

A: A Rami, qui γ, γ figurae 11. tabulae XVIII.

B: B Nervorum cervicalium secundi.

C: C Rami, quibus nervorum cervicalium secundi cum tertiis conjuncti.

Conjunctio cum cervicalium tertiis commaculata est in archetypa, eo-
que obscurata: de quo dictum annotatione ad T figurae 1. tabulae XVIII.
Confer tabulae XVIII. figurae 11. 21.

D: D Nervorum cervicalium tertii.

E: E Rami, quibus nervorum cervicalium tertii cum quartis conjuncti.

Dextri conjunctio cum quarto commaculata est in archetypa: de quo
dictum annotatione ad T figurae primae tabulae XVIII. Conferatur hujus
tabulae XIX. sinister, & tabulae XVIII. figurae 11. 22.

F: F Nervorum cervicalium quarti.

G: G Nervorum cervicalium quinti.

HIK: HIKL Nervi diaphragmatici, duobus principiis orientes, altero H à
nervorum cervicalium quarto, altero I à quinto. K: K Trunci eorum;
quorum sinister, ob mucronem cordis in sinistram vergentem, sinistror-
sum deflectit. L Dextri ramosus finis in diaphragmate. Vide 24 25 26
27: 24 25 26 27 figurae 11. tabulae XVIII.

M: M Nervorum cervicalium sexti.

N: N Nervorum cervicalium septimi.

O: O Nervorum cervicalium octavi.

P: P Nervorum dorsaliū primorum rami ad cervicalium octavos accedentes.

Confer 29: 29. figurae 11. tabulae XVIII.

Q, R, &c. Nervorum dorsaliū rami costales, qui secundum costas ducti.

Q: Q Primi. R: R Secundi. S: S Tertii. T: T Quarti. U: U Quinti.
V: V Sexti. W: W Septimi. X: X Octavi. Y: Y Noni. Z: Z Decimi.
 $\alpha: \alpha$ Undecimi. $\beta: \beta$ Duodecimi. Undecim primi in sinistro latere sub-
eunt musculos intercostales internos: quibus in dextro detractis, apparet
quomodo rami illi inter musculos intercostales internos externosque ducan-
tur. Ramos emittunt, quorum alii ad intercostales musculos pertinent,
alii ad exteriora penetrant. Duodecimi autem primum sunt post psoas
magnos, dein secundum internam partem quadratorum lumborum &
transversorum abdominis: quod in latere sinistro exhibitum.

γ An nervi costalis primi?

δ Nervi costalis secundi ramus, qui per musculum intercostalem externum
secundum, infra costam secundam, penetrat, statim juxta principium ca-
pitis serrati magni, quod à costa illa oritur: ac deinde secundum idem il-
lud caput flexitur retrorsum, posteaque per exteriora latissimi dorsi sub
cute ducitur.

ϵ Similis ramus nervi costalis tertii.

ζ Si-

- ζ Similis ramus nervi costalis quarti. Is ramus emitit sub cute tum retrorsum ductos, tum antrosum.
- η Similis ramus nervi costalis quinti. Penetrat primum per musculum intercostalem externum, dein per caput obliqui externi abdominis, quod à costa quinta oritur; duciturque postea sub cute.
- θ, ι, κ Nervorum costalium septimi θ, octavi ι, noni κ, rami ad internam partem obliqui externi abdominis.
- λ Nervi costalis decimi ramus. Postquam per musculum intercostalem externum & per transversum abdominis penetravit, inter transversum & obliquum internum pertinet in priora ad rectum; perque cum etiam, aponeurosesque obliquorum, penetrat ad loca sub cute.
- μ Nervi costalis undecimi ramus. Ducitur, penetratque ut decimi ramus λ.
- ν Nervi costalis decimi ramus ad interiora obliqui interni abdominis.
- ξ Nervi costalis undecimi ramus ad interiora obliqui interni abdominis.
- ο, π Nervi costalis, ut videtur, duodecimi rami. Ducuntur inter transversum & obliquum internum abdominis.
- ε Nervorum lumbalium, ut videtur, primi ramus. Ducitur inter transversum & obliquum internum abdominis.
- σ, σ' Nervorum costalium duodecimorum rami. Per transversos abdominis penetrantes continuantur in tabula xx. n°. 11. δ, ε: δ, ε: inque priora ducti, rami ο, π esse videntur.
- τ, τ' Nervorum lumbalium primi.
- υ, υ' Nervorum lumbalium primorum rami, qui per transversos abdominis penetrantes, continuantur in tabula xx. n°. 11. ζ: ζ. Sinister videtur ramus ε esse hujus tabulae.
- φ Nervorum lumbalium secundus. Ejus recisi rami duo sunt radices nervi ψ.
- χ Conjungitur nervorum lumbalium secundus cum lumbalium tertio, & cum radice superiore nervi ι.
- ψ Nervus, ad quem φ apposita in latere sinistro, gemina hic radice oriens, altera à nervorum lumbalium primo, altera à secundo.
- ω Nervorum lumbalium tertius.
- Γ Nervorum lumbalium quartus.
- Δ Ramus, qui à nervorum lumbalium quarto accedit ad nervum ischiadicum.
- Θ: Θ Nervorum lumbalium quiti.
- Α: Α Primi nervorum ossis sacri.
- Ξ: Ξ Secundi nervorum ossis sacri. Dexter cum tertio conjunctus ramo intermedio.
- Π: Π Tertii nervorum ossis sacri.
- Σ: Σ Quarti nervorum ossis sacri.
- Φ Nervus, cujus origo indicata in dextro latere ψ, ex psoa magno emergens, cum eoque pertinet ad inguen, ante tamen divisus in duos, qui sub cute ducuntur, H, I tabulae xxxi. n°. 11. in femore sinistro, & scroto.
- Ψ Nervus, qui gemina radice oritur à nervorum lumbalium secundo φ, ubi radices illae recisae. Hic nervus est nervus Ω tabulae xxxi. n°. 11. in femore sinistro.
- Ω Nervi cruralis ramus, qui cum nervo Ψ conjungitur in unum. Est G tabulae xxxi. n°. 11. in femore sinistro.
- ι: ι Insignis ab utroque latere nervus, qui radicibus duabus, altera à lumbalium secundo & tertio, altera à quarto, ortus, deorsum ducitur primum sub psoa magno, dein per latus pelvis ad superiorem partem magni forami-

Ee

mi-

- minis ossis coxae: ubi dividitur in ramos duos, 2 priorem, & 3 posteriorem. Quorum
- 2 Prior per sinum, qui in superiore parte foraminis magni ossis coxae est, supra obturatores penetrat, porroque sub pectineo & adductore longo femoris, secundum obturatorem externum primum, deinde adductorem brevem femoris, dein adductorem magnum, ducitur: ramosque dat adductori longo & brevi, & ad postremum gracili.
 - 3 4 Posterior per eundem sinum penetrat, ac mox deorsum ducitur inter obturatores, dans ramum externo: penetrat deinde per externum illum 4, duciturque inter pectineum, adductoremque brevem ac longum à parte priore, obturatorem externum & adductorem magnum à posteriore, ramoso denique fine ad adductorem magnum pertinens.
 - 5 Nervus ischiadicus.
 - 6 6 Nervi crurales. Quorum dexter hic fit è conjuncto nervorum lumbalium tertio cum quarto, accedenteque parte secundi. In sinistro insula, per quam inveni penetrantem portionem psoae magni.
 - 7 7 Nervorum cruralium rami ad iliacos internos.
 - 8 8 Nervorum cruralium rami exteriores, qui per femora ducti, ramos dant iliakis internis, rectis crurum, vastis internis, cruralibus, vastis externis.
 - 9 9 Nervorum cruralium rami interiores, per femora ducti, ramosque dantes vastis internis.
 - 10 10 Radices nervorum M: M tabulae XXI. n^o. 11. Docet, puto, comparatio.
 - 11 11 Radices nervorum N: N tabulae XXI. n^o. 11. Colligo ex comparatione.
 - 12 Hic truncatus ramus interior nervi cruralis dextri, ubi ramus ille inter sartorium gracilemque emersurus, continuatur tabula XXI. n^o. 11. S in cruce dextro.
 - 13 Radix rami, qui postquam sartorium perforavit, continuatur tabula XX. n^o. 11. R.
 - 14 Truncatus ramus interior nervi cruralis sinistri, ubi ramus ille inter sartorium & gracilem penetraturus, continuatur tabula XXI. n^o. 11. S in cruce sinistro.
 - 15 15 Nervorum ischiadicorum rami 9: 9 tabulae XX. n^o. 11: qui inter fibulas & peroneos longos in priora emergunt, ac deinde ducuntur primum sub extensoribus digitorum pedum longis, dein inter extensores longos pollicum & tibiales anticos, post à latere extensorum longorum pollicum emergunt, 16: 16 ac ducuntur per pedes extremos. Ramos emittunt 17: 17, 18, 19: 20, 21: quorum 17: 17 ad extensores longos digitorum pedum pertinent: 18 ad peroneum longum: 19 sub cute ducitur, divisus in duos, qui ramis 20 & 21 respondent: 20, 21 sunt varietas rami 19, in duos illos 20, 21 citius divisi, suntque 3 & 4 tabulae XXI. n^o. 11.
 - 22 22 Nervorum cervicalium quinti, sexti, septimi, octavi, vario modo conjuncti, accedentibus etiam ramis à costalium primis. Ad axillas in primis pertinent, inque nervos brachiales migrant.
 - 23 Nervorum ad axillam pertinentium ramus ad interiora pectoralis.
 - 24 Nervorum ad axillam pertinentium ramus ad interiora ferrati antici.
 - 25 25 Nervorum ad axillam pertinentium ramus ad latissimum dorsi. Qua parte sub latissimo illo ducitur, exhibitus tabula XX. n^o. 11. 41.
 - 26 Nervorum cervicalium sexti ramus, qui secundum ferratum magnum, & dein sub latissimo dorsi ductus, pertinet ad ferratum magnum. Qua parte sub latissimo ducitur, exhibitus tabula XX. n^o. 11. 42.

- 27, 28, 29, 30: 27, 28, 29, 30 Quatuor magni nervi brachiales, in quos ab utroque latere nervi per axillas ducti, praecipue migrant. 27: 27 Primi, qui musculo; coracobrachiales quasi perforant. 28: 28 Secundi, qui per humerorum longitudinem ad flexum cubitorum, indeque per cubitos ad volas ducuntur. 29: 29 Terti, qui pone ossa humerorum ducuntur, suntque 43: 43 tabulae xx. n^o. 11. Quarti 30: 30, qui ducuntur per humerorum longitudinem ad partem posteriorem condylorum majorum, indeque per cubitos in volas.
- 31 Nervorum brachialium tertii 29 ramus, qui in posteriora ductus continuatur tabula xx. n^o. 11. 37.
- 32 Hic primus nervorum brachialium 27, postquam primum sub coracobrachiali ductus, penetrat per eum, posteaque ducitur sub bicipitis capite brevior, ramos dans bicipiti & brachiali interno: dein inter bicipitem & brachialem internum à priori parte emergens, ducitur sub cute, qui 25 tabulae xxi. n^o. 11; hic autem, ubi emergeret, rescissus 33: 33.
- 34 Primi brachialium ramus, qui cum brachialium secundo conjungitur. Idem in brachio sinistro.
- 35: 35 Hic secundi brachialium 28: 28 ramos dant pronatoribus teretibus, radialibus internis, sublimibus, palmaribus longis.
- 36: 36 Brachialium secundorum rami insignes, qui ramos dant profundis, & flexoribus longis pollicum: ac postea 37: 37 musculis illis interferti, pertinent ad pronatores quadratos.
- 38 Hic secundus brachialium subit ligamentum carpi interius, penetratque 39 ad volam: in qua dividitur in ramos quinque, 40, 41, 42, 43, 44. Quorum
- 40 Primus dat ramum lumbricali tertio. Post dividitur in duos, alteroque eorum ducitur secundum latus digiti annularis, quo is spectat medium: altero secundum latus medii, quo is annularem spectat.
- 41 Secundus dat ramum lumbricali secundo. Ac deinde dividitur quoque in duos, altero eorum ducto secundum latus digiti medii, quo spectat is indicem: altero secundum latus indicis, quo is spectat ad medium.
- 42 Tertius ramum dat lumbricali primo: posteaque secundum latus indicis ducitur, quo is pollicem spectat.
- 43 Quartus ad pollicem pertinet, divisusque in duos, iis secundum utrumque latus ejus ducitur.
- 44 Quintus dat ramum abductor brevi pollicis, hic truncatum. Ac deinde interfertur opponenti pollicis & flexori brevi, pertinet ad opponentem.
- 45: 45 Continuationes nervorum, quorum dextro 51 tabula xx. n^o. 11. inscripsi. Brachialium tertii 29: 29 postquam ex cavis axillarum secundum ossa humerorum retrorsum, ac deinde inter brachiales externos ab altera, & longos brevesque ab altera parte, posteaque inter brachiales internos & supinatores longos ducti, hic 45: 45 inter brachiales internos & supinatores longos emergunt, ac deinde per internam partem cubitorum ducuntur: datisque ramis supinatoribus longis & radialibus externis, per supinatores breves penetrant 46: 46: unde continuantur tabula xx. n^o. 11. 52: 52.
- 47: 47 Hic truncati nervi continuantur tabula xxi. n^o. 11. 27, & tabula xxiii. n^o. 11. 10.
- 48, 48 Brachialium quarti 30 rami ad brachialem externum. 49, 49 Ad ulnarem internum. 50 Ad profundum.
- 51 Ejusdem ramus, qui sub ulnari interno ad dorsum cubiti extremi penetrat: unde continuatur tabula xxi. n^o. 11. 38, & tabula xxiii. n^o. 11. 15.

Et 2

Post

- Post hunc ramum quartus brachialium ante ligamentum carpi interius ducitur ad volam: in qua emittit ramos tres, 52, 53, 54. Ex quibus
- 52 Primus insignis, per volam, sub profundi tendinibus, lumbricalibusque, ductus, ramis suis pertinet praecipue ad hos: abductorem minimi, adductorem ossis metacarpi quarti, interosseo, adductorem pollicis, flexorem brevem pollicis, abductorem indicis.
- 53 Secundus emittit sub cute ductum, hic truncatum: aliumque, ad abductorem digiti minimi. Duciturque deinde secundum latus posterius digiti minimi.
- 54 Tertius, circa radicem digiti annularis & auricularis bipartitus, altero ramo ducitur secundum latus digiti auricularis, quo is annularem spectat; altero secundum latus annularis, quo spectat is auricularem.



TAB.


XX. N^o 1.

10/1
A.



TAB.

XX. N° II.



TABULA XX.

Nº. I. MUSCULI, &c.

- a** Zygoma.
b Masseter.
c Maxilla inferior.
d Obliquus superior capitis.
e Obliquus inferior capitis.
f Rectus posticus major capitis.
g Rectus posticus minor capitis.
h Complexus.
i Splenius capitis.
k Levator scapulae.
l Splenius colli.
m Spinalis colli.
n Scalenus posticus.
o Scalenus medius.
p Serratus posticus superior.
q Rhomboideus minor.
r Rhomboideus major.
s Sacrolumbalis.
t Longissimus dorsi.
u Spinalis dorsi.
v Multifidus, juxta os sacrum truncatus.
w, w, &c. Costae.
x, x, &c. Intercostales externi.
y, y Transversi abdominis.
z, z, &c. Processus transversi vertebrarum dorsi & lumborum.
α, α Spinae vertebrarum.
β Os sacrum.
γ Coccyx.
δ, δ Ossa ilium.
ε, ε Glutei minores.
ζ Piriformis.
η, η Geminorum superiores.
θ, θθ Obturatores interni.
ι, ι Geminorum inferiores.
κ, κ Trochanteres majores.
λ, λ Quadrati femorum.
μ, μ Principia capitum longiorum bicipitum crurum, truncata.
ν Ligamentum, quod ab osse sacro ad tuber ischii pertinet.
ξ Ligamentum, quod ab osse sacro ad ischii processum acutum pertinet.
ο, ο Levatores ani.
π Sphincter ani externus.
ρ, ρ Adductores magni femorum.
σ, σ, σ, σ Semitendinosi, ε Pars interior, hac parte alterum femur versus
 inversi.

Ff

ε Gra-

5 Gracilis.

τ:τ Semimembranosi. τ:τ Hac parte inversi, & ex-interiore parte expressi.
φ:φ Vasti interni.

χ:χ Bicipitum crurum capita breviora. ψ:ψ Longiora, & superiore parte truncata, & in exteriora inversa, atque ex interiore parte exhibita. ω:ω Eorundem bicipitum extrema.

A: A Vasti externi.

B: B Ossa femorum.

CC: CC Tibiarum ossa.

D: D Truncata principia capitum exteriorum gemellorum crurum.

E: E Poplitei.

FF: FF Tibiales postici.

G: G Flexores longi digitorum pedum.

H: HHH Flexores longi pollicum pedum.

I: I Peronei longi.

K: K Peroneus brevis.

L: L Malleoli externi.

M: M Malleoli interni.

N Calcanei tuber, quo nitimur.

O Caput ad flexorem longum digitorum pedis in planta accedens.

P Abductor digiti minimi pedis.

Q Videtur esse peronei longi tendo aut vaginae suae inclusus, aut rudi modo exhibitus.

R Flexor brevis digitorum pedis, truncatus.

S Abductor pollicis pedis, truncatus.

T: T Scapulae.

V: V Subscapulares.

W: W W Ossa humerorum.

XXY Deltoides. Y In exteriora versi pars interior.

Z Teretis majoris extremum, truncatum.

Γ Latissimus dorsi, truncatus, & in exteriora inversus.

Δ Serratus magnus.

Θ: Θ Coracobrachiales.

Λ: Λ Tricipitum brachiorum partes, quae brachiales externi appellantur.

Ξ: Ξ Brachiales interni.

Π: Π Tricipitum brachiorum partes, quae longi appellantur, truncatae & inflexae.

Σ: Σ Tricipitum brachiorum partes, quae breves vocantur, truncatae & inflexae.

Φ: Φ Extrema tricipitum brachiorum.

Ψ: Ψ Supinatores longi.

Ω: Ω Radiales externi.

1 Condylus minor humeri.

2: 2 Supinatores breves.

3: 3 Ulnae.

4: 4 Profundi.

Dexter similis profundo H tabulae xxxvii. Sinister quoque profundus est, utpote secundum quem nervus 55 n°. xi. ducitur sub ulnari interno, hic idcirco remoto: quemadmodum etiam in tabulae xix. brachio dextro, ejusdem illius nervi secundum profundum 2 n°. i. exhibendi causa, in-

ver-

vertit ulnarem internum II. Adde quod in hac XX. tabula musculus sinister 4 n°. 1. de quo ago, respondet musculo Z n°. 1. tabulae XIX, qui omnino profundus est.

5: 5 Extensores majores pollicum manuum.

6: 6 Indicatores. Dextri tendo truncatus.

7, 8: 7, 8 Abductores longi pollicum manuum. 7, 7 Partes eorum superiores. 8, 8 Partes inferiores.

9: 9 Extensores minores pollicum manuum. Dextri tendo cum extensoris majoris tendine hic conjunctus: ex quo tendo communis, truncatus.

10, 10: 10, 10 Radialium externorum tendines.

N°. II. N E R V I.

Haec icon similis proximae superiori, eodem modo nervos ab hac parte interiores exhibet.

a Nervus spinalis recurrens. Continuatio nervi f tabulae XIX. n°. II.

b Ramus nervorum cervicalium quarti, F sinister tabulae XIX. n°. II: qui ramus adjungitur spinali recurrenti. E qua conjunctione natus c nervus ad cucullarem pertinet. Conferatur 23 figurae II. tabulae XVIII.

d: d Nervorum cervicalium quintorum rami, qui perforant scalenos medios, posteaque per dorsum demissi, ramis suis ad rhomboideos majores pertinent.

e Ramus posterior nervorum cervicalium secundorum dextri: qui hic emergit inter obliquum inferiorem capitis & rectum posticum majorem. Dat recto ramum; penetraturus deinde per complexum, ubi hic rescissus f.

g Idem ramus sinistri lateris, ubi ex complexo emergit. Rescissus ibi, ubi per cucullarem penetraturus: unde continuatur tabula XXIII. n°. II. e in sinistro latere.

h Nervorum cervicalium primi ramus.

i, k, l, m, n, o Nervorum cervicalium rami posteriores: i tertii, l quarti, n quinti, o sexti. Ramus autem k emittitur à principio nervi i: ramus m, à principio nervi l. Sic videtur. Tales certe hic loci nervos invenio.

p, q, r, s Nervorum cervicalium rami posteriores, per musculos hos penetrantes: p tertii, q quarti, r quinti, s sexti. Post penetrant quoque per cucullarem: unde continuantur tabula XXIII. n°. II.

t, u, &c. Rami posteriores nervorum dorsalium: t primi, u secundi, w tertii, x quarti, y quinti, z sexti, A septimi, B octavi, C noni, D decimi, E undecimi, F duodecimi. G Lumbalium primi, H secundi, I tertii, K quarti.

L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, Γ, Δ Nervorum dorsalium & lumbalium rami per musculos, qui dorso & lumbis juxta spinam adjacent, penetrantes. Indicati rami, quos sacrolumbali dant rami W, Y, Z.

Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ, Ω, Ω, α, α, β, β, γ Rami nervorum costalium, qui per musculos intercostales penetrant in posteriora. Θ Sexti. Λ: Ξ Septimorum. Π: Σ Octavorum. Φ: Ψ Nonorum. Ω, Ω: α, α Decimorum. β, β: γ Undecimorum.

δ, ε: δ, ε Nervorum costalium duodecimorum rami, σ: σ tabulae XIX. n°. II, ut, puto, comparatio docet. Penetrant per transversos abdominis, & deinde inter eos & obliquos internos ducuntur in priora.

ζ, ζ Nervorum lumbalium primorum rami. υ: υ tabulae XIX. n°. II. docente, ut

Fs 2

ut puto, comparatione. Per transversos abdominis penetrant, posteaque inter eos & obliquos internos in priora ducuntur.

η Ramus primi nervorum ossis sacri: per cujus foraminum posteriorum primum penetrat.

θ Ramus secundi nervorum ossis sacri: per cujus foraminum posteriorum secundum penetrat. Apparet, quomodo ramum à ramo primi η accipiat.

Suspicio scalpturae hic esse vitium, partemque illam nervi, ad quam θ proxime apposita, tanquam truncatam non fuisse exhibendam, sed ex ossis sacri foramine emergentis specie; ut exhibitus est nervus proximus superior η.

ι Ramus tertii nervorum ossis sacri: per cujus foraminum posteriorum tertium penetrat.

κ Ramus quarti nervorum ossis sacri: per cujus foraminum posteriorum quartum penetrat.

λ Nervus penetrans inter os sacrum & coccygem.

μ Extrema cauda equina, penetrans per hiatum extremum canalis ossis sacri.

ν, ξ, ο, π, ς, σ, ς Horum continuationes esse videntur nervi Θ, Λ, Ζ, Π, Σ, Φ, Ψ tabulae xxiii. n°. 11. An vero ν est per commune caput sacrolumbalis & longissimi dorsi penetrans nervi η ramus primus truncatus? Et an ξ est ramus primus truncatus nervi θ? similiterque ο penetrans nervus ι? &c.

τ: τ Nervi ischiadici.

υ: υ Ischiadicorum rami, qui ducuntur inter pyriformes gluteosque medios ab una parte, & gluteos minores ab altera, ramosque dant gluteis illis minoribus & mediis.

φ: φ Ischiadicorum rami, qui inter duo ligamenta ab utraque parte ossis sacri ad ischia pertinentia ducti, ramos per pingue spargunt, quod est à lateribus ani.

χ: χ Rami ischiadicorum, qui sub gluteis magnis demissi, dant iis ramos ψ: ψ. Dein infra gluteos continuantur tabula xxiii. n°. 11. Ω, α: Ω α. Et quidem rami truncati ω: ω sunt continuati Ω: Ω tabulae xxiii. Rami ι: ι sunt continuati α: α tabulae ejusdem.

Apparet varietas nervorum φχ: φχ. In sinistro latere oriuntur radice communi: & in ramis quoque eorum dissimilitudo.

2: 2 Ischiadicorum rami ad gluteos magnos.

3: 3 Ischiadicorum rami, qui mox in duos divisi, 4 altero pertinent ad anteriorem partem capitis longi bicipitis cruris; 5 altero ad anteriorem semitendinosi.

6: 6 Ischiadicorum rami, qui ramis suis pertinent ad anteriorem partem semitendinosorum, & semimembranosorum.

7: 7 Ischiadicorum rami pertinentes ad anteriorem partem capitum longiorum & breviorum bicipitis crurum.

8: 8 Ischiadicorum rami ad capita breviora bicipitis crurum.

9: 9 Ischiadicorum rami, qui ad priora crurum ducuntur: ubi continuantur tabula xix. n°. 11. 15: 15.

10 Radix rami, qui per suram sub cute ducitur, estque ν tabulae xxiii. n°. 11.

11, 12, 13, 14: 11, 12, 13, 14 Ischiadicorum rami. An 11: 11 ad capita exteriora gemellorum, &c: & an 12: 12 ad interiora? An 13: 13 radices illorum, qui ξ: ξ tabulae xxiii. n°. 11? An 14: 14 ad popliteos? &c. Tales certe ischiadici circa poplites emittunt.

15: 15 Ischiadicorum rami ad tibiales posticos.

- 16: 16, 16 Ad flexores longos digitorum pedum.
 17, 18: 17, 18 Ad flexores longos pollicum pedum.
 19 Ad caput, quod flexor longus digitorum pedis in planta accipit.
 20 Ischiadici ramus, qui emittit ramos 21, 22, 23, 24, 25. Quorum
 21 Pertinet ad adductorem pollicis, interosseo, &c.
 23 Pertinet ad abductorem minimi.
 24 Ducitur secundum latum externum digiti minimi.
 25 Pertinet ad radices digiti quarti & quinti. Ubi dividitur in duos, alteroque ducitur secundum latum digiti quinti, quo quartum spectat; altero secundum quarti latum, quo quintum spectat.
 26 Ischiadici ramus, qui ducitur secundum latum pollicis internum, emittitque ramum 27 ad abductorem pollicis pertinentem.
 28 Ramus, qui ad radicem pollicis, & digiti secundi pertinet, ibique dividitur in duos: eorumque altero ducitur secundum latum pollicis, quo is digitem secundum spectat; altero secundum latum digiti secundi, quo is spectat pollicem.
 29 Ad lumbricalem primum.
 30 Ramus, qui ad radicem digiti secundi, & tertii pertinet, ibique dividitur in duos: quorum altero ducitur secundum latum digiti secundi tertium spectans; altero secundum latum tertii spectans secundum.
 31 Ad lumbricalem secundum.
 32 Ramus, qui ad radicem digiti tertii, & quarti pertinet, ibique in duos divisus, altero ducitur secundum latum digiti tertii, quo is quartum spectat; altero secundum latum quarti, quo ad tertium is spectat.
 33 Ad lumbricalem tertium.
 34: 34 Rami quinti paris nervorum cervicalium. Qui rami penetrant per lunulas scapularum, quae sunt juxta processum coracoideos. Ac dein emittunt ramos 35: 35, qui ducuntur sub supraspinatis, eisque ramos dant. Postea 36: 36 circum spinas scapularum flectuntur, ducunturque sub infraspinatis, ac ramos eis dant.
 37: 37 Brachialium tertiorum rami, 31 tabulae XIX. n°. 11. Unde rami, 38 ad teretem majorem, 39 ad deltoidem. 40 An radix nervi ϕ tabulae XXI. n°. 11?
 41 Nervi 25 tabulae XIX. n°. 11. pars inter latissimum & serratum magnum demissa.
 42 Nervi 26 tabulae XIX. n°. 11. pars inter latissimum dorso & serratum magnum ducta.
 43: 43 Nervorum brachialium trunci tertii, qui pone ossa humerorum ducuntur. Sunt 29: 29 tabulae XIX. n°. 11.
 44, 44, 44: 44 Eorum rami ad brachiales externos. 45: 45 Rami ad longos.
 46: 46 Rami ad breves.
 45, 46 *Ad rectissimos musculos*, inquit Lancisius, *extensorem quidem longum feruntur nervi 25. 11, ad brevem vero 26. 8; quorum certe nervorum progressus sub axilla dextera 19. 26; atque insertio in praefatos musculos 18. 27. & 19. 34. clarius cernuntur.* Hic invenio numeros hos 25. 11. designare latissimum dorso, ramosque per eum ductos nervi, ad quem 41 appositum. Si autem pro 25. 11. reponas 25. 10, designabuntur rami illius nervi, qui 45 in brachio sinistro: qui rami revera ad extensorem cubiti, quem vocant longum, pertinent. Non spectasse autem latissimum dorso, nervumque 41 per eum ductum, colligimus ex iis, quae mox subjicit;

Gg

eorum

eorum nervorum progressum sub axilla dextera, atque insertionem in praefatos musculos 18. 27. & 19. 34. *clarius cerni*. Nam si in sinistro brachio nervum, ad quem 41 apposui, latissimumque dorsi spectasset, haec in dextro quoque brachio cerni traditurus non fuisset, ut in quo nihil exstat eorum. Quanquam tamen numeri, quibus nervos illos in dextro brachio designat, nempe 18. 27. & 19. 34. rei ipsi non plane respondent. Quum vero ibi numeri 19. 34. designent ramos nervi 45 dextri brachii, ad *extensorem* quem vocant *longum* pertinentes, existimari potest, hos 18. 27. designare debere nervos, quos dicit *ad brevem ferri*. Non designant autem eos, sed nervum 43 dextri brachii: quum nervi, qui *ad brevem feruntur*, hoc in brachio sint, ad quos 46 apposui.

- 47 Videtur esse radix rami χ tabulae xxiii. n°. 11. in brachio sinistro.
 48, 49 Videntur esse radices ramorum ι tabulae xxiii. n°. 11. in brachio sinistro. Tales certe hic ramos truncus ille emittit.
 50 Videtur esse radix rami χ tabulae xxiii. n°. 11. in brachio dextro.
 51 Hinc tertius truncus brachialium continuatus tabula xix. n°. 11. 45. Sic & in brachio sinistro.

Neque hîc est *bicipitis principium*, neque hic nervus ς 1 alicui musculo, si quid video, hîc *inseritur*; quod Lancisius *demonstrari* tradit.

- 52: 52 Nervorum brachialium tertiorum trunci 46: 46 tabulae xix. n°. 11, per supinatores breves penetrantes ad exteriora cubitorum: ubi, postquam vicinis musculis ramos dederunt, ducuntur 53: 53 sub extensoribus majoribus pollicum, & indicatoribus; post emergentes 54: 54.
 55 Nervorum brachialium quartus, 30 tabulae xix. n°. 11. Dat profundo ramos 56, 57, 58.

2-85




TAB. XXI. N° 1.



S. L. 107 P



TAB. XXI, N° II.



T A B U L A XXI.

Nº. I. M U S C U L I , &c.

- F**rontalis.
a Frontalium pars per nasum excurrent.
b Orbicularis palpebrarum.
c Temporalis.
d Attollens auriculam.
e Occipitalis.
f Zygoma.
g Masseter.
h Buccinator.

Ejus certe locus est. Ipsum autem buccinatorem velle videtur, quoniam nervos ad eum pertinentes indicat. Caeterum rudis figura est, ut hoc, quicquid esse existimare quis velit, ne quidem à maxilla distinxerit.

- k, l** Zygomatici.
m Levator labii superioris.
n Levator labii superioris alaeque nasi.
o Orbicularis oris, aut ejus certe locus.
p Depressores labii inferioris.

Depressores labii inferioris nullam aliam ob causam esse dico, nisi quod iis in locis siti sunt. Ex icone tamen perspicuum non est, utrum depressores ipsos, an tantummodo locum eorum obiter indicare voluerit.

- q** Depressor anguli oris.
r Parotis.
s Biventer maxillae.
t Os hyoides, rudi modo indicatum.
u:u Sternohyoidei.
v:v Sternothyreoidei.
w:w Coracohyoidei.
x:x Sternomastoidei.
y:y Cleidomastoidei.
z Scalenus.

A Levator scapulae.

B Splenius.

C:C Cucullares.

D:D Claviculae.

E:E Deltoidei.

F:FF Brachiales interni.

G:G Bicipites brachiorum

HII:HI Tricipites brachiorum. **H** Pars, quae longus appellatur. **I** Pars, quae brachialis externus.

K Condylus major.

L Palmaris longus.

M Ulnaris internus.

N Ulnaris externus.

O Extensor proprius digiti auricularis.

G g 2

P

- P Extensor communis digitorum manus.
 Q Pollicis abductor longus cum extensore minore.
 R: S Radiales externi.
 T Abductor longus pollicis.
 V Supinator longus.
 W Pronator teres.
 X Radialis internus.
 Y Palmaris longus.
 Z Ulnaris internus.
 α Palmaris brevis.
 β Flexor brevis pollicis manus.
 γ, γ, γ, γ Tendines sublimis.
 δ, δ, δ, δ Tendines profundi.
 ε: ε Pectorales.
 ζ: ζ Papillarum loci indicati.
 η: η Serrati magni.
 θ: θ Latissimi dorsi.
 ι: ι Obliqui externi abdominis.
 κ Locus synchondrosis pubis ossiumque pubis indicatus : à quo λ penis dependet.
 μ: μ Funiculi spermatici cum cremasteribus.
 ν: ν Cristae ossium ilium.
 ξ: ξ Glutei medii.
 ο: ο Tensores vaginarum femorum.
 Supra inter sartorium τ & pectineum π in utroque femore locus iliaci interni cum psoa magnus.
 π: π Pectinei.
 ς: ς Adductores longi femorum.
 σ: σ Graciles.
 ς Semitendinosus.
 τ: τ Sartorii.
 υ: υ Vasti interni.
 φ: φ Recti crurum.
 χ: χ Vasti externi.
 ψ: ψ Tendines gracilium.
 ω: ω Tendines semitendinosorum.
 Γ: Γ Gemelli crurum.
 Δ: Δ Solei.
 Θ Flexor longus digitorum pedis.
 Λ Flexor longus pollicis pedis.
 Ζ Tibialis pollicis tendo.
 Π: Π Tibiae.
 Σ: Σ Tibiales antici.
 Φ Extensor longus digitorum pedis.
 Ψ Peroneus longus.
 Ω: Ω Abductores pollicum pedum.

Nº. II. NERVI.

Nervos exhibet, quos subcutaneos appellant. Alii inter musculos, alii per eos penetrant, alii è posteriore parte veniunt.

In (adipem) innumerabiles pene nervorum propagines distribuuntur, quas quidem, ut video in corporibus secandis observasse, in cutem non ita frequenter inferuntur, ut quispiam sorte arbitratur: sed ut plurimum in tenuissimas fibras dissectae, adipis substantia terminantur. De multitudine capite xxxiii. pagina cli. d. Qui locus pertinere huc potest.

a Nervorum cervicalium secundi. Est continuatio rami f tabulae xxxiii. nº. ii.

Ramusculi paris vagi hic meminit Lancisius, designatusque numeris his, 7. 38: qui designant locum inter nervos a & c, ut incertum esse fortasse possit, ad quemnam eorum pertineant. Sive autem ad hunc, sive ad illum pertineant, neuter certe eorum, docente anatome, paris est illius, quod vagum vocatur.

b Ramus, qui continuatur tabula xxxiii. nº. ii. g.

c Nervorum cervicalium secundi.

Hunc inveni effectum ex ramo cervicalium secundi & ramo tertii conjunctis inter se. Et vide annotationem ad a.

d Septimi paris nervorum cerebri portio dura. e Ramus ejus ad zygomaticos. f Ramus ad buccinatorum.

g Nervus spinalis recurrens.

h Nervorum cervicalium tertiorum.

Hunc effectum inveni ex ramo cervicalium tertii conjuncto cum secundi ramo.

i:ii Nervorum cervicalium quattorum.

k:k Nervorum costalium primorum.

l:l Nervorum costalium secundorum.

m:m Nervorum costalium tertiorum.

n:n Nervorum costalium quattorum.

o:o Nervorum costalium quintorum.

p:p Nervorum costalium sextorum.

q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω, Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ Nervorum costalium, & lumbalium primorum. Ex his ramus

θ continuatur tabula xxxiii. nº. ii. T.

ν continuatur ibidem V.

ο continuatur ibidem W.

χ continuatur ibidem Y.

ω continuatur ibidem Z.

Λ continuatur ibidem Γ.

Ψ:Ψ Continuationes ramorum Δ:Δ tabulae xxxiii. nº. ii.

Ω:Ω Continuatio nervi Ψ tabulae xix. nº. ii. Ramus

A continuatur tabula xxxiii. nº. ii. ε.

B continuatur ibidem ζ.

C continuatur ibidem η.

D continuatur ibidem θ.

E continuatur ibidem ι.

F continuatur ibidem κ.

G Est nervus Ω tabulae xix. nº. ii.

Hb

Hic


- Hic est sculpturae vitium, quod macula quoque archetypae indicat. Deberet hic nervus conjunctus exhiberi cum nervo Ω , ut cum nervo Ψ nervus Ω conjunctus tabula XIX. n^o. 11.
- H, I in sinistro femore, & scroto, Continuationes ramorum, in quos dividitur nervus Φ tabulae XIX. n^o. 11. Idem nervi in femore dextro.
- K Nervi penis, per dorsum ejus ducti.
- L: L Nervi ciurales. Confer 6: 6 tabulae XIX. n^o. 11.
- M: M Nervorum cruralium rami ad pectineos.
- N: N Nervorum cruralium rami subcutanei. Quorum rami O: O per sartorios penetrant, continuanturque inde P: P.
- Q Nervi cruralis ramus, qui conjungitur cum ramo subcutaneo P.
- R Nervi cruralis ramus, continuatio rami 13 tabulae XIX. n^o. 11. Per sartorium penetrat, posteaque conjungitur cum nervo S.
- S: S Nervorum cruralium rami, continuationes ramorum 12 & 14 tabulae XIX. n^o. 11. Penetrant inter sartorios gracilesque, postea subcutanei.
- T Ramus respondens ramo, quem emittit nervus R in sinistro crure.
- V Continuatio rami β tabulae XXIII. n^o. 11.
- W Continuatio rami γ tabulae XXIII. n^o. 11.
- X Continuatio rami δ tabulae XXIII. n^o. 11.
- Y Nervi ischiadici extremum ad plantam pertinens.
- Z Continuatio rami π tabulae XXIII. n^o. 11.
- 1 Continuatio rami σ tabulae XXIII. n^o. 11.
- 2 Continuatio rami ς tabulae XXIII. n^o. 11.
- 3, 4 Continuationes ramorum 20 & 21 tabulae XIX. n^o. 11.
- 5 Continuatio rami θ tabulae XXIII. n^o. 11. Conjungitur cum nervo 3, ut ξ cum η tabulae XXIII. n^o. 11.
- 6 Respondet nervo 23 brachii dextri. An varietas ejus?
- 7: 7 Haud dubie 7 & 16 uno trunco orti, sunt cujus radix truncata tabula XIX. n^o. 11. in dextro brachio inter principia nervorum brachialium secundi 28, & quarti 30. Nervi autem 7: 7 continuantur tabula XXIII. n^o. 11. 5: 5.
- 8 Nervorum costalium secundi ramus inter costam secundam & tertiam penetrans. Ramo 9 ad dorsum pertinet: qui continuatur tabula XXIII. n^o. 11. S. Ramo altero 10 per brachium ducitur: hujusque rami ramus 11 continuatur tabula XXIII. n^o. 11. v.
- 12 Respondet ramo 10: continuaturque tabula XXIII. n^o. 11. 7.
- 13 Respondet ramo 9: continuaturque tabula XXIII. n^o. 11. X.
- 14 Videtur esse nervus 25 tabulae XIX. n^o. 11.
- 15: 15 Nervorum brachialium trunci quarti: qui pone condylos majores ducuntur. Sunt 30: 30 tabulae XIX. n^o. 11.
- 16: 16 Haud dubie 16 & 7 uno trunco orti, sunt cujus radix truncata tabula XIX. n^o. 11. in dextro brachio inter principia nervorum brachialium secundi 28, & quarti 30. Horum autem nervorum 16: 16 ramus 17 continuatur tabula XXIII. n^o. 11. 13. Ramus 18 continuatur ibidem 14. Ramus 19 continuatur ibidem 8. Ramus 20 continuatur ibidem 9.
- 21: 21 Nervorum brachialium trunci secundi: qui 28: 28 tabulae XIX. n^o. 11.
- 22 Ramus, quem brachialium primus secundo adjungit: idem qui 34 tabulae XIX. n^o. 11.
- 23 Talem vidi à nervis axillaribus orientem.
- 24: 24 Continuationes ramorum ψ : ψ tabulae XXIII. n^o. 11.
- 25 Primus truncus nervorum brachialium, inter bicipitem brachii & brachiale

- lem internum emergens: qui continuatio est nervi 33 tabulae XIX. n°. 11.
 Ejus ramus 26 continuatur tabula XXIII. n°. 11. 16.
 27 Nervorum brachialium trunci tertii ramus: qui continuatio est rami 47
 tabulae XIX. n°. 11. Ejus ramus 28 continuatur tabula XXIII. n°. 11.
 17. Ramus 29 continuatur tabula XXIII. n°. 11. 18.
 30 Continuatio rami ω tabulae XXIII. n°. 11.
 31 Hic continuatur tabula XXIII. n°. 11. 5.
 32 Continuatio rami 4 tabulae XXIII. n°. 11.
 33 Continuatio rami 2 tabulae XXIII. n°. 11.
 34 Continuatio rami 3 tabulae XXIII. n°. 11.
 35 Continuatio rami 7 tabulae XXIII. n°. 11.
 36 Continuatio rami 11 tabulae XXIII. n°. 11.
 37 Continuatur tabula XXIII. n°. 11. 12.
 38 Ramus trunci quarti nervorum brachialium: qui continuatio est rami 51
 tabulae XIX. n°. 11.



TAB.

XXII.



T A B U L A XXII.

Exhibet venas & arterias subcutaneas appellatas: quarum aliae ex ipsis musculis, aliae inter eos emergunt, aliae ex priore parte veniunt. Pleraeque venae solae sine arteriis comitibus: quasdam comitantur arteriae, venis exiliores. Venae crebre conjunctae inter se. Et dissimilis in duobus lateribus exhibita ratio. Quae omnia ex icone satis apparent. A quibus autem singulae venae & arteriae oriuntur ramis, quanquam tradi de multis facile potest, de multis tamen difficulter posset, quod certa non constat ratio. Et quoniam, expositum si esset, parum haberet utilitatis, exponendi operam suscipere necessarium visum non est.

- a Temporalis.
 b Zygoma.
 c Masseter.
 d: d Occipitales.
 e: e Sternomastoidei.
 f: f Loci complexorum, spleniorum capitis, & levatorum scapularum.
 g: g Cucullares.
 h: h Infraspinati.
 i: i Teretes minores.
 k: k Teretes majores.
 l: l Latissimi dorsi.
 m, m, & c. Spinae vertebrarum.
 n: n Obliqui externi abdominis.
 o: o Obliqui interni abdominis.
 p: p Cristae ossium ilium.
 q: q Glutei magni.
 r Sphincter ani externus.
 s: s Graciles.
 t: t Adductores magni femorum.
 u: u Semimembranosi.
 v: v Semitendinosi.
 w: w Bicipites crurum.
 x: x Partes crassiores vaginarum tendinearum femorum.
 y: y Gemelli crurum.
 z: z z Solei.
 A: A Peronei longi.
 B: B BB Peronei breves.
 C: C Extensor longus digitorum pedis.
 D Tibialis anticus.
 E: E Peronei tertii.
 F Flexor longus digitorum pedis.
 G: G Abductores digitorum minimorum pedum.
 H: H Deltoidei.
 I: I Brachiales interni.
 K: K Supinatore longi.
 L: M L M Tricipites brachiorum. L: L Partes, quae vocantur breves, M: M Partes, quae longi.


- N: N Palmares longi.
O: O Olecrana.
P: P Condyli minores humerorum.
Q Radialis externus.
R Radialis externus longior.
S Radialis externus brevior.
T: T Extensores communes digitorum manuum.
V: V Ulnares externi.
W Extensor proprius auricularis, aut certe locus ejus.
X: X Ulnares interni.
Y Radialis internus.
ZΓ Abductor longus pollicis manus. Z Pars superior, Γ inferior.
Δ Extensor minor pollicis manus.
Θ Ligamentum exterius, armillam referens.



TAB. XXIII. N^o 1.



TAB. XXIII. N° II.



TABULA XXIII.

Nº. I. MUSCULI, &c.

- O**ccipitalis.
a Attollens auriculam.
b Temporalis.
c Frontalis.
d Orbicularis palpebrarum.
e Zygoma.
f Zygomaticus major.
g Buccinator.

Quoniam nervos ad buccinatorem pertinentes indicat, cum velle videtur. Rudis autem figura, ut ne quidem à maxilla distinxerit.

- i** Masseter.
k Sternomastoideus.
l Splenius capitis.
m Complexus.
n:n Cucullares.
o:o Infrapinati.
p:p Teretes minores.
q:q Teretes majores.
r:r Rhomboidei majores.
s:s Sacrolumbales.
t:t Latissimi dorsi.
u:u Obliqui externi abdominis.
v:v Obliqui interni abdominis.
w:w Cristae ossium ilium.
x:x Glutei magni.
y Sphincter ani externus.
z:z Vaginarum femorum partes crassiores una cum tensoribus vaginarum.
A:A Bicipites crurum.
B:B Semitendinosi.
CC:CC Semimembranosi.
D:D Adductores magni femorum.
E:E Graciles.
F Sartorius.
GG:GG Gemelli crurum.
HH:H Solei.
I:I Peronei longi.
KK:KK Peronei breves.
L:L Peronei tertii.
M Extensor longus digitorum pedis.
N Flexor longus digitorum pedis.
O Tibialis posticus.
P:P Abductores digitorum minimorum pedum.
Q:Q Spinae scapularum cum processibus superioribus.

Li 2

R:R

R: R Deltoidei.

S: S Tricipitum brachiorum partes, ex longis & brevibus constantes.

T: T Brachiales interni.

V Biceps brachii.

W: W Condyli minores humerorum.

X Olecranon.

Y: Y Supinatores longi.

Z: Z Radiales externi.

α : α Extensores communes digitorum manuum.

β : β Ulnares externi.

γ : γ Ulnares interni.

δ : δ Palmares longi.

ϵ Radialis internus.

ζ : ζ Abductores longi pollicum manuum. ζ Pars superior. η Pars inferior.

θ : θ Extensores minores pollicum manuum.

ι Extensor major pollicis manus.

Nº. II. N E R V I.

Nervos subcutaneos exhibet: quorum alii inter musculos, alii per eos penetrant, alii è parte priori veniunt.

In (adipem) innumerabiles pene nervorum propagines distribuuntur, quae quidem, ut videor in corporibus secandis observasse, in cutem non ita frequenter inferuntur, ut quispiam sorte arbitratur: sed ut plurimum in tenuissimas fibras dissectae, adipis substantia terminantur. De multitudine capite xxxiii. pagina cli. d. Qui locus pertinere huc potest.

a Portio dura cerebri nervorum paris septimi. Vide d, & c. tabulae xxi. nº. ii.

b Nervorum cervicalium tertii, h tabulae xxi. nº. ii.

c Nervus spinalis recurrens, g tabulae xxi. nº. ii.

d Nervorum cervicalium secundi, c tabulae xxi. nº. ii. Hic autem conjungitur cum ramo nervi e.

Duriusculus auris nervus neque, quod Lancisio visum, apparet ad posteriora etiam occipitis deferri, neque omnino desertur. Per duriusculum enim auris nervum quin portionem duram nervi septimi paris cerebri velit, non videtur dubitandum. Pro ramo autem portionis durae hic habuit ramum cervicalium secundi, cui d inscripti: qui idem est, qui ille, ad quem c apposui tabula xxi. nº. ii. Habuisse apparet ex his, quae addit, ad posteriora etiam occipitis deferri: --- immo vero conjungi videri, ac pene inferi cum ramusculo nervi (e) qui trapezii fines perforans sursum vagatur per occiput, & ad quadratos etiam musculos dirigitur. Hujusmodi autem nervorum conjunctionem perspicue notari sub 6. 23: quae ad nervum, cui d inscripti, pertinere; id in tabula apparet.

e: c Nervorum cervicalium secundorum. Sinister est continuatio nervi g tabulae xx. nº. ii.

f Hic ramus continuatur tabula xxi. nº. ii. a.

g Continuario rami b tabulae xxi. nº. ii.

h: h Rami nervorum cervicalium quatorum, qui i tabulae xxi. nº. ii. Sinistri per cucullarem penetrant: quibus dextri respondent.

i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q

P, Q Nervorum cervicalium, dorsaliū, & lumbalium rami in posteriora per musculos ad loca sub cute penetrantes.

R: R Nervi per infra-spinatos penetrantes. An à nervis 36: 36 tabulae xx. n°. 11?

S Continuatio nervi 9 tabulae xxi. n°. 11.

T Continuatio nervi θ tabulae xxi. n°. 11.

V Continuatio nervi ν tabulae xxi. n°. 11.

W Continuatio nervi ω tabulae xxi. n°. 11.

X Continuatio nervi 13 tabulae xxi. n°. 11.

Y Continuatio nervi χ tabulae xxi. n°. 11.

Z Continuatio nervi ω tabulae xxi. n°. 11.

Γ Continuatio nervi Α tabulae xxi. n°. 11.

Δ: Δ Rami, qui continuantur tabula xxi. n°. 11. Ψ: Ψ.

Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ: Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ. Videntur esse continuationes nervorum ν, ξ, ο, π, ς, σ, ϕ tabulae xx. n°. 11.

Ω: Ω Continuationes nervorum ω: ω tabulae xx. n°. 11.

α: α Continuationes nervorum 1: 1 tabulae xx. n°. 11. Apparet quomodo differant inter se dexter & sinister. Sinistri ramus β continuatur tabula xxi. n°. 11. V. Ramus γ continuatur tabula xxi. n°. 11. W. Ramus δ continuatur tabula xxi. n°. 11. X.

ε Continuatio nervi Α tabulae xxi. n°. 11.

ζ Continuatio nervi Β tabulae xxi. n°. 11.

η Continuatio nervi C tabulae xxi. n°. 11.

θ Continuatio nervi D tabulae xxi. n°. 11.

ι Continuatio nervi E tabulae xxi. n°. 11.

κ Continuatio nervi F tabulae xxi. n°. 11.

λ: λ Nervi ischiadici.

μ: μ Rami nervorum ischiadicorum, qui ad priora crurum pertinent. Sunt 9: 9 tabulae xx. n°. 11. Continuantur tabula xix. n°. 11. 15: 15.

ν Hic nervus supplet defectum nervi α, hoc in pede per crus, ut in pede sinistro, non ducti.

ξ: ξ Nervorum ischiadicorum rami; continuationes 13: 13 tabulae xx. n°. 11.

Circa illum certe locum ab ischiadicis oriuntur. Sinister conjungitur cum nervo ς, ut 5 cum 3 tabulae xxi. n°. 11. Dextri ramus ο continuatur tabula xxi. n°. 11. 5.

π, ς Sunt 4 & 3 tabulae xxi. n°. 11. Ac ramus π continuatur tabula xxi. n°. 11. Z. Ramus σ continuatur tabula xxi. n°. 11. 1. Ramus ϕ continuatur tabula xxi. n°. 11. 2.

ς: ς Continuationes nervorum 7: 7 tabulae xxi. n°. 11.

τ Continuatio nervi 12 tabulae xxi. n°. 11.

υ Continuatio nervi 11 tabulae xxi. n°. 11.

φ: φ Hi oriuntur à nervorum brachialium tertiorum ramis 37: 37 tabulae xx. n°. 11.

χ: χ Rami truncorum tertiorum nervorum brachialium. Videntur esse 47 & 50 tabulae xx. n°. 11. Eorum rami ψ: ψ continuantur tabula xxi. n°. 11. 24: 24. Ramus ω continuatur tabula xxi. n°. 11. 30.

1: 1 Rami nervorum brachialium tertiorum. Unus in dextro brachio, duo in sinistro: quae varietas est. Sinistri videntur esse 48, 49 tabulae xx. n°. 11. Eorum ramus 2 continuatur tabula xxi. n°. 11. 33. Ramus 3 continuatur tabula xxi. n°. 11. 34. Ramus 4 continuatur tabula xxi. n°. 11. 32.

Kk

5 Con-

- 5 Continuatio rami 31 tabulae XXI. n°. 11.
- 6 Primi trunci nervorum brachialium ramus. Est 25 tabulae XXI. n°. 11.
Est continuatio nervi 33 tabulae XIX. n°. 11. Ejus ramus 7 continuatur tabula XXI. n°. 11. 35.
- 8 Continuatio nervi 19 tabulae XXI. n°. 11.
- 9 Continuatio nervi 20 tabulae XXI. n°. 11.
- 10 Ramus trunci tertii nervorum brachialium. Est 27 tabulae XXI. n°. 11.
Est continuatio nervi 47 tabulae XIX. n°. 11. Ejus ramus 11 continuatur tabula XXI. n°. 11. 36.
- 12 Continuatio nervi 37 tabulae XXI. n°. 11.
- 13 Continuatio nervi 17 tabulae XXI. n°. 11.
- 14 Continuatio nervi 18 tabulae XXI. n°. 11.
- 15 Ramus trunci quarti brachialium. Est 38 tabulae XXI. n°. 11. Est continuatio rami 51 tabulae XIX. n°. 11. Hic conjungitur cum ramo nervi 17.
- 16 Continuatio nervi 26 tabulae XXI. n°. 11.
- 17 Continuatio nervi 28 tabulae XXI. n°. 11.
- 18 Continuatio nervi 29 tabulae XXI. n°. 11.




T A B.

XXIV. N° 1.



TAB.

XXIV. N° II.



T A B U L A XXIV.

Nº. I. MUSCULI, &c.

- Z**ygoma.
a Maffeter.
b Maxilla inferior.
c Rudi modo indicata pars posterior colli à latere complexi sub splenio capitis & trachelomastoideo.
d Complexus.
e Splenii capitis. Sinifter truncatus.
f Levatores scapularum.
g Serratus pofticus fuperior.
h Rhomboideus minor.
i Rhomboideus major.
k Splenii colli.
l Spinales dorfi.
m Longiffimi dorfi.
n Sacrolumbales.
o Coftae.
p Intercoftales externi.
q Serrati magni.
r Transverfi abdominis.
s Offa ilium. u:u Criftae.
t Glutei minores.
v Pyriformes.
w Ligamenta ab offe facro ad ifchiorum tubera pertinentia.
x Geminorum fuperiores.
y Obturatores interni.
z Geminorum inferiores.
A Trochanteres majores.
B Quadrati femorum.
C Ifchiorum tubera.
D Levatores ani.
E Coccygei.
F Coccyx.
G Sphincter ani externus.
H Adductores magni femorum.
I Vasti externi.
K Capita breviora bicipitum crurum.
L Vasti internum.
M Offa femorum.
N Vasti internum.
O Extrema truncata & inflexa capitum longorum bicipitum crurum.
P Poplitei.
Q Flexores longi digitorum pedum.
R Tibiales poftici.
S Peronei longi.
T Peronei breves.

Kk 2

V:V

V: V Malleoli externi.

W: W Malleoli interni.

X: X Tibialium posticorum tendines.

Y: Y Scapulae.

Z Supraspinatus.

α Infraspinatus.

β Teres minor.

γ : γ Subscapulares.

δ Os humeri.

ϵ Deltoïdis inflexi pars interior.

ζ : ζ Brachiales interni.

η θ ι κ Triceps brachii. η Capitis, quod longus vocatur, in exteriora versipars interior. θ Caput, quod brevis vocatur. κ Extremum truncatum.

λ Tricipitis brachii pars, quae brachialis externus appellatur.

μ Extremum commune tricipitis brachii capitum illorum, quae longus & brevis appellantur, truncatum & inflexum.

ν Extremum tricipitis brachii.

ξ Condylus major humeri.

\omicron : \omicron Condyli minores humerorum.

π : π Supinatores longi.

ρ : ρ Radiales externi.

σ : σ Supinatores breves.

ς : ς Ulnae.

τ : τ Profundi.

Sinister similis profundo H tabulae xxxvii.

v: v Abductores longi pollicum manuum.

ϕ : ϕ Extensores majores pollicum manuum.

χ : χ Extensores minores pollicum manuum.

ψ : ψ Indicatores.

ω , ω , ω Tendines radialium externorum.

Nº. 11. VENA E ET A R T E R I A E.

Venae & arteriae interiores exhibitae.

a Venae & arteriae per periosteum sub temporali ductae. Sunt w: w tabulae xxv. nº. 11.

b Arteria 14 tabulae xxv. nº. 11.

c Arteria 15 tabulae xxv. nº. 11.

d, d Venae s, s tabulae xxv. nº. 11.

e Vena t tabulae xxv. nº. 11.

f Hi rami respondent ramis alterius lateris venae d & arteriae c: ramusque c in hoc latere respondet arteriae c sinistri lateris. Attamen circum splenium capitis ducuntur: non, detracto splenio, circum complexum, ut in sinistro latere.

g Vena cum arteria, quae ex interioribus per splenium capitis penetrant.

h: h Continuatio venae α tabulae xxv. nº. 11. Earum i, i ramis nullae comites arteriae.

k: k Continuatio venae & arteriae z tabulae xxv. nº. 11. Vena arcus specie continuatur venae h.

l: l Ve-

- l:l Venae, quae sub rhomboideis deorsum ducuntur. m Coniunctio cum dorsali. n:n Horum venae l ramiorum aliis comes arteria; aliis nulla.
- o:o Rami arteriarum subclaviarum, qui comites adiunguntur venis l:l.
- p:p Rami venarum k:k super supraspinatos ducti.
- q Arteriae subclaviae ramus adjunctus venae p.
- r Venae k ramus ductus sub supraspinato. Respondet ei ramus in sinistro latere.
- s Venae & arteriae per scapulae lunulam, quae est ad radicem processus coracoidei, in posteriora penetrantium, rami sub supraspinato ducti.
- t:t Venarum & arteriarum axillarium rami, à quibus u:u rami, qui emittunt ramos v,w,x: v, w, x. v:v Ad anteriorem partem deltoideum. w:w Ad anteriorem partem tricipitum brachiorum partium illarum, quae longi vocantur. x:x Coniunguntur cum ramis d:d.
- y:y Earundem venarum & arteriarum t:t rami, qui dant ramos z:z sub teretibus minoribus penetrantes, post per infraspinatos, inter quos deinde scapulasque ramos emittunt, dantque interiori parti infraspinatorum. α Earum rami ad teretem minorem. β Rami per exteriora praecipue ferrati magis ducti: cui ramos dant.
- γ:γ Venae axillares, quas basilicas appellant.
- δ:δ Venarum axillarium rami, qui coniecti cum venis x:x, deinde cum arteriis comitibus emittunt ramos ε, ζ, η, θ: ε, ζ, η, θ. ε:ε Sub deltoideis sursum ducuntur. ζ:ζ Ad tricipitum brachiorum capita pertinent, quae longi vocantur. η:η Inter tricipitum brachiorum capita illa quae breves vocantur, illaque quae brachiales externi, ducuntur ad cubitos. θ:θ Ad tricipitum brachiorum capita, quae longi appellantur, pertinent.
- ι:ι Venarum axillarium rami, qui coniunguntur cum venis θ:θ.
- κ Vena axillaris profunda. Est η tabulae xxvi. n°. 11.
- λ Externa axillaris vena. Est β tabulae xxvi. n°. 11.
- μ:μ Venae & arteriae τ:τ tabulae xxvi. n°. 11, inter supinatores breves & abductores longos pollicum penetrantes ad cubitorum anteriorem partem. Eorum in duobus cubitis exhibita dissimilitudo. In sinistro ramus venae deorsum ductus mox geminus fit, & arteriam mediam comprehendit: quod interdum fieri monet, explicatione tabulae viii. figurae 1. & 11. T. 2. In dextro simplex vena arteriae comes. In dextro longius ad manum ducuntur. In sinistro emittunt sursum ductos ramos.
- Nimis sane oscitanter profundum axillaris venae ramum, α tabulae xxv. n°. 11, & η tabulae xxvi. n°. 11, descripsit, qui circa medium humeri, atque etiam interdum parum infra, vel supra medium ejusdem fere semper in duas propagines scinditur, quae arteriam hinc inde complexae sub cubiti articulum, non longe tamen ab eo invicem semel, & interdum etiam iterum, & cum tertio quodam humerariae ramo, ab eo, qui sub cute communem venam constituit, enato, uniuntur, paululumque progressae rursus in tres propagines dirimuntur, quarum una, α tabulae xxv. n°. 11, & σ tabulae xxvi. n°. 11, Vesalio incognita bisariam scissa, altera parte, σ tabulae xxvi. n°. 11, amplum ligamentum radio ulnaeque commune perperat; altera, τ tabulae xxvi. n°. 11, eodem ligamento perforato, in anteriorem ulnae sedem distribuitur, μ tabulae hujus. De vena communi profunda brachii, anti-grammate 1.
- ν Vena & arteria υ tabulae xxvi. n°. 11. ad dorsum cubiti penetrantes.
- ξ, ο, π, ς, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω, Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ, Ω Venarum & arteriarum intercostalium & lumbalium rami in posteriora penetrantes.

Ll


In-

Intercostales rami venae sine pari --- in itinere multis in locis, praecipue autem circa posteriorem dorsi partem, simul commiscuntur, alicubi ab arteriis concomitati, alicubi etiam soli incedentes, perforatisque musculis, qui ea in parte sunt, inter eos digeruntur, atque etiam sub cute adipem perreptant (tabula xxii.), quod silentio praetereundum vel ob eam causam non erat, quia musculi posteriori dorsi sedi incumbentes, ab iis ramis extra erumpentibus alimentum plerumque sumunt. De vena sine pari, antigrammate xviii.


- A: A Venarum & arteriarum hypogastricarum X: X tabulae xxvi. n^o. 11. rami inter os sacrum & ischia per principia pyriformium penetrantes ad nates. Varietas in duobus lateribus indicata, tum in ramis, tum quod in dextro venae mox ab ortu bifidae unam arteriam comitantur, eamque mediam continent.
- B Vena ab hypogastricae ramis inter ischion & sacrum penetrantibus oriens, penetransque inter geminorum inferiorem & quadratum femoris, sine comite arteria. Et conjungitur C cum vena G, cruralis ramo.
- D: D Venarum & arteriarum cruralium rami, ab iis mox sub inguinibus orti, & deinde in posteriora penetrantes. Varietas in duobus lateribus, quae apparet. In sinistro venae ramus E conjungitur cum venae A ramo. In dextro ramus F cum vena G.
- G: G Venarum & arteriarum cruralium rami, qui per adductores magnos femorum penetrant in posteriora. Earum varietas in duobus lateribus: inter alias, dextrae venae truncus mox dividitur in duas, quae mediam arteriam continent. Rami, quos emittunt, musculisque dant, satis apparent.
- H A vena & arteria G, antequam per adductorem magnum femoris penetrant, insignis vena & arteria sub extremo adductoris illius demittuntur. Earum rami sunt vena & arteria H per adductorem eundem penetrantes ad bicipitis cruris caput breve.
- I: I Venae & arteriae, cruralium rami, conjuncti cum ramis G: G.
- K: K Venae cruales. Quarum comites
- L: L Arteriae cruales.
- M: M Venarum & arteriarum cruralium rami conjuncti cum ramis G: G.
- N: N Venarum & arteriarum cruralium rami, qui in principio crurum inter tibias & fibulas penetrant ad priora. Ubi venae sunt ☉ & ☿ tabulae xxvi. n^o. 11: arteriae 37: 38 ibidem.
- O: O Venae & arteriae fibuleae. Apparent rami, ac dissimilitudo dextrarum & sinistrarum. Inter alias differentias, dextra vena mox divisa in duas, iis mediam arteriam continet: sinistra simplex, nisi quod à principio ramum emittit, arteriae comitem & ipsum, sed circa cruris medium desinentem.
- P: P Venae & arteriae tibiales. Satis apparent rami earum, ac dissimilitudo. Sinistra vena simplex: dextra mox divisa in duas, comitantes arteriam unam, quam mediam continent.
- Q Rami venae ☿ & arteriae 38 tabulae xxvi. n^o. 11.



TAB. XXV. N° 1.



TAB. XXV. N^o II.



TAB. XXV.

T A B U L A XXV.

Nº. I. M U S C U L I, &c.

Zygoma.

a Masseter.

c Osseus auris introitus.

d Processus mammillaris.

e Complexus esse videtur.

Quoniam vasa, quae circum hunc ducuntur, eadem sunt, quae illa, quae in tabulae xxiv. sinistro latere ducuntur circum complexum, hunc quoque complexum esse, apparere puto. Neque obstat, quod in eadem tabula xxiv. eadem vasa in dextro latere circum splenium ducta videntur. Nam in hac xxv. locus capitis, ad quem musculus e pertinet, complexum esse indicat magis, quam splenium.

f g Biventer maxillae. **g** Truncatus tendo.

h h Stylohyoideus.

i i Mylohyoidei.

k Os hyoides.

l Sternohyoideus sinister, truncatus.

m Cartilago thyreoidea.

n Cartilago cricoidea.

o Hyothyreoideus dexter.

p Pharyngis rudis indicatio esse videtur.

q Sternothyreoideus dexter, truncatus.

r r Glandula thyreoidea.

s s Scaleni medii.

t t Levatores scapularum.

u u Cucullares.

w w Claviculae, truncatae.

x x Deltoidei.

y y Bicipites brachiorum, truncati, & in superiora flexi.

z z Brachiales interni.

A A Hic bicipites à brachialibus internis non distinxisse videtur.

B Coracobrachialis.

C C Tricipitum brachiorum partes, è longis & brachialibus externis constantes.

D D Condyli.

E Brachialis internus.

F F Capita pronatorum tertium, truncata & inflexa.

Vide annotationem ad I.

G G Capita radialium internorum, truncata & inflexa.

Vide annotationem ad I.

H H Capita sublimium, truncata & inflexa.

Vide annotationem ad I.

I I Ulnares interni, ad extremum truncati, & inversi. Sinister in superiore parte cubiti non distinctus à profundo.

L I 2

UL.

Ulnaris externus esse nequit is, cui I inscripti. Externus enim oritur à condylo priore ossis humeri, & hoc brachii positu in posteriore cubiti parte totus situs est. Velis, quaeso, considerare ulnarem externum in tabula xxxix. 26, & in tabula xxxiv. Z, & pendere, an quidem hunc, cui I in hac tabula xxv. inscripti, eundem esse censendum sit. Quod si autem, ut anatome docet, ulnaris internus est, nequit etiam ille, cui H inscripti, ulnaris internus esse. Et quum vasa illa (7 tabulae hujus n^o. 11.) ducantur sub principiis musculorum ab interno condylo orientium, atque, ut vasa illa apparerent, principia illorum musculorum inflexa sint, consequens esse videtur, ex musculis illis interiores exhiberi; qui sunt sublimis, & radialis internus, & pronator teres. Quorum inferior ortu situque interior quum sublimis sit, superior autem ortu sit pronator, medius radialis; existimandum esse videri sublimem esse, cui H inscripti; non ulnarem internum: pronatorem autem esse, cui F inscripti; non radialem internum: radialem denique internum, cui G inscripti; non palmarem. Vides quoque tribus his truncatis musculis F, H, I respondere totidem extrema truncata, M pronatoris teretis, P sublimis, V ulnaris interni. Ne quid addam de eo, quod anatomen ipsam satis ostendere puto. Haec autem silentio praeterire nequivi, ne ignorarentur causae, quae à Winslow hic recedere me coegerunt; quem merito suo facio plurimi, faciuntque omnes. Is in expositione anatomica corporis humani, in explicatione hujus tabulae, ulnarem externum esse ponit, cui I inscripti: radialem internum, cui F: palmarem, cui G: ulnarem internum, cui H.

K: K Profundi.

L: L Supinatorum brevium loci.

M: M Pronatores teretes, truncati.

N: N Supinatores longi, truncati, & modice inversi.

O: O Radiales externi.

P: P Sublimes, truncati.

Q: Q Extrema supinatorum longorum, truncatorum.

R: R Abductores longi pollicum manuum.

S Flexor longus pollicis manus.

T: T Ulnae, aut earum loci.

V: V Extremitates tendines ulnarium interiorum, truncatorum.

W: W Abductores digitorum auricularium.

X Adductor ossis metacarpi digiti auricularis.

Y: Y Ligamenta interiora carpi, armillas referentia.

Z: Z Flexores breves pollicum manuum.

F Videretur opponens pollicis esse.

Similis est musculo, cui 2 inscripti tabula xix. n^o. 1; quem opponentem esse, ibi posui. Similior quoque opponenti, quem puto, 69 tabulae xxxiii, quam quem abductorem pollicis brevem, 43 dextrum tabulae xxxii.

Δ: Δ Latissimorum dorso in exteriora versorum partes interiores. Θ: Θ Eorum extrema tendinea.

Λ: Λ Teretes majores.

ΞΞ: ΞΞ Serrati magni.

Π, Π, &c. Costae, truncatae. Inter quas muscoli intercostales.

ΣΣ Thoracis interiora, costis & intercostalibus musculis obscure indicatis.

ΦΦ Diaphragmatis pars inferior. ΨΨ Ejusdem truncata ora.

Ω Fo-

Ω Foramen, per quod stomachus penetrat.

α: α Renes.

Ambo juxta vertebrarum corpora, ea potissimum parte, qua magis extremae costae in posteriora recurvantur, opportunam sedem nacti sunt; incumbuntque sima sui parte musculis dorsi interioribus, quos ὤσας Graeci dicunt, inanibus iis subjecti partibus, quae inter costarum extrema & os coxae interjectae sunt: quanquam enim renes a spina & vena maxima, quae ei innititur, distant; non tamen, ut alii scribunt, adeo ab ea recedunt, ut musculos femoris & dorsi motores non tangerent. De renibus capite XI.

β: β Transversi abdominis.

γ: γ Quadrati lumborum.

δ: δ Psoae magni.

ε, ε Vertebra lumborum prima, & secunda.

ζ, ζ Ligamenta inter corpora vertebrarum intercedentia.

η Os sacrum.

θ Vesica, cum pene.

ι: ι Iliaci interni.

κκ: κ Cristae ossium ilium.

λ: λ Glutei minores.

μ: μ Tenfores vaginarum femorum, inversi.

ν: ν Offa pubis, truncata.

ξ: ξ Pectinei, à principio truncati.

ο: ο Ischia, truncata.

π: π Adductores breves femorum, à principio truncati.

ρ: ρ Adductores magni femorum.

σ: σ Adductores longi femorum, truncati.

ς: ς Vasti interni.

τ: τ Crurales.

υφ: υφ Vasti externi. υ Hac parte in exteriora versi pars interior. φ Pars exterior.

χ: χ Rectorum crurum resectorum extremi tendines, deorsum inflexi.

ψ: ψ Gemelli.

ω: ω Plantares.

ι: ι Solei.

2 2 Tibiae.

3: 3 Peronei longi.

4: 4 Peronei breves.

5: 5 Fibulae.

Cacterum in pedibus extremis ossa fere tantummodo indicata.

Nº. II. COR, VENAE, ARTERIAE.

Venas & arterias interiores, paucasque exteriorum exhibet, ut per thoracem & abdomen, ac secundum musculos, ossa, partesque alias ductae sunt.

Quibus venis arteriae comites adjunctae sint, ex icone satis apparet: idemque peti poterit ex arteriarum indice, quem indici venarum subjiciam.

1 Cor.

2 Auricula dextra cordis.

Mm

a Vena

- a Vena coronaria cordis minor, five dextra: quae conjungitur cum majore.
Vide S tabulae xvi. figurae 1.
- b, b Rami venae cordis coronariae majoris.
- c Vena cava superior.
- d Radix venae r figurae 111. tabulae xxvii.
- e: e Venae subclaviae: quae inde ab axillis axillares vocantur.
- f Vena thyreoidea, quae conjungitur cum ramo venae jugularis internae dextrae.
- g Radix venae l figurae 111. tabulae xxvii. Comparatio indicare videtur.
- h Radix venae n figurae 111. tabulae xxvii: vel p figurae v. ibidem. Indicare comparatio videtur.
- i: i Venarum mammariarum radices. Vide l: l figurae xii. tabulae xxvii.
- k: k Venae jugulares internae, quae ramos per collum spargunt, &c.
- l Venae jugularis internae ramus, qui mox dividitur in duos: eorumque
- m m: m m Alter sursum ducitur sub biventre maxillae & stylohyoideo, perque malam deinde, ac porro oblique per genam perque nasi latus ad frontem mediam, ubi dexter sinisterque conflunt in venam o frontis: antea autem ramos emitit ad inferiorem partem oculi, exteriora nasi, canthum majorem, supercilium, pertinentes. Cum hac vena m m conjungitur ramus n venae v, quae est ramus jugularis externae. Eadem vena m m emitit ramum, à quo venae duae, p & q: quarum altera p conjungitur cum ramo venae r, ducto in loca quae sub maxilla sunt: altera q dividitur in duas, ad labia perque ea ductas. Illa autem, quae in labio inferiore est, continuatur eidem venae lateris alterius.
- r Alter ramus venae l ducitur sub biventre eodem: anteaque ramum emitit, qui conjunctus cum vena p, pertinet ad loca sub maxilla.
- s, s Rami venae jugularis internae, confluentes in venam unam, quae emitit venam t, per foramen, quod vel in suturae lambdiformis additamento, vel juxta illud est, penetrantem ad sinum lateralem meningis crassae.
- Est hic, opinor, vitium in archetypa, ubi vena haec t apparet tanquam si conjuncta esset ab utraque parte cum arteria 15. Confirmat hoc tabula xxiv; in qua eadem illa vena, ad quam ibi loci e apposui n^o 11, distincta ab arteria eadem c, decussat eam. Ad cujus tabulae normam distinxi in hujus etiam xxv. lineari.
- u Vena à jugulari interna accedens ad venam v, jugularis externae ramum ante auriculam sursum ductum.
- v Ramus venae jugularis externae, qui per exteriora sternomastoidei, ac deinde sub parotide sursum ducitur ante auriculam, utraque eam sub cute. Infra, supraque, truncatus.
- w, w Venae orientes à ramo venae r, qui sursum pone maxillam ducitur, utraque sub temporali per latus calvariae in periosteo ramis w, w pertinet.
- Venas & arterias temporales esse Winslowus, multae diligentiae ac peritiae laude dignissimus, tradit in expositione sua anatomica, in explicatione hujus tabulae. Potuerunt eo nomine appellari, eo quod per illum locum calvariae ducuntur, qui ex parte illa, quae tempus vocatur, nominari consuevit. Nequeunt autem esse (ne quis fortasse putet esse) quas vulgo venam & arteriam temporalem appellant, ut quae ante aurem super zygoma sub tegumentis corporis communibus, ut tabula xxii. exhibitum, ducuntur; non post zygoma, sicuti haec.
- x: x Radices venarum jugularium externarum.

y: y Radices venarum primarum, quas jugulares externae h & h i tabulae xxvii. figurae v. emittunt.

z Vena, quae continuatur tabula xxiv. n°. ii. k.

a Vena, quae continuatur tabula xxiv. n°. ii. h.

β Vena, quae, ut videtur, pertinet ad scapulae lunulam, quae est ad radicem processus coracoidei.

γ: γ Venae, quae inter serratos anticos & magnos demittuntur.

ι: ι Venae, quae inter latissimos dorsi & serratos magnos demittuntur, ramorumque altero ad latissimorum internam partem pertinent, altero ad serratorum externam.

δ: δ Trunci humerariarum & axillarium. Explicatione tabulae viii. figurae i. D, & ii. d.

ε: ε Venae humerariae, aliis cephalicae. Explicatione tabulae viii. figurae i. E, & figurae ii. e.

ζ Venae communis superficialiarum radix, facta ex conjunctione rami humerariae ε, & axillaris externae. Explicatione tabulae viii. figurae i. H, & figurae ii. h.

η Ramus humerariae, qui in flexu cubiti jungitur cum profunda axillari. Confer explicationem tabulae viii. figurae i. G.

Humerariae venae ramum, qui cum penitiori axillari coit, inter eum musculum, qui ab interno humeri tuberculo enatus radium in pronum circumvertit, & inter alium, qui cubitum sustentium secundus ab eo numeratur, accuratius, quam hactenus fecerit, inquirat; in hac enim cubiti sede, illum humerariae venae ramum sine dubio inveniet, siquidem nunquam deest, etiamsi admodum varia sit superficialiarum venarum circa cubiti articulum distributio. De vena communi profunda brachii, antigrammate iii.

θ: θ Venae axillares, basilicas vocant. Explicatione tabulae viii. figurae i. I, & figurae ii. i.

θ: θ Venarum axillarium externarum, (de vena communi profunda brachii, antigrammate iv.) hoc est, venarum axillarium (explicatione tabulae viii. figurae i. K, & figurae ii. k.) rami superficialiarii. Intermediis ramis conjuncti cum κ: κ axillaribus profundis: idque non eodem modo.

ι Vena axillaris externa ad postremum uno ramo conjuncta cum altero ramorum, in quos axillaris profunda divisa est: altero cum ramo humerariae; ex quo fit vena communis superficialia ζ.

κ: κ Venae axillares profundae, quae plerumque oriuntur supra medium longitudinis humeri, & interdum altius, vel humilins. Explicatione tabulae viii. figurae i. L, & figurae ii. l.

Axillaris profunda gemina esse solet, & arteriam hinc inde completi. Interdum utraque ejus pars, in medio fere ductu in unam coit; deinceps illico bipartitur; & circa cubiti flexum iterum unitur: quod Vesalius ignorat. Explicatione tabulae viii. figurae i. M.

Axillaris profunda supra humeri medium, in duas partes arteriam utrinque completentes, dividitur; ex quibus circa cubiti flexum una efficitur; non solum ut in secunda figura (tabulae viii.) cernitur; sed variis etiam modis, quorum nullus à Vesalio describitur, aut pingitur. Explicatione tabulae viii. figurae ii. m.

Nimis sane oscitanter profundum axillaris venae ramum κ descripsit, qui circa medium humeri, atque etiam interdum parum infra, vel supra medium ejusdem, fere semper in duas propaggines scinditur, quae arteriam hinc

M m 2

inde

inde complexae sub cubiti articulum, non longe tamen ab eo invicem semel; & interdum etiam iterum, & cum tertio quodam humerariae ramo, ab eo, qui sub cute communem venam constituit, enato, uniuntur, paululumque progressae rursus in tres propagines dirimuntur, quarum una o Vesalio incognita bifariam scissa, altera parte (σ tabulae xxvi. n^o 11.) amplum ligamentum radio ulnaeque commune perreptat; altera (τ tabulae xxvi. n^o 11.) eodem ligamento perforato, in exteriorem ulnae sedem distribuitur (μ tabulae xxiv. n^o 11.): aliae vero duae, non secus quam arteria diremptae, ad extremam usque manum una cum ea progrediuntur, δ , τ : δ , v. De vena communi profunda brachii, antigrammate 1.

λ , λ Rami ad bicipitem brachii.

μ Venae axillaris profundae ramus, qui ultra cubiti articulum cum vena communi profunda conjungitur. Ab hoc ramo surculi principii musculorum, qui oriuntur ab interno humeri tuberculo, pronatoris teretis, radialis interni, sublimis, tribuit. Explicatione tabulae viii. figurae 1. N, & figurae 11. n. Confer: tabulae xxvi. n^o 11.

In sinistro brachio, ubi nullus ramus μ , atque axillaris profunda diutius divisa manet, rami illi ad interiorem partem pronatoris teretis, radialis interni, sublimis, separatim oriuntur ab eodem ramo axillaris profundae, & quo in dextro brachio vena μ .

Axillaris profunda in flexu cubiti, aliquos surculos principii musculorum, qui oriuntur ab interno humeri tuberculo, tribuit. Explicatione tabulae viii. figurae 1. N, & figurae 11. n.

ξ Vena communis profunda, quae videtur dividi in tres ramos, contra Vesalii opinionem. Explicatione tabulae viii. figurae 1. P, & figurae 11. p. Facta ex congressu axillaris profundae & rami ab humeraria communem venam constituyente orto.

o: o Venae σ : ς tabulae xxvi. n^o 11. Medius ramus venae communis profundae, qui à Vesalio nec describitur, nec pingitur; inter musculos secundum, & tertium digitorum internodium stectentes, totam membranei ligamenti ulnae, & radii longitudinem perreptans, musculis ei incumbenibus surculos tribuit; & interdum geminus existens arteriam hinc inde comprehendit. Explicatione tabulae viii. figurae 1. S, & figurae 11. s.

δ : δ Elatiores venarum communium profundarum rami, Explicatione tabulae viii. figurae 1. R, & figurae 11. r; quas venas radiales appellamus. Dextra vena simplex, in vola continuatur ulnari, arcus Θ forma. Emittit ramos π , π ad supinatore longum, & sublimem, pertinentes. Posteaque ramum ϱ , qui sub abductore longo pollicis & extensore minore ducitur ad dorsum manus, ubi inter principia abductoris indicis & interossei ejusdem prioris penetrat ad volam: per cujus deinde profunda ramos spargit. Postquam autem inter principia abductoris indicis & interossei ejusdem prioris penetravit, emittit ramum ς , qui uno ramo pertinet ad indicis latus illud, quo pollicem spectat: altero ad pollicem, eoque conjungitur cum vena ex arcu Θ emissa.

In sinistro autem brachio exhibuit venam radialem mox divisam in duas, unius arteriae comites, quam mediam continent. Earumque altera σ ad dorsum manus pertinet, respondens venae ϱ . Illiusque venae σ ramus est vena ς , eadem, quae ς manus dextrae, sed ad indicem solum pertinens.

Elatior venae communis profundae ramus, juxta radium incedens, non raro, sicut humilior, geminus est, & sub musculo brachiale ad magnum digi-

gitum fleſtente deorſum procedens, vicinisque muſculis propagines offerens, in internam ſedem pollicis, vel indicis diſtribuitur. Explicatione tabulae VIII. figurae 1. R, & figurae 11. r.

τ *Humilior venae communis profundae ramus*, Explicatione tabulae VIII. figurae 1. Q, & figurae 11. q; quam venam ulnarem appellamus. In vola continatur radiali 8, arcus forma: ex quo & arcu rami ad digitos pollicemque; quod ex icone ſatis apparet.

v In ſiniſtro brachio venae ulnaris unius loco, duae ſunt, mediam arteriam continentes. Apparet origo earum, & quomodo mox ab ea conjungantur ramo intermedio. Apparet quomodo ad volam ducantur, perque eam ramis ſuis ad digitos, pollicemque: & aliter quidem, atque in manu dextra; quo varietas indicata.

Humilior venae communis profundae ramus, juxta ulnam incedens, non ſemper unus eſt; ſed interdum geminus exiſtens (quod Veſalius non animadvertit) comprehendit in medio arteriam, & ſub muſculo in octavum brachialis os inſerto procedens, vicinisque ſoboles offerens, in internam manus ſedem diſpensatur; & omnibus digitis, vel quatuor, vel etiam paucioribus, ſurculos offert. Explicatione tabulae VIII. figurae 1. Q, & figurae 11. q.

φ Vena cava inferior.

χ:χ Venae diaphragmaticae.

ψ ψ ψ Radices venarum hepaticarum. Vide b, b, c, c, c, c figurae 1. tabulae XXVII.

ω *Venula orta à dextra parte cavae venae ſupra emulgentem, & in pinguem dextri renis membranam diſtributa.* E figurae 1. tabulae 1.

Vena cava, ubi primum adhuc ex hepate emergens ſublimis ad ſpinam fleſtitur, ramum quendam ex dextro quidem latere producit, non veluti alii ſcribunt, ex ſiniſtro; qui numerofa ſerie in pinguem dextri renis tunicam, non autem ſiniſtri digeritur. De renibus capite xv.

Γ *Venula, vel à cava, vel à ſuprema parte emulgentis dextrae ortum ducens; quae partim in ſeptum tranſverſum, partim in glandulam reni dextro incumbentem; partim in ſuperiorem regionem ſubſtantiae renis diſtribuitur.* F figurae 1. tabulae 1.

Cava vena, juxta eminentiorem ſedem ſubjectae venae dextrum renem adeuntis, non raro propaginem emittit, quae in proximam ſepti tranſverſi regionem, nec non & in ſuperiorem partem ſubſtantiae renis ejusdem lateris, ac denique in glandulam ſibi incumbentem ſurculos ſpargit: quam quidem propaginem, quod ſciam, nemo anatomicus deſcripſit. De renibus capite xv.

Δ:Δ Venae emulgentes.

Solet in hominibus & in ſimiis una vena unaque tantum arteria utrique reni magna ex parte contingere. De renibus capite xv.

Conſueverunt venae & arteriae renum magna ex parte non prius in ramos diſcindi, quam eorundem cavum ingreſſae ſunt. De renibus capite XVII.

Θ *Venula à ſuperiori latere ſiniſtrae emulgentis venae in medio duſtu nata; quae diſtribuitur partim in ſeptum tranſverſum; partim in glandulam reni ſiniſtro incumbentem, partim in ſuperiorem regionem pinguis tunicae renis.* P figurae 1. tabulae 1.

Λ *Venula originem ducens à ſuperiori latere emulgentis ſiniſtrae juxta renem; diſſeminata in inferiorem partem pinguis tunicae ejusdem.* T figurae 1. tabulae 1.

Vena, quae ſiniſtrum renem adit, ex ſuperiore & inferiore ſede ramos emittit.

Nn

emittit; ex superiore ut plurimum consuevit, alterum quidem Θ in medio suae longitudinis ductu, alterum vero Λ juxta ipsius infertionem producere; ex quibus prior Θ in superiorem partem membranae pinguis, usque ad renis longitudinis medium, Θ in ipsam glandulam reni incumbentem, (R figurae 1. tabulae 1.) ac denique in ipsum septum transversum furculis spargit, qui interdum insignes occurrunt, Θ cum ejusdem septi venis, mira naturae solertia, coeunt atque uniuntur; posterior vero idemque superior ramus Λ , in humiliorum pinguis tunicae regionem digeritur; inferiore vero loco emulgens vena ex media sede vas seminarium (Ξ sinistrum) producit; quod etiam dextra, raro tamen, imitatur: multo vero rarius in utraque simul emulgente hoc fieri conspicimus: Θ haec quidem ea vasorum distributio est, quae frequentius occurrit. De renibus capite xvi.

Ξ : Ξ Venae spermaticae. Quarum sinistra ab emulgentis venae sinistrae inferiore parte oritur: dextra à dextra parte venae cavae, aliquantum infra emulgentem dextram. Apparent rami, quos emittunt, ad partes, juxta quas ducuntur, pertinentes. Apparent quoque rami, quibus cum arteriis spermaticis conjunguntur: aliaeque sinistrae cum comite arteria conjunctio: de quibus vide W, X figurae 1, & R, S figurae 111. tabulae xii.

Π , Π , Π : Π , Π , Π Rami venarum lumbalium; tertiarum; quartarum, quintarum.

Σ : Σ Venae iliacae.

Φ Venula, quae ab iliaca sinistra oriens, per posteriorem partem pelvis ducitur. Cujusmodi saepe duae, vel tres.

Ψ Vena similis, quae hic conjuncta cum hypogastricarum ramis.

Ω : Ω Venae hypogastricae.

A:A Venarum hypogastricarum rami per posteriorem partem pelvis ducti, conjunctique inter se, & cum vena Ψ .

B:B Rami venarum hypogastricarum, qui per intervalla, quae sunt inter os sacrum & ossa coxarum, penetrant ad nates.

C:C Venarum hypogastricarum rami per priora vesicae ducti: ubi diversimode divisi, rursusque conjuncti. Circa penis radicem conflunt in venam unam D. Vide g g k figurae 1. tabulae xii.

E Vena, quae ab iliaca aliquantum infra hypogastricam orta, ducitur in priorem partem vesicae, conjungiturque cum vena C. Vide i figurae 1. tabulae xii.

F:F Venarum hypogastricarum rami l:m figurae 1. tabulae xii. Qui circa radicem penis conflunt cum vena D: ex quo fit

G Vena per dorsum penis ducta. Vide n figurae 1. tabulae xii.

H:H Venarum iliacarum rami, qui per priora psoarum & iliacorum inter-norum ducuntur.

I:I Radices venarum epigastricarum, z:z figurae xii. tabulae xxvii.

K:K Radices venarum saphaenarum.

L:L Venae cruales, quae ramos per femora spargunt: quorum varietas in duobus femoribus indicata.

M:M Rami ad iliacos internos.

N:N Ad tensores vaginarum femorum.

O:O, O, O Ad cruales.

P, P, P, P: P, P Ad vastos externos.

Q, Q Ad vastum internum.

R:R Ad adductores breves femorum.

S, S, S: S, S

S, S, S: S, S Ad adductores magnos femorum.

T, T: T, T Hi rami dividuntur in duos, unius arteriae comites, quam mediam continent.

V Venae popliteae ramus N tabulae xxiv. n^o. 11. Qui in superiore parte cruris inter tibiam & fibulam in priora penetrans, ducitur deinde secundum membranam cruris ossibus interjectam, posteaque secundum tibiam, utraque eam per dorsum pedis extremi profunda. W Ramus ejus in plantam penetrans.

X Venae mododictae V varietas. Haec mox dividitur in duas, unius arteriae comites, quam mediam continent. Deinde quoque ramis suis discrepat à vena V, in crure, pedeque extremo.

3 Arteria pulmonaris.

4 Arteria aorta.

5 Cordis arteria coronaria dextra. Vide R figurae 1. tabulae xvi. Ramos comites adjungit ramis venae a coronariae minoris.

Venarum b, b comites sunt rami arteriae coronariae sinistrae.

6 Radix communis, quae dein dividitur in duas: quarum altera radix communis arteriae subclaviae dextrae & carotidis dextrae; altera carotis sinistra.

7 Arteria subclavia sinistra.

8 Radix communis arteriae subclaviae dextrae & carotidis dextrae.

9: 9 Arteriae carotides. Comites venarum k: k jugularium internarum.

10 10 Arteriae carotidis externae ramus, qui comes primum venae m, cum ea pone biventrem maxillae & stylohyoideum, perque malam ducitur: ac deinde comes venae q, cum ea dividitur in duas, ad labia, perque ea, ductas.

11 Ramus arteriae carotidis externae. A quo 12 ramus ad loca sub maxilla: cujus ramus venae r comes. Alius 13 13, qui pone biventrem & stylohyoideum, comes deinde venae v, cum ea ante auriculam sursum ducitur, utraque eam sub cute. Alius 14, qui est b tabulae xxiv. n^o. 11. Alius 15, qui retrorsum sub trachelomastoideo, splenio capitis, cucullari ducitur, ac deinde per cucullarem, ubi is à cranio oritur, penetrat, perque occiput sursum ducitur, c tabulae xxiv. n^o. 11.

Ab arteria 13 emittitur ramus, qui una cum illo ramo venae r, à quo venae w, w emittuntur, sursum ducitur pone maxillam, porroque sub temporali in periosteo per latus calvariae, ramis suis comes venarum w: w.

16 Est arteria 12 tabulae xxvi. n^o. 11. Ramis suis comes venae f ramorum.

17: 17 Radices arteriarum mammariarum, m: m figurae xii. tabulae xxvii. Comites radicum i: i venarum mammariarum.

Venae z comes arteria, quae continuatur tabula xxiv. n^o. 11. k. An ejusdem arteriae rami in sinistro latere comites ramorum venae jugularis internae retrorsum per humerum ductorum?

Venae β comes arteriae subclaviae ramus, qui, ut videtur, pertinet ad scapulae lunulam, quae est ad radicem processus coracoidei.

18 Arteria ad pectoralem & deltoïdem pertinens. Ramum comitem adjungit venae γ ramo.

Venae γ sinistra comes arteria, quae cum ea inter serratum anticum & magnum demittitur.

Venarum f: f comites arteriarum axillarum rami, qui cum iis inter latissimos dorsum & serratos magnos demittuntur, alteroque ramo ad latissimi internam partem, altero ad serrati externam pertinent.

N^o 2

19: 19

- 19: 19 Arteriae axillares, quae deinde brachiales vocantur. Comites venarum $\theta\kappa: \theta\kappa$.
 Venarum λ, λ comites arteriae ad bicipitem brachii.
 Venarum $\mu: \nu$ arteriae comites, ramorumque earum.
 20: 20 Arteriae 19: 19 tabulae xxvi. n^o. 11. Comites venarum $\sigma: \sigma$.
 21: 21 Arteriae radiales. Comites venarum radialium $\varsigma: \varsigma$.
 Venarum π, π comites arteriae radialis rami ad sublimem, & supinatorum longum.
 Venarum $\varrho: \sigma$ comites arteriarum radialium rami. Qui sub abductoribus longis pollicum manuum & extensoribus minoribus ducuntur ad dorsum manuum: ubi inter principia abductorum indicum & eorundem interosseorum priorum penetrant ad volas; per quarum deinde profunda ramos spargunt.
 22: 22 Rami arteriarum illarum, quae comites sunt venarum $\varrho: \sigma$: quos ramos arteriae illae emittunt, postquam inter principia abductorum indicum & eorundem interosseorum priorum penetraverunt. Comites venarum ς, ς . Sed in manu dextra etiam ramum pollicis dat, ut comes vena ς .
 23: 23 Arteriae ulnares, comites venarum ulnarium $\tau: \nu$. In dextro brachio exhibita arteria ulnaris radialis in manu continuata arcus specie, ut venae, Θ : ex quo arcu rami quoque cum venis ad digitos pollicemque pertinent.
 24 24 25 Arteria aorta. 25 Hic per diaphragma penetrat.
 26 26: 26 Arteriae diaphragmaticae, quae ramos ramis venarum diaphragmaticarum $\chi: \chi$ comites adiungunt.
 27 Radix arteriae coeliacae.
 28 Radix arteriae mesentericae superioris.
 29: 29 Arteriae emulgentes. Comites venarum emulgentium $\Delta: \Delta$.
 30: 30 Arteriae spermaticae. Apparent rami, per quos conjunctae cum venis $\Xi: \Xi$ spermaticis, quibus comites adiunguntur. Exhibita quoque alia in sinistro latere arteriae cum vena comite conjunctio. Vide W, X figurae 1, & R, S figurae 111. tabulae xii.
 31 Radix arteriae mesentericae inferioris.
 32: 32 Arteriae iliacae, comites venarum iliacarum $\Sigma: \Sigma$.
 33: 33 Arteriae hypogastricae, quae venarum hypogastricarum $\Omega: \Omega$ comites.
 34 Radix arteriae umbilici sinistrae. Eadem in dextro latere. Dein arteriae hypogastricae emittunt ramos, qui comites venarum B: B, cum iis per intervalla, quae sunt inter os sacrum & ossa coxarum, penetrant ad nates.
 35: 35 Arteriarum hypogastricarum rami, qui per priorem partem vesicae cum venis C: C ducuntur.
 36: 36 Arteriarum hypogastricarum rami, qui per penis dorsum ducuntur. Vide u: u figurae 1. tabulae xii. Comites venae G.
 Venarum H: H comites arteriarum iliacarum rami, qui per priora psoarum & iliacorum internorum ducuntur.
 37: 37 Radices arteriarum epigastricarum. Vide a: a figurae xii. tabulae xxvii. Comites radicum venarum epigastricarum I: I.
 38: 38 Arteriae cruales, quae cum venis cruralibus L: L, quas comitantur, ramos per femora spargunt, ramorum earum M, N: M, N, caeterorumque, comites.
 39 Arteriae popliteae ramus N tabulae xxiv. n^o. 11. Qui in superiore parte cruris inter tibiā & fibulam in priora penetrans, ducitur deinde secundum

dum membranam cruris ossibus interjectam , posteaque secundum tibiam ,
ultraque eam per dorsum pedis extremi profunda. Comes venae V. Emittere
ramum, qui venae W comes, ad plantam penetrat.

- 40 Arteriae popliteae ramus idem mododictus 39. Cujus varietas hic indi-
cata: ab illo enim, qui in dextro crure exhibitus, discrepat ramis suis in
crure, pedeque extremo. Comes venae X.




TAB.

XXVI. N^o 1.



T A B .

XXVI . N^o II.



T A B U L A XXVI.

Nº. I. M U S C U L I , &c.

- a** **Z**ygoma.
b Masseter.
c Maxilla inferior.
d Osseus auris introitus.
e Splenius capitis.
f Videri possit aut splenii pars interior, aut trachelomastoideus esse.
g:g Videntur esse levatores scapularum. **h:h** An eorundem partes interiores?
i Rudis adeo haec figura, ut, an quidem aliquid significet, non facile videatur suspicari.
k:k Processus transversus vertebrae colli septimae à capite.
l:l Processus transversus vertebrae sextae à capite.
m,m,m Processus transversus vertebrae colli à capite quintae, quartae, tertiae.
n Videtur esse rudis indicatio recti interni majoris capitis.
o Pharyngis rudis videtur indicatio esse.
p Cartilaginis thyreoideae rudis indicatio.
q:q Cricothyreoidei.
r Glandula thyreoidea.
s Aspera arteria.
t:t Claviculae, truncatae.
u Subscapularis.
v:v Teretes majores.
w:w Deltoides.
x:x Coracobrachiales.
y Tricipitis brachii pars, quae longus appellatur.
z Tricipitis brachii pars, quae brachialis externus appellatur.
A Tricipitis brachii partes, quarum alteri longi, alteri brachialis externi nomen est, non distincta altera ab altera.
B:B Bicipites brachiorum, truncati & modice reflexi.
C:C Brachiales interni.
D:D Pronatorum teretum capita, truncata & reflexa.
E:E Radialium internorum capita, truncata & reflexa.
F:F Sublimium capita, truncata & reflexa.
G:G Videntur partes esse profundorum.
H:H Supinatores longi, truncati.
I:I Radiales externi.
K:K Radii.
L:L Ulnae.
M:M Profundi, truncati & inversi.
NO:NO Pronatores quadrati. **N** Principium truncatum. **O** Extremum truncatum.
P:P Supinatorum longorum extrema, truncata.
Q:Q Nisi pollicum manuum abductores longi ipsi sunt, loci sunt eorum.
R:R Truncati tendines flexorum longorum pollicum manuum.

- S: S Truncati tendines profundorum.
 T: T Truncati tendines sublimium.
 V: V Ligamenta interiora, armillas referentia.
 W: W Flexores breves pollicum manuum.
 X: X Tendines flexorum longorum pollicum manuum.
 Y, Y, Y, Y: Y, Y, Y, Y Tendines sublimium.
 Z: Z Adductores ossium metacarpi digitorum auricularium.
 α: α Abductores digitorum auricularium. Est certe locus eorum.
 β: β Latissimi dorsi.
 γ: γ Thoracis exterioris partis rudis indicatio.
 δ ε ζ &c. Thoracis interiora.
 δ, δ, &c. Intercostales interiores.
 ε, ε, &c. Costae.
 ζ, ζ, &c. Intercostales exteriores. Qui etiam in dextro latere inter oras positicas intercostalium interiorum & spinam. Vide tabulam XXXVIII.
 η Ligamentum intercedens inter corpora vertebrarum dorsi duodecimae & undecimae.
 θ Corpus vertebrae dorsi duodecimae. Aliquot praeterea vertebrae dorsi cum ligamentis imperfecte indicatae.
 ι, ι, &c. Vertebrae lumborum quinque.
 κ Ligamentum intercedens inter corpora lumborum vertebrarum inferiorum duarum.
 λ Ligamentum intercedens inter corpus vertebrae imae lumborum & summae ossis sacri.
 μ: μ Transversi abdominis.
 ν: ν Cristae ilium.
 ξ: ξ Glutei minores.
 ο: ο Iliaci interni.
 π: π Psoae magni. Dexter truncatus.
 ρ: ρ Ossa pubis.
 σ Synchrondrosis ossium pubis.
 ς: ς Videntur esse truncata capita gracilium simul & eorum, quos adductores femorum longos & breves appellamus.
 ς: ς ς Obturatores externi.
 τ τ: τ τ Pectinei, truncati.
 υ: υ Adductores femorum breves, truncati.
 φ: φ Adductores femorum longi, truncati.
 χ: χ Adductores magni femorum.
 ψ: ψ Vasti interni.
 ω: ω Crurales.
 Γ: Γ Vasti externi.
 Δ: Δ Rectorum crurum tendines extremi, truncati & deorsum flexi.
 Θ: Θ Peronei longi.
 Λ: Λ Peronei breves.
 Ξ Fibula.
 Π: Π Tibiae.
 Σ: Σ Gemelli.
 Φ Plantaris.
 Ψ: Ψ Solei.
 Ω Tendo achillis.

- 1 Flexor longus digitorum pedis.
- 2 Flexor longus pollicis pedis.
- 3 Tibialis posticus.
- 4 Abductor pollicis pedis.

Nº. II. VENAE ET ARTERIAE.

Haec quoque tabula venas & arterias interiores, paucasque exteriorum exhibet, ut per thoracem & abdomen, ac secundum musculos, ossa, partesque alias ductae sunt. Praecipue autem profundiores exhibet, quam proximae superioris tabulae. Varietates quoque quarundam tabulae illius.

Ex ipsa quoque iconē, quibus venis comites adjunctae arteriae sint, apparet. Idemque peti ex arteriarum indice poterit, quem venarum indici subijciam.

a Vena cava superior, statim infra originem azygae recisa.

b Radix venae r figurae III. tabulae XXVII. Comparatio docere videtur.

c:c Venae subclaviae.

d Radix venae f tabulae XXV. nº. II.

e Radix venae l figurae III. tabulae XXVII. Comparatio docere videtur.

f Radix venae n figurae III. tabulae XXVII: vel p figurae v. ibidem. Comparatio docere videtur.

g Radix venae mammariae dextrae, l figurae XII. tabulae XXVII. Similis in latere sinistro.

h:h Radices venarum jugularium internarum, k:k tabulae XXV. nº. II.

i Radix venae jugularis externae dextrae.

k,l Gemina radix venae vertebralis dextrae. Vide l, k figurae VII. tabulae XXVII.

Arteriae & venae vertebralis *dispensatio in origine ut plurimum varia occurrat*. Ossium examine.

m Truncus venae vertebralis dextrae, ortus ex conjunctione radicum k & l: quas praeterea, priusquam conjungantur, ramo intermedio conjunctas exhibet. Haec una cum comite arteria II penetrat in foramen processus transversus vertebrae sextae à capite.

Quamvis (arteriae & venae vertebralis dispensatio) in origine ut plurimum varia occurrat, nihilominus fere semper a sexta vertebra incipere solet, nullo vase per foramen septimae trajecto. Ossium examine.

n Venae vertebralis dextrae ramus, extra canalem processuum transversorum vertebrarum colli sursum ductus.

o Vena vertebralis sinistra, quae, nulla comitante arteria, penetrat in foramen, quod est in processu transverso vertebrae colli septimae à capite.

pp Vena vertebralis alia, quae una cum arteria comite penetrat in foramen, quod est in processu transverso vertebrae sextae à capite.

Nisi fortasse (quod interdum evenit) vena, antequam ejusmodi foramina ingrederetur, in duos scindatur ramos, tunc enim ipsorum major sextae vertebrae foramen penetrat, minor vero septimae, quam tamen aut nulla arteria comitatur, aut adeo obscura, ut ipsius nulla prorsus ratio sit habenda: hinc evenire reor, saepe foramina septimae vertebrae esse minora iis, quae in sexta cernuntur: fit etiam aliis modis ejusmodi vasorum dispensatio. Ossium examine.

q:q Trunci humerariarum, & axillarium. Explicatione tabulae VIII. figurae I. D, & figurae II. d.

Pp

rrrs

rrrs An huc pertinent Eustachii haec? *A magna venae cavae, quae in jugulo fit, divisione primum jugularis interna, (in simia) contra quam in homine, externa longe minor producitur; deinde insignis hujus divisionis ramus bisariam, nimirum infra in axillarem w; supra in humerariam rrr scinditur; ab humeraria illico jugularis externa f, plerumque initio bifida s, simulque claviculae, foraminis instar, viam praebens, oritur, quod admodum libuit, non modo ut anatomiae sectatores intelligerent, externam hanc jugularem nullum in homine cum humeraria, quae post illam propagatur, nisi ad naturae minime consueta quis confugiat, commercium habere; verum etiam &c. De vena communi profunda brachii, antigrammate r. Vide etiam ikl figurae v. tabulae xxvii.*

Quamquam hoc in loco aperte de simiis agitur, tamen non potui quin monerem, quomodo cum his venis conveniat, ut expendere earum rerum studiosi, quid causae esse potuerit, cur illud hic in figura hominis exhibuerit.

t t Vena humeraria, cephalica vulgo.

u u Humerariam, parum supra cubitorum flexum in duos ramos divisam, rami interiores, qui cum axillarium ramis conjuncti, communes venas efformant. Explicatione tabulae viii. figurae r. F, & figurae ii. f.

v Venae communis superficiariae radix. Ibidem H. li.

w w Venae axillares, quas basilicas appellant.

x x Radices venarum f: f tabulae xxv. n°. ii.

y Venae x ramus superficiarius, qui conjungitur cum axillaris externae principio.

z, a Venae axillaris rami, z ad coracobrachialem, a ad bicipitem brachii.

β β Venae axillares externae, de vena communi profunda brachii, antigrammate iv. Quae sunt venarum axillarium rami superficiarii.

γ Ramulus, quo vena axillaris externa conjuncta cum axillari profunda.

δ δ Alius ramus, quo vena axillaris externa conjuncta cum axillaris profundae ramo i.

ε Venae axillaris externae parum supra internum humeri tuberculum in duos ramos divisae, ramus exterior, qui cum altero humerariae ramo u conjunctus communem superficiariam v constituit. Explicatione tabulae viii. figurae r. K, & figurae ii. k.

ζ Duae venae, quae sunt loco axillaris profundae. Fere in medio humero conjunguntur inter se, post rursus divisae, in cubiti demum principio conjunctae in unam.

η Vena axillaris profunda. Explicatione tabulae viii. figurae r. L, & figurae ii. l. Circa mediam hic humeri longitudinem oritur: post, supra cubitum, dividitur in ramos duos, rursus deinde in cubiti principio conjunctos in unum. Confer explicationem tabulae viii. figurae ii. m.

Nimis sane oscitanter profundum axillaris venae ramum descripsit, qui circa medium humeri, atque etiam interdum parum infra, vel supra medium ejusdem, fere semper in duas propagines scinditur; quae arteriam hinc inde complexae sub cubiti articulum, non longe tamen ab eo invicem semel, & interdum etiam iterum, & cum tertio quodam humerariae ramo v, ab eo u, qui sub cute communem venam constituit, enato, ununtur, paululumque progressae rursus in tres propagines dirimuntur, quarum una σ Vesalio incognita bisariam scissa, altera parve σ amplum ligamentum radio ulnaeque commune perreptat; altera τ eodem ligamento perforato, in exteriorem ulnae sedem

sedem distribuitur (μ tabulae xxiv. n^o. ii.): aliae vero duae π , ξ , non secus quam arteria diremptae, ad extremam usque manum una cum ea progrediuntur (ς : τ tabulae xxv. n^o. ii.). De vena communi profunda brachii, antigrammate i.

0, 0:6 Rami ad bicipites brachiorum.

Venae axillaris profundae ramus, qui circa condylum posteriorem humeri ab altera venarum, in quas vena illa profunda dividitur, ortus, acceptaque vena δ à vena axillari externa, ad cubitum ducitur, ubi cum vena profunda communi conjungitur. Ab hoc ramo furculi principiis musculorum, qui oriuntur ab interno humeri tuberculo, tributi: explicatione tabulae viii. figurae i. N, & figurae ii. n. Nempe χ ramus ad pronatorem teretem, λ ad radialem internum & sublimem, μ ad profundum, qui esse videtur. Confer μ tabulae xxv. n^o. ii.

Interioris rami humerariae, parum supra cubiti flexum in duos ramos divisa, propago, quae in flexu cubiti jungitur cum profunda axillari. Explicatione tabulae viii. figurae i. G.

ξ Ramus vel ab humeraria communem venam constituyente, vel ξ ab ipsa communi (nisi modo à ramo ϵ axillaris externae) ortus, qui cum axillari profunda conjungitur. Vide O figurae i. & o figurae ii. tabulae viii.

Humerariae venae ramum, qui cum penitiori axillari coit, inter eum musculum, qui ab interno humeri tuberculo enatus radius in pronum circumvertit, & inter alium, qui cubitum flectentium secundum ab eo numeratur, accuratius, quam haftenus fecerit, inquirat; in hac enim cubiti sede, illum humerariae venae ramum sine dubio inveniet; siquidem nunquam deest, etiamsi admodum varia sit superficiaria venarum circa cubiti articulum distributio. De vena communi profunda brachii, antigrammate iii.

o Venae communes profundae, quae videntur dividi in tres ramos, contra Vesalii opinionem. Explicatione tabulae viii. figurae i. P. & figurae ii. p. Factae ex congressu axillarium profundarum & ramorum, v vel ab humeraria communem venam constituyente, ξ vel ab ipsa communi (nisi modo à ramo ϵ axillaris externae) ortorum.

π : π Radices venarum radialium, ς : ς tabulae xxv. n^o. ii.

g : g Radices venarum ulnarium, τ : v tabulae xxv. n^o. ii.

σ : ς Medius ramus venae communis profundae, qui à Vesalio nec describitur, nec pingitur; inter musculos secundum, & tertium digitorum internodium flectentes, totam membranei ligamenti ulnae, & radii longitudinem perperans, musculis ei incumbenibus furculos tribuit; & interdum ϵ geminus existens arteriam hinc inde comprehendit. Explicatione tabulae viii. figurae i. S, & figurae ii. s.

τ : τ Propago à praedicto medio ramo venae communis profundae circa quartam ulnae partem orta; quae ligamentum membraneum ulnae, & radii perforans, ad posteriora transit, & in musculos ab ulna procedentes, aliosque eidem incumbentes distribuitur (μ : μ tabulae xxiv. n^o. ii.): haec propago, quae interdum gemina est, & arteriam mediam comprehendit, oscitanter à Vesalio praetermittitur. Explicatione tabulae viii. figurae i. T, & figurae ii. t.

v Venae ejusdem ϵ ramus ad dorsum cubiti penetrans; ubi continuatur tabula xxiv. n^o. ii. v.

$\phi\phi$ Vena azyga.

In homine haec vena recto tramite non incedit, sed super dextrum truncum arteriae asperae, dextrorsum quidem parum, retrorsum vero multum, ver-

sus spinam flectitur, & ubi vertebrarum radices attingit, incipit extolli, & ad medium earum progredi, quod pervenit circa octavam vel nonam thoracis vertebram, eoque loco est plane in medio, & sub arteria condita deorsum ad finem usque thoracis, prius tamen bifariam divisa, proficiscitur. De vena sine pari, antigrammate xxi.

Vena azygos, e regione octavae aut decimae thoracis vertebrae, in duos ramos, dextrum scilicet ac sinistrum, scinditur; hi deorsum repunt, & septum transversum praetereunt, suarumque uterque propaginum vel una tantum, vel pluribus vario modo inferitur, scilicet aut in posteriorem sedem cavae, juxta ortum emulgentis, aut in ipsam emulgentem, & praesertim in sinistram, (neque enim memini hoc idem me unquam in dextra observasse) retro, supra, infra; ea nimirum in parte, qua venam seminariam ipsa creat. De renibus capite xvi.

Χ Azygae ramus, qui mox dividitur in venas intercostales dextras duas, tertiam, & quartam.

Ψ, ω, Γ, Δ, Θ, Α, Ζ, Π Sequentes octo venae intercostales dextrae, quas azyga emittit: Ψ quinta, ω sexta, Γ septima, Δ octava, Θ nona, Α decima, Ζ undecima, Π duodecima.

Σ Azygae ramus, qui mox dividitur in venas intercostales sinistras duas, Φ tertiam, & Ψ quartam.

Ω Azygae ramus, qui mox dividitur in venas intercostales sinistras duas, Α quintam, & Β sextam.

CC Azygae ramus, qui est vena intercostalis sinistra septima.

DD Azygae ramus, qui vena intercostalis sinistra octava.

EE Azygae ramus, qui vena intercostalis sinistra nona.

F Azygae, e regione octavae thoracis vertebrae in duos ramos divisae, ramus sinister. Qui dividitur in venas intercostales sinistras, G decimam, H undecimam, &, ut videtur, I duodecimam.

Intercostales rami venae sine pari, quum primum ab hac originem traxerunt, una cum arteriis inter membranam succingentem, & musculos intercostales exteriores primo feruntur; quandoquidem interiores ad radices costarum non pertingunt; deinde paululum progressi ab utroque horum musculorum genere mediis comprehenduntur. De vena sine pari, antigrammate xviii. Quod in latere dextro exhibet: nam in sinistro detracti musculi intercostales interni.

K Vena, qua conjunctae intercostalium sinistrarum undecima & duodecima.

Venae intercostales in itinere multis in locis, praecipue autem circa posteriorem dorsii partem, simul commiscuntur. De vena sine pari, antigrammate xviii.

L, L, L Venae intercostales perforatis musculis, qui in ea parte sunt, inter eos digeruntur, atque etiam sub cute adipem perreptant, quod silentio praetereundum vel ob eam causam non erat, quia musculi posteriori dorsii sedi incumbentes, ab iis ramis extra erumpentibus alimentum plerumque sumunt. De vena sine pari, antigrammate xviii.

M: M Venae sine pari postremi rami plerumque cum primis lumborum venis, e regione secundae ipsorum vertebrae pullulantibus, commiscuntur, atque junguntur. De vena sine pari, antigrammate xvii.

N Vena cava inferior, mox supra originem emulgentium recisa.

O: O Radices venarum emulgentium.

P Radix venae spermaticae dextrae.

Q: Q

Q:Q Venae iliacae.

R,R,R,R,R,R,R,R,R Venae lumbales, ab utroque latere quinque. In sinistro latere tertia & quarta conjunctae inter se.

Primae lumborum venae, e regione secundae ipsorum vertebrae pullulant.

De vena sine pari, antigrammate XVII.

S:S,S Venarum lumbalium rami per transversos abdominis penetrantes.

T,T:T Venae, quibus venae lumbales conjunctae inter se: tertiae cum quartis, quatae cum quintis.

V,V,V,V:V,V,V,V Venarum lumbalium rami ad posteriora penetrantes.

W:W Venae hypogastricae, quarum satis apparent rami per pelvis posteriorem partem ducti, conjunctique inter se. Confer AA tabulae xxv. n°. 11.

X:X Rami venarum hypogastricarum, per intervalla, quae sunt inter os sacrum & ossa coxarum, penetrantes ad nates.

Y Y Venae hypogastricae sinistrae ramus, qui per magnum foramen ossis coxae, & per sinum quidem, qui in ejus ora superiore est, penetrat ad femoris interiora: ubi inprimis ramos spargit inter pectineum adductoremque femoris brevem ac longum gracilemque à parte priore, atque obturatorem externum adductoremque magnum à posteriore.

Z Z Vena eadem, quae Y Y in parte sinistra: hic autem non ab hypogastrica, sed ab iliaca oritur.

Æ:Æ Venarum cruralium rami, qui conjunguntur cum venis Y & Z.

ææ:ææ Venarum Y & Z rami, qui circum capita adductorum brevium femorum longorumque ac gracilium flectuntur, perque priora gracilium sursum ducuntur in pubem.

ε,ε:ε Hi rami simplices in dextro femore, in sinistro autem singuli divisi in duos, unius tamen arteriae comites, quam mediam continent. Ramos dant adductoribus magnis femorum.

f:f Radices venarum epigastricarum, z:z figurae XII. tabulae xxvii.

q:q Radices venarum saphenarum.

g:g Venae cruales.

Caeterum plerique rami, quos venae hypogastricae, iliacae, & cruales emittunt, hic truncati, tabula xxv. exhibiti sunt, ex eaque intelligentur.

⊙ Venae V tabulae xxv. n°. 11. varietas. Mox haec dividitur in ramos duos, unius comites arteriae, quam mediam continent.

8 Venae X tabulae xxv. n°. 11. varietas: non divisa in duas, arteriam mediam continentes. Ramorum, qui in superiore parte hujus sinistri cruris exhibiti, crassiores, rami sunt ejusdem hujus venae, quae hoc positu pedis conspici ibi nequit.

1 2 3 Aorta, statim supra cor recifa. 2 Angulus aortae.

4 Arteria, quae mox dividitur in intercostales dexteram duas, tertiam, & quartam, comites venarum χ.

5 Radix communis, quae dein dividitur in radicem communem arteriae subclaviae dextrae ac carotidis dextrae, carotidemque sinistram.

6 Radix arteriae subclaviae sinistrae.

7 Radix communis arteriae carotidis dextrae & subclaviae dextrae.

8:8 Radices arteriarum carotidum.

9:9 Arteriae subclaviae.

10:10 Arteriarum subclaviarum rami, qui emittunt ramos 11:11, & 12:12.

11:11 Vertebrales: qui comites venarum m & p, penetrant in foramina processuum transversorum vertebrae sextae à capite.

- 12:12 Qui respondent venae f tabulae xxv. n°. 11. Ramus 13 cum ramis venae f tabulae xxv. n°. 11. ducitur per priora glandulae thyreoideae. Emittunt quoque ramos, qui pone glandulam thyreoideam ducuntur.
- 14:14 Arteriarum mammariarum radices. Comites radicum venarum mammariarum g.
- 15:15 Rami qui β tabulae xxv. n°. 11. pertinent ad scapularum lunulas, quae sunt ad radices processuum coracoideorum.
- 16:16 Arteriae brachiales, comites venarum *axillarium*.
Venae z comes arteria ad coracobrachialem.
Venarum α, θ, θ : θ comites arteriae ad bicipites brachiorum.
Venae i comes ramus brachialis arteriae: & ejusdem quoque venae ramis ramos adjungit ad pronatorem teretem, radialem internum, sublimem, profundum, qui videtur.
- 17 Radix arteriae radialis. Comes venae π .
- 18:18 Radices arteriarum ulnarium. Comites venarum ξ : ξ .
- 19:19 Arteriae profundae cubitorum. Comites venarum σ : σ . Sinistra media inter duos ramos, in quos vena divisa.
Venarum τ : τ comites arteriarum profundarum cubitorum rami, qui cum iis per ligamenta, quae inter ulnas radiosque media, penetrant ad exteriorem partem cubitorum: ubi continuantur tabula xxiv. n°. 11. μ : μ .
Venae v comes arteriae profundae cubiti ramus ad dorsum cubiti penetrans: ubi continuatur tabula xxiv. n°. 11. ν .
- 20 Arteria intercostalis dextra quinta: quae deinde comes venae ψ . Sexta 21: quae deinde comes venae ω . Septima 22: quae deinde comes venae Γ . Octava 23: quae deinde comes venae Δ . Venae Θ comes nona. Venae Λ comes decima. Undecima 24: quae deinde comes venae Ξ . Venae Π duodecima comes.
Venarum intercostalium sinistrarum $\Phi, \Psi, A, B, C, D, E, G, H, I$ comites respondentes arteriae, tertia, quarta, quinta, sexta, septima, octava, nona, decima, undecima, duodecima.
- Venarum quoque L, L, L, &c. arteriarum intercostalium rami comites.
- 25 Radices arteriarum diaphragmaticarum. Vide 26:26 tabulae xxv. n°. 11.
- 26 Radix arteriae coeliacae. Vide t figurae 11. tabulae xxv11, & n figurae 1v. ibidem.
- 27 Radix arteriae mesentericae superioris. Vide A figurae 11. tabulae xxv11, & u figurae 1v. ibidem.
- 28 Radix arteriae emulgentis sinistrae.
- 29 Radices arteriarum spermaticarum. Vide 30:30 tabulae xxv. n°. 11.
- 30 Radix arteriae mesentericae inferioris. Vide B figurae 11. tabulae xxv11, & v figurae 1v. ibidem.
- Venarum lumbalium R, R, &c. comites arteriae lumbales.
- Venarum V, V, &c. comites arteriarum lumbalium rami ad posteriora penetrantes.
- Venarum S, S, &c. comites arteriarum lumbalium rami per transversos abdominis penetrantes.
- 31:31 Arteriae iliacae, comites venarum iliacarum Q: Q.
- 32 Arteria secundum priora vertebrarum lumborum & ossis sacri ducta: quam inveni orientem à posteriore parte aortae, mox supra divisionem ejus in iliacas.
- 33:33 Arteriae hypogastricae, comites venarum hypogastricarum W: W.

34:34 Radices arteriarum umbilici.

Indicatae radices arteriarum 35:35 tabulae xxv. n°. 11: quibus ob angustiam locorum notae non inscriptae. Cognoscuntur ex tabula xxv.

Venarum X:X comites rami arteriarum hypogastricarum, per intervalla, quae sunt inter os sacrum & ossa coxarum, penetrantes in nates.

Venae Y Y comes arteriae hypogastricae sinistrae ramus, qui cum ea per magnum foramen ossis coxae, & per sinum quidem, qui in ejus ora superiore est, penetrat ad femoris interiora: ubi inprimis ramos spargit inter pectineum adductoremque femoris brevem ac longum gracilemque à parte priore, atque obturatorem externum adductoremque magnum à posteriore.

Venae Z Z. comes arteria respondens illi, quae in parte sinistra comes venae Y Y. Hic autem non ab hypogastrica, sed ab epigastricae radice emittitur.

Venarum Æ: Æ comites arteriarum cruralium rami.

Venarum ææ. ææ comites arteriarum rami, qui cum iis circum capita adductorum brevium femorum longorumque ac gracilium flectuntur, perque priora gracilium sursum ducuntur in pubem.


Venarum êê: ê comites arteriae. Singulae eas venae comitantur in dextro femore: in sinistro autem geminae, medias continentes. Arteriarum quoque rami comitantur ramos venarum ad adductores magnos femorum.

35:35 Arteriae cruales, comites venarum cruralium 3:3.


36:36 Radices arteriarum epigastricarum.

37 Arteria, quae 39 tabulae xxv. n°. 11, hic venae © ramorum duorum comes, à quibus media continetur.

38 Arteria, quae 40 tabulae xxv. n°. 11, hic unius venae 8 comes. Hujus arteriae rami sunt rami illi exiliores, qui crassiorum comites in superiore parte hujus sinistri cruris exhibiti sunt.



TAB. XXVII.



T A B U L A XXVII.

FIGURA PRIMA.

Vasa jecoris, & cistae fellis.

Morgagnus de figura 1. 11. & 1v. solerter animadvertit hoc: cum Eustachius vellet universam venam portae sociis ubique stipatam arteriis sive coeliacis, sive mesentericis ab anteriore facie demonstrare; in 1. venae illius ramos, & radicum fines, in 11. & 1v. ramorum initium, & radices; in omnibus interjectum ramis, ac radicibus truncum proposuisse. Atque illud ex inspectione figurae illius 1. ac proximarum 11. & 1v. apertissime colligi. Epistola anatomica 1. §. LXVIII.

a a Vena cava inferior, tum supra, tum infra jecur truncata.

b, b, c, c, c, c Venae hepaticae: b, b majores, & c, c, c, c minores. Contrario modo in jecur perque illud ducuntur, ac vena portarum, hepaticaeque arteria, ac canalis.

d Radix venae lienalis.

Vide annotationem ad e.

e Radix venae mesentericae.

Amanuensium Lanvisi vulpu ingens error in figura 1. explicationem irrepsit, cum majores venae portae rami substantiam hepatis penetrantes ad 13. 12. indicati sunt. Atqui illos non esse ramos substantiam hepatis penetrantes, sed radices in truncum portae confluentes, si ex anatome non constaret, satis superque intelligi posset ex ambobus trunci illius extremis in triplici proposito iconismo (figura 1. 11. 1v.) inspectis, atque collatis. Morgagnus epistola anatomica 1. §. LXVIII.

f Vena portarum.

g, h, i Truncus venae portarum in sinu jecoris divisus in ramos tres. Sic quoque in figura 11. & 1v. a, a, a: quarum haec prima continuatio est.

Homini truncus venae portarum in sinu jecoris primum dilatatur aliquantum, haud secus, ac solent venae, ubi ramos majores emittunt; inprimisque ubi in eos totae dividuntur: ut videre est in cava inferiore, ubi in iliacas dividitur; & in superiore, ubi in subclavas. Inde mox truncus in ramos dividitur duos. Quorum alter, isque dexter, per sinum jecoris ducitur dextrorsum, nec longe ab ortu suo jecori immergitur. Alter, atque is sinister; multo longior, per eundem jecoris sinum primum ducitur in partem sinistram, continueque sub isthmo jecoris (T figurae 1v. tabulae xi.) arcus, infra patuli, forma; ab eoque continue mox ad ligamentum rotundum in adultiore, quod fuerat quam venam umbilici vulgo appellant, pertinet. Ac ramos illos duos unius sinus venae portarum nomine appellarunt anatomici posteriores, atque ita & descriperunt, & iconibus aliqui eorum expresserunt, tanquam si truncus venae in sinu jecoris in unum oblongum transversumque sinum migret, cumque & à dextra parte trunci dextrorsum, & à sinistra sinistrorsum, per sinum jecoris pertinentem. Cujus haec causa fuisse potuit, quod jecore exempto considerant. Etenim truncata vena portarum retrahitur jecur versus: ex quo talis, qualem tradiderunt, sinus species existit. At si eadem à jecore rursus ali-

R r

quan-

quantum retrahitur; maximeque si simul aut sanguine turget, aut flatu; in ramos duos dividi potius, quam in sinum migrare, animadvertitur. Itaque intelligi potest, qui factum sit, ut neque in hac prima figura, neque in secunda & quarta, sinum venae proposuerit; sed truncum, ut ex conjunctis ramis, splenico scilicet & mesenterico, natum, sic in ramos divisum. Exhibet autem divisum in ramos tres, i, h, g. Et sic quoque in figura 11. & 14. a, a, a.

- i De quorum primo, respondere eum ramo dextro, apparet; quem per sinum jecoris dextrorsum duci scripsi; esseque partem dextram sinus venae portarum appellati; nec longe ab ortu suo jecori immergi.
- h u t Alterum respondere invenio venae portarum ramo ad ligamentum rotundum pertinenti: qui pars est sinistra, eaque major; sinus ejus vulgo appellati.

Eum in aliquot jecoribus, quae data opera examinavi, à trunco venae portarum sensim inveni aliquanto contractiorem: inde rursus sensim aliquanto ampliorem: post aliquanto ampliorem totum. Flectitur circum eminentiam inferiorem sinus jecoris, in quo est: & ubi flectitur, ibi angustior. Respondet hoc ramo h u t. Non possum tamen non fateri, crassiorem esse, quam ubi u inscripsi; atque adeo etiam, quam inde ad t. Sic autem alias quoque in mensuris fuit minus diligens: & in hac ipsa icone ramus splenicus tenuior est, quam in 11. & 14.; quae tamen hujus continuatio sunt.

Ramos quoque emittentem inveni, qui respondeant iis, quos ille, cui h inscripsi; quibusque x, y, z, w, v, v. De quo infra plenius.

Atque is ni esset, ejusmodi nullus in icone inveniretur: ille, qui tam insignis in jecore, manifestusque. Nam, qui solus superest, sinister, cui g inscripsi, ita, ut videbimus, non respondet.

Respondet quoque truncato ad postremum t, ubi ex isthmo jecoris emergens, aut, quibus isthmus major, sub eo, continuatur ligamento rotundo. Aliquanto longior esse videtur infra ramum infimum eorum, ad quos v appolui. In hominibus autem junioribus, quorum corpora adhibuisse ostendi in praefatione, ad eum modum inveni.

Si in figura 14. tabulae 11. circini crus alterum infingere summae ibi velis venae portarum N, ubi in sinum jecoris pertinet; alterumque mox infra isthmum jecoris T, ubi ligamentum rotundum X ad eum pertinet: sique deinde transferre hanc mensuram in figuram, de qua agitur, primam hujus tabulae 22. 11, sic ut alterum circini crus infigas ramo truncato infra t; videbis crus alterum pertinere ad venam portarum, ubi in sinu jecoris dividitur: ut longitudo haec respondeat. In figura autem 14. tabulae 11. jecoris positus est alius, nec caeterorum mensura huic primae tabulae 22. 11. respondet. Posset tamen fortasse, quod de respondente mensura, ea in vicinitate partium jecori inhaerentium, attuli, argumento, praeter anatomen, esse, aut saltem indicio. Ramus autem venae portarum, qui ad ligamentum rotundum pertinet, pervius manet, usque quo sub isthmo jecoris, hic si, ut in figura 14. tabulae 11. angustior sit, emergens, continuatur ligamento rotundo, quod embryoni vena fuerat umbilici.

Expendam, ut soleo, quae prolata sunt ab aliis. Lancisius *venam* hic esse *umbilicalem ad ostium jecoris dissectam*, 11. 14. Negavit Bianchus: de quo post videbimus, ad v, v, v. Morgagnus in *epistola anatomica* 1. §. 122. 11. *Lancisium in vena umbilicali designanda attendisse locum*, cui t inscripsi, *ejusque canalis crassitudinem venae umbilicali convenientem*. Lancisius

cisius *venam umbilicalem cum ramis venae portae facto semicirculo inosculari* tradit, locumque, ubi hoc fiat, designat numeris his, 8. 12; qui locum illum, cui u inscripsi, designant: eoque ramum venae portarum à vena umbilici difterminare ibi loci videtur, venamque umbilicalem appellare, ei certe accensere, quod à t pertinet ad u. In quo & confirmari potuerit, eo quod rami, ad quos v, v, v apposui, contra obversi sunt, ac rami venae portarum rami primi, ad quos x, y, z: de quibus dicitur suo loco. Eamque *ad ostium jecoris dissectam* esse tradit; *ostium* fortasse appellans locum, ubi jecori ipsi immergitur, id est, ubi sinum ejus subit.

Ubi u inscripsi, id Bianchus, contra Lancisium scribens, *sinistram sinus venae portae productionem* esse affirmat, *historiae hepaticae animadversione ad figuram III. tabulae suae VIII. pagina CIOXCIX.* Ad quod Morgagnus *epistola anatomica I. §. LXXII.* non sinus, inquit, *venae portae ea videtur esse productio, quae cum eo sinu non communicet, sed cum ulteriore demum ramo, non solum ex sinu jam profecto, sed in alios etiam ramos diviso.* Quid! quod non modo sinus, sed ne productio quidem esse videtur istius rami venae portae, cum & multis partibus crassior sit curvo illo ramusculo u, per quem a latere cum ramo illo continuatur, & suos ipse ramos contra obversos habeat, ac rami illius productio haberet. Et paulo post: *quaerere, si viveret, Lancisium posse,* "cui unquam vere anato-
mico contigerit perspicere", *sinum venae portae, posteaquam in majorem ramum, deinde in ramusculum contractus est. mox repente in ampliorem, & tam longum ramum expandi, cujus praeterea surculi contra atque oporteret, non secundum motum sanguinis a sinu venientis, sed contra eundem conversi sint.* Quam Bianchus *productionem sinus* vocat, ubi nimirum u inscripsi; ea, si comparo, parti respondet rami venae portarum ad ligamentum rotundum pertinentis, id est, sinistrae sinus, ut appellant, venae portarum: quod supra in principio dictum est. De ramis dicitur ad x, y, z, w, v, v, v.

Num forte, inquit Morgagnus *epistola illa anatomica I. §. LXXII.* major aliquis ex iis ramis quos aliquando Fallopius (in observationibus anatomicis) --- hinc communicare vidit cum intima sinistri hepatis lobi substantia, inde vero aut "sub pancreo cum quibusdam aliis venis ab eodem portarum
trunco extra hepar obortis, aut, in liene, cum hujus, ipsius substantia, Non hoc dico; neque enim delineatio haec cum Fallopii descriptione satis convenit, quamvis ad id rerum genus quadantenus videri possit accedere.

g Si autem ramus h u t sinistra sit sinus venae portarum pars, ad ligamentum rotundum pertinens; non inveniretur in jecore; qui respondeat ramo tertio g, in sinistram jecoris partem in icone ducto. Neque in jecore humano tres inveniuntur, sed tantummodo duo. Nuper tamen, quum denuo edendus hic liber esset, perquirens, incidi in puerulum, cui duobus illis, quibus i & h inscripsi, respondentes erant; praetereaque, qui respondere posset tertio g. Dextro inde à trunco venae per longitudinem inciso, ostium tertii alicujus g facile animadverti, ab eoque sinistrorsum in jecur pertinentem.

Ramus ille in icone sinister g principio suo incurvo videri posset respondere sinistrae sinus venae parti: ramis non ita respondet. Neque eundem illum ramum g ad ligamentum rotundum, venamve, si quis velit, umbilici, pertinere, ullo in icone indicio cernas: quum tamen pertineat sinus

venae portarum pars sinistra; atque ita quidem pertineat, desinatque tota, ut ea parte extrema terminare in icone non potuisset, nisi aut ligamentum rotundum, cui continuatur, venamve umbilici, simul exhibuisset, aut ab iis resectum sinum; ut ramus alter h u t refert, infra t. Utcunque fuerit, certe malim culpam in me conferre, qui propositum satis non assequar; quam erroris insimulare Eustachium insignioris in re notabili, manifesta quae.

x, y, z, v, v, v Ramis respondent, quos à ramo venae portarum ad ligamentum rotundum pertinente duci in jecur inveni. Quorum qui respondent iis, ad quos x, y, z; eos contra quoque obversos inveni iis, qui respondent illis, ad quos apposui v, v, v. Caeterum animadverti in iis dissimilitudines multas. Commodo meo, & quo minus distraherem, vitiaremque, incidi per longitudinem truncum venae portarum, ramumque ejus tum dextrum tum sinistrum, qui ad ligamentum rotundum pertinet; diduxique eos, quo ostia ramorum, qui emittuntur, cernerem: inserui deinde in ea stylum, atque etiam per longitudinem incidi ab ostio suo ramos, ut, in quam partem jecoris, & quomodo ducantur, cognoscerem.

v, v, v In jecoribus aliquot adutorum ramus venae portarum, qui ad ligamentum rotundum pertinet, ramos juxta illud emisit insignes tres, deorsum in jecur ductos; à dextra parte duos, à sinistra unum. Circa hunc locum plures, iique exiliores: plures praesertim in embryonibus, infantibusque. Quorum alii sic obversi, ut ad quos v, v, v apposui: alii in latius ducebantur: alii oblique deorsum; alii rectius. Accuratius persequi nihil attinet.

w A ramo venae portarum ad ligamentum rotundum pertinente ramus insignis emittitur, ut hic, supra in latere sinistro; inque sinisteriorem jecoris partem sursum ducitur oblique sinistrorsum. Potuerit hoc positu jecoris, quem vasa ejus referunt, ita sursum ductum, antequam venam cavam, ex reddendi ratione exhibere.

In eam sinus jecoris partem, cui K in figura iv. tabulae xi. inscripti, pertinet. Et, si quid mensurae tribuere velimus, certe in quarta tabulae xi. quantum sinus K distat ab imo ibi isthmo T, tantum in hac prima tabulae xxvii. imus truncatus (infra t) ramus venae portarum distat à radice rami hujus, cui w inscripti. Praeterea quae, quantum in iv. tabulae xi. à summo ibi venae portarum trunco N distat sinus K; tantum in hac prima tabulae xxvii. medius truncus venae portarum, ubi ramos hepaticos emittit, distat à radice ejusdem hujus rami, cui w inscripti.

Finis tamen non est, qui caeterarum hac in icone venarum: non sic acutus. Atque in hoc scrupulus residet: de quo mox dicetur.

Circa hunc locum, fere autem ultra eum, id est, in icone altiore, ramum invenio intus per jecur sursum ductum, ibi ubi extrinsecus sinus jecoris, II figurae iv. tabulae xi, per quem in embryone canalis, quem vocant venosum, ducitur, posteaque ligamentum, in quod versus. Inveni autem mododictò multo exiliorem, ut ex duobus his ille crassitudine respondeat magis.

Essetne autem canalis ille venosus? Procul dubio esse Bianchus arbitrat, *historiae hepaticae animadversione ad figuram tertiam tabulae suae viii. pagina cixcix.* Contra quidem valere, quod Morgagnus *epistola anatomica* i. §. lxxiii. notavit, canalem illum *ex sinu oriri venae portae*, nequit; si quidem hoc, unde oritur in icone ramus w, ad sinum, quem vulgo appellant, pertineat, sitque illius ipsius pars maxima: de quo vide

vide annotationem ad h. u. t. Addo autem, canalem venosum ultra ramum, cui w inscripti, emitti invenire me solitum, ex altiore arcus illius in icone loco.

Situs canalis venosi difficultatem non adeo creat. Nam, si anatomicorum in iconibus, si in ipso jecore, *totus a sinistro latere trunci venae cavae; non ad hujus anteriorem faciem positus est*; id fit ex positu jecoris alio. A sinistra enim venae cavae parte sine dubio positus est, quum jecur gibbo suo jacet in tabula, ita, ut exhibet figura 14. tabulae XI, ubi canalis venosus poneretur secundum sinum jecoris, cui II inscripti; atque adeo à sinistra parte venae cavae FH. At positu jecoris integro, sicuti in ventre est, à priori parte si quis consideret, (à qua parte Eustachium vasa ejus hic expressisse dubium non est) fortasse haud ita difficulter cognoscat, quomodo ad canalem venosum ad anteriora venae cavae exprimendum adduci potuisset.

Cui tamen interpretationi, qua pro canali venoso habeatur, illud satis non esset, quod in ullos alios surculos ramus idem w toto itinere non dividatur, quando Eustachius a dextris cysticae venae dexteræ alterum vel longiorem pinxit ramum venae portae qui nullos surculos de se emittit: quod Morgagnus praeterea addit.

Verum, si anatonem consulamus, inquit eodem in loco Morgagnus, *finis ejusmodi, quem icon exhibet, non solet esse tubuli venosi: &, in cavam desinit ex hepate jam emergentem; magnoque certe intervallo ab eo loco desinit, ubi videretur exhibere.* Ni arbitrari velimus fore, ut hic quoque confiteatur, quod in tractatus de vena sine pari antigrammate XIII. de alba illa equorum vena, *obscurissimum finem, sibi que adhuc non bene perceptum, obtinere.* Verumtamen, an quidem animadvertere nequivisset tam manifestum, tam facile inventu? praesertim quum pars, quam exhibuerit, facile perduxisset ad finem.

Et tamen honorem Eustachio inventi canalis venosi libenti animo tribuerem, non ante Arantium modo, cui vulgo tribuunt; sed etiam, qui ante eum, atque etiam plenius, descripsit, ediditque, Vesalium. Scripsit Arantius in libro de *humano foetu*, capite XIV, haec: *observatione insuper digna videtur conjunctio altera, quae in jecore fit, portae scilicet cum cava, quae setui tantum, dum in utero continetur, usum praebet. Fit autem duorum ramorum, qui satis insignes sunt: altero ex porta, è directo explantationis venae umbilicalis exoriente: altero ex cava, in jecoris substantia continuatio: ut si specillum in umbilicalem immiseris, inde in portae truncum, dein, diutae continuationis ratione, recta in cavam pervenies.* Vesalius autem in examine anatomicarum Falloppii observationum, quod Vesalii operibus hic anno 1510ccxxv. editis cum Boerhavi adjeci, quum, inquit ibi pagina 100cxviii, *disigentius foetum secui, & integram umbilici venae seriem studui cognoscere, hanc in jecoris substantia consistentem, vidi totam indivisam in elatiorem caudicis venae portae sedem inferi. Mox ex venae portae caudicis posteriori regione, observavi propaginem in cavae venae caudicem distribui, illicque anteriori cavae venae sedi inferi, ubi ipsa maximos suos ramos jecori offert, hinc in illam pertinent. Haec propago, qua portae vena cavae jungitur, magis sere quam dimidio gracilior est, ipsa umbilici venae insertionem, aut umbilici venae amplitudinem.* Arantii librum primum editum fuisse invenio anno 1510clxxi. Vesalii examen anno jam 1510clxiv. editum: quod scripserat anno 1510clxi, ut ex die, quem in

S;

fine

sine notavit, apparet. Eustachii tabulae, si quid iis, quae Morgagnus in epistola ad Lancisium solerter persequitur, tribuamus, anno MDCLII. fuerunt incisae: neque apparet, post adjunxisse.

An vero in ligamentum jam versum, id est, ejus reliquias exhibuisse suspicabimur? Et ligamentum illud ab eodem loco oritur, à quo, canalis quum est; ad eundemque pertinet. Membranis autem in sinu jecoris inhaeret: inque adultis haud raro inveni iis in membranis veluti extenuati, ad postremumque aliquantum dilatati, & quasi evanescentis, speciem quandam referre. Ad quod qui attenderit, ei videri posset, hanc ob causam & brevius, & in fine nonnihil dilatatum, ac veluti extenuatum exhibuisse. In ipso autem sine, ubi venae cavae videri cuipiam posset inservisse, lineolae illae, quae continuatae sunt illis, quibus cavae umbra efficta, delineationem aut rudiorum, aut imperfectiorum quandam, significare possint; quum appareat tanquam si ante lineolas illas positae sint lineae hunc ramum ab utraque parte terminantes; interque has lineas venae cavae umbra continuata conspiciatur.

Quod Martinus (quem auditorem habuisse, jucundum est recordari) in eruditis commentariis suis assertit, in icone cylindri forma esse, non, ut venae, coni; id momentum habere non videtur: quippe quum in ea à principio forma sit coni, & in eadem venae hepaticae sinistrae superioris ramo illi, qui venae cavae propior, eique tam longo, forma data quoque sit cylindracea; eademque hujus ipsius venae portarum rami h. ramo, cui y inscripsi.

Neque movere quicquam potest hoc, quod, si ligamentum illud non esset, ejus ne indicium quidem exhibuerit; quum tamen foraminis ovalis, V in figura III. & D in VI. tabulae XVI; & canalis arteriosi, c in sexta tabulae XV, adjecerit reliquias; & in tabula XXVI. 34: 34. n. II. radices articularum umbilici in ligamenta versarum. Movere nequit, quoniam sic etiam alia ad propositum suum non pertinentia praetermisit, aut praeteriit: quorum in praefatione exempla attuli.

Neque crassitudinis ratio ullo modo respondet. Ligamentum enim illud, contra, atque in icone ramus w, longe est exilius ramo, unde oritur. v, v, w Ejusmodi autem ramos, quibus hi respondeant, venaene emittit portarum ramus, an ad eum pertinens vena umbilici? Hic constare de termino debet, qui inter venas illas duas statuatur: nam continuatae sunt. Lancisius, ut supra dictum est annotatione ad h u t, terminum in icone ponere videtur ibi, ubi u inscripsi; ut, quicquid à t ad u pertinet, venae accenseat umbilici. Quo posito, certe ramos vena umbilici emittit, ea ex parte, quae pervia maneat adultis. Neque valet, quod Bianchus contra Lancisium in *historiae hepaticae explicatione figurae III. tabulae suae VIII. pagina cxc.* profert: *cui unquam vere anatomico contigisset perspicere, umbilicalem venam suo per hepar itinere in ramos facessere.* Ad quod Morgagnus, hoc, inquit in *epistola anatomica I. §. LXXII, Lancisius vel quibusdam crediderit scriptoribus, vel potius in tanta rerum copia satis fortasse non attenderit.* Ramos autem vena umbilici emittit nullos, si terminus ejus ponitur infra locum, unde rami primi emittuntur: quousque nimirum, ligato fune umbilici, in ligamentum rotundum vertitur, deleturque, aliis etiam cum proximis ramis, nullius amplius usus. Hunc terminum Bianchum ponere, ex hoc, quod loco mododicto subijcit, colligimus; certe unico solum, ac solitario ductu in portae sinum exonerari. Po-

dit

nit quoque Morgagnus: qui in *epistola anatomica* I. §. LXXXI. canalem, cui t inscripti, non videri esse venam umbilicalem tradit, cum ejus attendimus ramos, quos certe in ea vena adhuc conspiciere non potuerit. Et manifestum est ex ejusdem *epistolae* §. LXXV. Ubi, *solum se esse invenire, sinum venae portae, cum a dextero jecinatoris lobo ad sinistrum se extendens, contra interjectam utrique lobo fissuram pervenit, se ipsum, aut potius quendam quasi ramum ex ima sui parte deorsum mittere, qui obviam scandentem umbilicalem venam mox infimo suo extremo sic excipiat, ut non facillimum saepe sit utriusque fines statuere, praesertim cum venae summa pars (quod nonnunquam observaverit) non prorsus adhuc in adultis occlusa est. Ex ejusmodi igitur ramo, in quem ipsa umbilicalis vena recta producit, & quidem prope hujus venae finem, cum alios minores ramos ab anteriore, seu superiore facie oriri, tum duos praecipuos ab lateribus recedere, singulos ab singulis; ut haud raro, extrinsecus inspicendo, non absimilem effici figuram viderit ac si vena umbilicalis in fine trifida esset, quemadmodum ab Eustachio in eo iconismo (figura II. tabulae X.) videatur repraesentari. Etsi vero ramum illum sinus, duobus ramis interjectum, prae his invenire solitus sit crassiores, quam Eustachius delineavit; ab singulis autem lateribus non singulos semper praecipuos ramos, sed binos interdum compererit; saepe vero non sursum, sed deorsum potius oblique ductos invenerit; nunquam tamen haec quaevisse (quaevisse autem in adultorum jecinoribus saltem decem) quin si extrinsecus spectaret, illa se se sibi species offerret venae umbilicalis quae in summo hinc, & hinc ramos emitteret; si vero intrinsecus scrutaretur, sinus caveam deprehenderet se se manifesto demittentem in occursum illius venae, usque ramis initium praebentem. Et mox subjicit, eos, qui diducta jecoris fissura, hujusque isthmo, ne ulla ex parte obset, dissecto, umbilicalem venam ad sumum usque finem persequentes, qui rami denique hinc, & hinc in summae fissurae latera, eamve viciniam immittantur, inquirant; mox autem trunco venae portae, & continuato sinu a sinistris aperto, sectionem ad venam usque umbilicalem deducant, eorum quos dixerit, ramorum oscula perquirentes: eos, si in istiusmodi perquisitionibus fuerint diligenter versati, cum facile secum conjecturos quid Eustachius per trifidum illud vas significare voluerit, tum percepturos, cur ejusdem vasis truncum Lancisius venam umbilicalem appellavit. Eundemque terminum ponunt vulgo. Pono libenter: certe in iis, quibus vena umbilici in ligamentum rotundum jam versa, deletaque; ac sanguis ex trunco venae portarum in ramum ad ligamentum usque, inque ramos, quos ramus ille emittit, quantumvis contra oculos, sine dubio agitur. Itaque prout ponere libuerit, vena umbilici aut ramos emitteat ad jecur pertinentes, aut non emitteat, sed ramus venae portarum: eritque in nomine differentia, non in re.*

Hic praetermittere non debeo, Senacum, virum amplissimum, postquam explicationem meam primum emiseram, in tractatione de corde libri III. capitis III. §. IX. scripsisse, "Eustachium vasa hepatica embryonis adjunxisse hepaticis adulti, quod visum sit aenigma esse": quam sententiam datis ad me litteris significaverat. Sane quidem morem Eustachii his in tabulis ejusmodi non invenimus. Immo vero foramen ovale, quod embryoni non minus praecipuum est, quum potuisset commode, atque etiam commodius, in figura tertia & sexta tabulae XVI. non addidit; sed nil nisi reliquias ejus, V, puto, in III, D in VI: neque ico-

nem foraminis illius ullam dedit. Quid adulti, quid embryonis esset, quamvis conicere possimus, non additum. Additum si esset, possem fortasse dubitandi rationes proponere: & , ni fallor, invenirentur in iis, quae supra attuli. Neque, puto, sic tolluntur difficultates, quas icon creaverat.

Post Bertinus, vir clarissimus, in historiae academiae regiae scientiarum volumine anni c1010cclvii. pagina cccxxv. aliquid attulit. Ipsa verba dabo. *Ce qui rend cette figure aussi défectueuse qu'elle l'est en effet, c'est que vraisemblablement Eustachi ne l'a pas fait dessiner d'après le foetus; il a transporté sur le foie d'un adulte, ou d'un enfant qui avoit respiré, une image que l'examen du foie du foetus lui avoit fait naître, mais que le temps avoit affoiblie, & même défigurée: de sorte que, s'il étoit permis de soupçonner que cet anatomiste eût fait dessiner d'après son imagination ou sa mémoire quelques-unes de ses figures, je penserois que la première de la planche xxvii seroit de ce nombre; car quoiqu'en dise M. Albinus, de telles fautes ne sont point de la nature de celles que l'on peut attribuer à des dessinateurs.* Quacrerere hic possemus, satisne haec Eustachii, hominis minime vulgaris, referant ingenium. Qui praeterea, cujusmodi studium adhibuerit, scripsit in praefatione opusculorum; id quod ipse tam aperte declarant tabulae. Atque icon, praeter extremum rami, cui v inscripti, non minus clare expressa est, quam ulla alia. Sane hoc unum notaveram, in extremo canalis illius esse quod *delineationis aut ruditatem, aut imperfectionem* quandam significare possit; causamque, cur possit, attuleram: cujusmodi quid delineatores, scalptoresve, admittere posse videntur. Acturum se aliquando de hac icona promittit; eoque sperare licet fore, ut rationes sententiae suae prolaturus sit, quibus adducamur ad consentiendum.

Caeterum, iconis hujus hanc partem, ad quam h g t u v v v w apposui, dubitanter interpretatus sum. Sic Morgagnus prudenter, si, inquit in epistola anatomica i. §. lxxiv, *trium istorum ramorum (t, h, w) interpretationem aggredi debuissim --- utrinque rationes fuissim proposuiurus, cur vena umbilicalis, productio sinus venae portae, tubulus venosus tum esse, tum non esse videri possent: iisque proposiis, rem in medio relicturus, ut signi vel alia vestigare, & credere mallet, vel haec quidem, sed ita uti Eustachius aut humani aliquid passus esset, aut ex quam rarissimo exemplari, aut ex non humano rem descripsisset, aut ejus pictores, scalptoresque non satis fideliter expressissent, haec per me omnibus sive meliora statuendi, sive divinandi facultas libera esset.* Integra quoque per me cuique sit iudicandi potestas. Argumentationes autem meas alias, quas primum edito hoc opere protuli, conjecturasque, nunc deletas volo.

k Venae portarum ramus ad cistam fellis pertinens.

l Arteria hepatica, truncata: quae v figurae xi, & p figurae iv. In duos ramos dividitur, qui comites plerorumque venae portarum ramorum, cum iis per jecur, cistamque fellis, ducuntur.

Lancisii numeri hi 12. xi, quibus duos arteriarum ramusculos ex caelica in jecur distributos designat, designant omnino (in meis saltem exemplaribus) hunc truncum arteriae hepaticae, & quidem illam ejus partem, ubi se in duos ramos divisurus est, ut dubitare vix possim, quin eos designare voluerit. De quo Morgagnus, hoc, inquit, si voluisset; Eustachii mentem praeclare mihi videretur affectus. Epistola anatomica i. §. lxx.

Bianchus, historiae hepaticae animadversione ad figuram iiii. tabulae suae viii. pagina c10xcix, cogitavit, per binos hos trunculos, l & n, arteriam, simul-

- simulque nerveum aliquem majorem ramum indicare distinctim voluisse. Cul cuidam dubitationi Morgagnus occurrit epistola anatomica 1. §. LXX. LXXXI.*
- m Arteriae hepaticae ramus ad cistam fellis pertinens. Comes rami k venae portarum.
- n Canalis choledochus, truncatus.
- Vide annotationem alteram ad l.
- o Canalis cysticus, truncatus.
- p Canalis hepaticus.
- q, r, s Tres rami, in quos canalis hepaticus dividitur. Qui per jecur comites venae portarum ramorum trium g, h, i, ac plerorumque eorum, quos per jecur spargunt.
- g, h, i, l, q, r, s Vide Morgagni epistolam anatomicam 1. §. LXIX.

FIGURA SECUNDA.

Vena portarum extra jecur, una cum arteria coeliaca ac mesenterica utraque.

Recte Lancisius, hanc secundam, & quartam, *sub aspectu ponere complexum arteriae caeliacae & venae portae*: adde autem, etiam arteriae mesentericae utriusque. Recte quoque, duos ramos majores venae portae infra jecur, ramis arteriae caeliacae *associatos*: adde autem, etiam utriusque mesentericae. Et recte quoque, has figuras *discrepare, quod figura 11. majori vasorum numero ditetur, quam 1v.* Apparet autem, quod hoc non solum, sed aliis etiam rebus notabiliter discrepent.

a, a, a Radices ramorum, quibus vena portarum ad jecur pertinet, g, h, i figurae 1.

b Venae portarum truncus.

c Venae portarum ramus, qui conjungitur cum vena l coronaria ventriculi.

dd Vena mesenterica.

e Vena gastroeiploica dextra. A qua primum rami ad duodenum, & pancreas. Dein, à superiore parte ad ventriculum: alii ad partem ejus priorem, ut f, &c: alii ad posteriorem, ut g, g, ut videtur. Ab inferiore parte ad omentum, ut h, &c. Aliisque ramis i, i conjungitur cum mesentericis.

Vide annotationem ad r.

kk Vena lienalis.

l Venae lienalis ramus, qui est coronaria ventriculi.

m Vena mesocolica, oriens à lienali.

n Venae lienalis in ramos divisio, ad lienem potissimum pertinentes.

o, o, &c. Rami ad ventriculum.

p Vena gastroeiploica sinistra. A qua rami à superiori parte ad ventriculum, alii pertinentes ad partem ejus priorem, ut r, r: alii ad posteriorem, ut q, q. Ab inferiore, s, s, &c. ad omentum: qui hic truncati. Caeterum conjungitur cum gastroeiploica dextra.

Quoniam rami f, r, r decussant ramos g, g, q, q, & qua decussant, à priori eorum parte positi sunt, puto his, f, r, r, exhiberi eos, qui à vasis gastroeiploicis ad priorem ventriculi partem pertinent; illis autem, g, g, q, q, illos, qui ad partem posteriorem.

t Arteria coeliaca, ab aorta rescissa.

u Coeliacae dexter ramus. A quo rami duo v, w.

T:

v Ar-

- v Arteria hepatica, l figurae 1.
w Arteria gastrophloica dextra. Comes venae e gastrophloicae dextrae, ramorumque ejus.
x Arteria lienalis, coeliacae ramus sinister. Comes venae lienalis k k.
y Arteria coronaria ventriculi. Comes venae l coronariae, ramorumque ejus.
Arteria lienalis in ramos juxta lienem dividitur, ad lienem potissimum pertinentes, ut vena lienalis n, ramorum ejus comites. A quibus etiam rami ad ventriculum, venarum o, o, &c. comites.
z Arteria gastrophloica sinistra, comes venae p gastrophloicae sinistrae, ramorumque ejus. Et conjungitur quoque cum arteria gastrophloica dextra.
AA Arteria mesenterica superior, ab aorta rescissa. Comes venae d d mesentericae, ramorumque ejus, praeterquam gastrophloicae dextrae, & ramo, qui est juxta d inferiorem.
B Arteria mesenterica inferior, ab aorta rescissa. Comes venae mesocolicae m, ramorumque ejus.
C Conjunctio ramorum venae mesocolicae & arteriae mesentericae inferioris cum ramis venae mesentericae & arteriae mesentericae superioris.
D, D, D, E, E, E, E, E Reliquae conjunctiones venarum arteriarumque, D, D, D in mesenterio, & E, E, E, E, E mesocolo. Ex quo annulorum quaedam species oritur. A quibus ad postremum, qua intestina spectant, rami emittuntur ad intestina pertinentes: quorum hic F, F, &c. radices exhibitae.
Caeterum venae & arteriae ad ventriculum pertinentes, lcyooooopz q r q r e w f g g, ita posita sunt, ut una cum ramis suis referant figuram ventriculi. Sic & venae mesentericae & mesocolicae, cum arteriis mesentericis, ramisque, qui a vena gastrophloica dextra, comiteque ejus arteria adjunguntur mesentericis, ut referant mesenterium cum mesocolo, per quae ducuntur. Confer figuram primam tabulae x, & secundam tabulae xi.

FIGURA TERTIA.

- a A corde & aure dextra rescissa vena cava utraque.
b Vena cava inferior, mox infra venas hepaticas duas superiores recisa.
c Vena cava superior.
d: e Venae subclaviae.
f Radix venae f tabulae xxv. n^o. xi.
g: g Radices venarum mammariarum. Vide l, l figurae xii.
h: h Radices venarum jugularium internarum.
i: i Radices venarum jugularium externarum.
k: k Radices venarum axillarum.
l m n o p A sinistro ramo magnae divisionis venae cavae in jugulo, e regione propemodum jugularis internae, duo surculi pullulant, in ejus lateris membranam, quae iboracem dirimit, percurrentes, quorum alter l venis septi transversis m, ei sursum occurrentibus, conjungitur; alter vero n sinistram hujusce musculi nervum concomitatus, hac quidem sua portione o in carneam ejus substantiam inseritur; illa vero p cum venis ejusdem coit, & cum priori surculo, ac etiam cum propaginibus venae sterni, easdem membranas adeuntibus, variis modis commiscetur. De vena sine pari, antigrammate viii.
q Vena ad sinistram partem mediastini & pericardii pertinens.
Ad hanc, & ad ramulum, ad quem r apposui, pertineat hoc: vena cava

- cava ad jugulum ascendens furculos, araneae modo praetenuis, ad membranas thoracem intersepientes mittit. De vena sine pari antigrammate VIIII.
- r Vena ad dextram partem mediaſtini & pericardii pertinens, ramisque ſuis conjuncta cum ramis s, t venae diaphragmaticae dextrae, ſibi ſurſum occurrentibus.
- u Vena diaphragmatica dextra, truncata.
A venis ſepti, & praecipue in dextro latere u, ramuli venarum s, t non ſolum ad cordis involucrum pertinent, ſed etiam ad membranas thoracem dividentes ſurſum feruntur, qui pluribus in locis cum propaginibus venae ſterni, per eandem diſſeminatis, junguntur. De vena ſine pari, antigrammate VIIII.
- v Vena diaphragmatica ſiniſtra, truncata.
- w, w Radices venarum hepaticarum ſuperiorum, b, b figurae 1. Comparationem docere puto.

FIGURA QUARTA.

Reſponder ſecundae, exhibetque eandem venam portarum extra jecur, una etiam cum arteria coeliaca, ac meſenterica utraque. Earum autem varietates exhibet.

Vide annotationem ad principium figurae 11.

- a, a, a Radices ramorum, quibus vena portarum ad jecur pertinet, g, h, i figurae 1.
- b Venae portarum truncus.
- c c Vena meſenterica.
- d d Vena gaſtroëpiploïca dextra. Ramorum ejus, qui ad omentum pertinent, indicatae tantummodo radices. Sic & plerorumque, qui ad ventriculū. Confer e figurae 11. Conjungitur quoque c cum ramis meſentericae.
- f Vena meſocolica, à meſenterica oriens. Confer m figurae 11.
- g g Vena lienalis.
- h Vena coronaria ventriculi. Confer l figurae 11.
- i Venae lienalis in ramos diviſio, ad lienem potiſſimum pertinentes.
- k, &c. Rami ad ventriculū. Quorum aliqui conjuncti l, l cum ramis venae h coronariae. Confer o, o, o figurae 11.
- m Vena gaſtroëpiploïca ſiniſtra. Solae radices ramorum, qui ad omentum pertinent, indicatae. Ramorum, qui ad ventriculū, alii expreſſi, aliorum tantummodo radices. Nec conjungitur cum vena gaſtroëpiploïca dextra. Confer p figurae 11.
- n Arteria coeliaca, ab aorta reſciſſa.
- o Coeliacae ramus dexter. A quo rami duo, p & q.
- p Arteria hepatica, l figurae 1.
- q Arteria gaſtroëpiploïca dextra. Comes venae d d gaſtroëpiploïcae dextrae, ramorumque ejus.
- r r Arteria lienalis, coeliacae ramus ſiniſter. Comes venae lienalis g g. Rami quoque, quos emittit, comites venae lienalis ramorum, i ad lienem, k, k ad ventriculū, &c.: ſed qui venarum illarum l, l conjunguntur cum ramis coronariae ventriculi, eis nulli comites.
- s Arteria coronaria ventriculi. Comes venae h coronariae, ramorumque ejus. Confer y figurae 11.

- t Arteria gastroëpiloica sinistra. Comes venae m gastroëpiloicae sinistrae, ramorumque ejus. Neque conjungitur cum arteria gastroëpiloica dextra. Confer z figurae 11.
- u Arteria mesenterica superior, ab aorta rescissa. Comes venae c c mesentericae, ramorumque ejus, praeterquam gastroëpiloicae dextrae.
- v Arteria mesenterica inferior, ab aorta rescissa. Comes venae f mesocolicae, ramorumque ejus.
- w, w, w Conjunctiones ramorum venae mesocolicae cum ramis venae mesentericae: itemque arteriae mesentericae inferioris cum ramis superioris. Confer C figurae 11.

Quomodo caeterae conjunctiones venarum arteriarumque in mesenterio & mesocolo differant ab iisdem figurae secundae, comparando eas inter se intelligi satis potest. Et in totum comparatio earum satis docet, quantum ductu ramisque venarum & arteriarum differant inter se. Et de caetero hac in figura, aequae atque in secunda, sic posita sunt, ut figuram referant ventriculi, & mesenterii cum mesocolo.

FIGURA QUINTA.

Hujus pars inferior respondet figurae 11. tabulae 1v.

- a Vena cava superior, juxta cor rescissa. Explicatione tabulae 1v. tribus primis figuris communi F. I. I.
- b Radix venae r figurae 111.
- c: c Venae suclaviae.
- d An radix venae q figurae 111?
- e Radix venae t tabulae xxv. n°. 11.
- f: f Radices venarum mammariarum, l: l figurae x11.
- g: g Radices venarum jugularium internarum.
- h: h Venae jugulares externae. Sinistra radicibus oritur duabus, altera i exiliore à subclavia juxta jugularem internam: altera k insigniore, ab humeraria. Confer r s f tabulae xxvi. n°. 11. Apparent rami earum per colulum ducti, eorumque conjunctio.
- l Radix venae humerariae.
- m: m Radices venarum axillarum.
- n, o: n, o Radices venarum intercostalium ab utraque parte superiorum duarum, t, u: t, u figurae x11.
- pqr Vena p à sinistro cavae trunco in jugulo, sub ortu venae sterni f enata, in duos ramos statim divisa; quorum major q sub arteria brachii sinistri, ad tertiam thoracis vertebrae reflexus; juxta radices costarum, usque ad nonam singulis furculos offerens, perreptat; quo ubi pervenit, cum ramis venae sine pari, octavum a, & nonum b earum intervallum nutrientibus conjungitur. Minor ramus r cum sinistro septi transversu nervo incedens, in ejus lateris membranam thoracem dividens, & in eam, quae pericardium appellatur, propagines distribuit: tribusque bifidis furculis in carnosam, eandemque superiorem partem septi inseritur. Explicatione figurae 11. tabulae 1v.

Haec eadem vena q (nempe quae azygae munere in sinistro latere fungitur) ubi a trunco sinistro cavae, juxta aliam r, quae sinistram septi transversu nervum concomitata in ipsum inseritur, & pericardio, ac membranis tho-

thoracem dividendibus furculos spargit, aut sub ortu jugularis internae, aut non longe ab eo principium sumit p, deorsum procedens super anteriorem arteriae sedem, quae axillam petit, ad posteriora versus tertiam aut quartam thoracis vertebrae contorquetur, indeque juxta radices costarum sui lateris emergens, si magna fuerit, venae sine pari conjunctionem renuit, & usque ad undecimam sola incedens octo intervalla costarum, quae sunt inter duo prima, & duo ultima, nutrit: si vero ita magna non est, ut hoc per se praestare queat, sed alterius auxilio egeat, ad septimum vel octavum, atque adeo nonnum spondylum descendit, ibique uni, aut duobus a, & venae sine pari ramis ei occurrentibus conjuncta desinit, tuncque, sicuti etiam paulo ante dixi, consueto illa munere utrimque fungitur. De vena sine pari, antigrammate xiii.

s Vena sine pari. Explicatione tabulae iv. tribus primis figuris communi Δ. Δ. Δ.
t Venae sine pari divisio circa decimam thoracis vertebrae. Ibidem Θ. Θ.

u Dexter, & v sinister ramus venae sine pari. Dexter cum prima vena sui lateris, in lumbis sub emulgentem orta conjungitur: sinister conjungitur cum alio, ab emulgentem orto, priusquam producat venam seminariam. Ibidem Σ. Φ.

Vena azygos, e regione octavae (Figurae vi. p.) aut decimae t thoracis vertebrae, in duos ramos, dextrum u scilicet ac sinistrum v, scinditur; hi deorsum repunt & septum transversum praetereunt, suarumque uterque propaginum vel una tantum, vel pluribus vario modo inseritur, scilicet aut in posteriorem sedem cavae, juxta ortum emulgentis, aut in ipsam emulgentem, & praesertim in sinistram (neque enim memini hoc idem me unquam in dextra observasse) retro, supra, infra; ea nimirum parte, quae venam seminariam ipsa procreat; aut etiam quandoque w in proximos venarum ramos, qui e regione summatae secundae lumborum vertebrae ortum ducunt. De renibus capite xvi.

Ejus venae (azygae) postremi rami plerumque cum primis lumborum venis, e regione secundae ipsorum vertebrae pullulantibus, commiscuntur, atque junguntur. De vena sine pari, antigrammate xvii.

Quando, ut in priori syngrammate diximus, altera venae azygae officio in eodem latere sinistro fungitur, tunc vero haec (azyga) in dextro plerumque juxta radices costarum procedens, medium vertebrae de more non descendit, nec propagines ad sinistra intervalla antea mittit, quam illa, quae in opposito latere vix ipsius est, huic juncta desinat, & terminetur: decipitur sane, qui secus ac diximus, fieri putat; quandoquidem ramuli a sinistro pariete venae sine pari pullulantes, ad spatia intercostalia non feruntur, sed in vicina corpora distributi consumuntur. De vena sine pari, antigrammate xv.

w Radix primae venae dextri lateris in lumbis sub emulgentem ortae. Explicatione tabulae iv. tribus primis figuris communi Σ. Φ.

x Radix rami ab emulgentem sinistra orti, priusquam producat venam seminariam. Ibidem.

y Truncus venae cavae, qua vocatae emulgentes ab ea oriuntur. Ibidem. Z. Z. Z.

z Radices venarum emulgentium.

a, & Rami venae sine pari, octavum a, & nonum & costarum sinistrarum intervallum nutriendi. Explicatione tabulae iv. figurae ii.

β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ Radices venarum intercostalium dextrarum: β tertiae, γ quartae, δ quintae, ε sextae, ζ septimae, η octavae, θ nonae, ι decimae, κ undecimae, λ duodecimae.

Vv

μ, ν,

$\mu, \nu, \xi, \theta, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi$ Radices venarum intercostalium sinistrarum: μ tertiae, ν quartae, &c.

A quibus autem venis intercostales tum sinistrae, tum dextrae, emittantur, ex icone ipsa appareat.

FIGURA SEXTA.

Hujus pars inferior respondet figurae III. tabulae IV.

a Vena cava superior juxta cor recisa. Explicatione tabulae IV. tribus primis figuris communi $\Gamma. \Gamma. \Gamma.$

b: b Venae subclaviae.

c Radix venae f tabulae XXV. n^o. II.

d An radix venae q figurae III?

e Radix venae l figurae III. Ex comparatione videtur apparere.

ff: ff Venae jugulares internae.

g: g Venae jugulares externae. Apparent rami earum per collum ducti, eorumque conjunctiones, tum inter se, tum cum ramo jugularis internae sinistrae.

h: h Radices venarum axillarum.

i, k: i, k Radices venarum intercostalium ab utraque parte superiorum duarum, t, u: t, u figurae XII.

lmn Vena l à sinistro cavae trunco in jugulo ortum ducens, in duos ramos scissa. Quorum alter m cum sinistro nervo septi transversi procedens, in hoc, & in membranam dividens iboracem distribuitur. Alter ramus n sub arteriam brachii reflexus, è regione quintae vertebrae iboracis, cum eo ramo s venae azygae conjungitur, quem à sexto intervallo sursum reflecti diximus. Explicatione tabulae IV. figurae III. b.

o Vena sine pari. Explicatione tabulae IV. tribus primis figuris communi $\Delta. \Delta. \Delta.$

p Venae sine pari diviso è regione octavae thoracis vertebrae, ut interdum à nobis observatum est. Ibidem $\Lambda.$

q Dexter, & r sinister ramus venae sine pari, qui cum prima vena sui lateris, in lumbis sub emulgente orta $\pi: g$ conjungitur. Ibidem $\Sigma: \Phi.$

Vena azygos, è regione octavae p aut decimae (figurae v. t.) iboracis vertebrae, in duos ramos, dextrum q scilicet ac sinistrum r, scinditur; hi deorsum repunt & septum transversum praeteriunt, suarumque uterque propaginum vel una tantum, vel pluribus vario modo inferitur, scilicet aut in posteriorem sedem cavae, juxta ortum emulgentis, aut in ipsam emulgentem, & praesertim in sinistram (neque enim memini hoc idem me unquam in dextra observasse) retro, supra, infra; ea nimirum parte, qua venam seminariam ipsa procreat; aut etiam quandoque in proximis venarum ramos $\pi: g$, qui è regione summmitatis secundae lumborum vertebrae ortum ducunt. De renibus capite XVII.

Ejus venae (azygae) postremi rami plerumque cum primis lumborum venis $\pi: g$, è regione secundae ipsorum vertebrae pullulantibus, commiscuntur, atque junguntur. De vena sine pari, antigrammate XVII.

s Ramus venae azygae, qui juxta radices costarum sursum reflexus, t tertium, u quartum, v quintum, & w sextum earum intervalla sinistri lateris nutrit. Explicatione tabulae IV. figurae III. a.

Quan-

Quandoque etiam vena sine pari e regione sextae thoracis vertebrae ramum ad sinistram partem mittit, qui sursum elatus, ad quintam ejusdem cum alio n, a trunco sinistro juguli orto, conjungitur, indeque usque ad tertium intervallum alimentum praebens conscendit. De vena sine pari, antigrammate XII.

x, y, z, α, β, γ Reliquarum venarum intercostalium sinistrarum radices: x septimae, y octavae, z nonae, α decimae, β undecimae, γ duodecimae.

δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν Radices venarum intercostalium dextrarum: δ tertiae, ε quartae, &c.

ξ Truncus venae cavae, quae vocatae emulgentes ab ea oriuntur. Explicatione tabulae IV. tribus primis figuris communi E. Z. Z.

ο:ο Radices venarum emulgentium.

π:π Radices primarum venarum sui lateris, in lumbis sub emulgentibus ortarum: Explicatione tabulae IV. tribus primis figuris communi Σ:Φ.

FIGURA SEPTIMA.

a Vena cava superior juxta cor recisa. Explicatione tabulae IV. tribus primis figuris communi Γ.Γ.Γ.

b Radix venae r figurae XII.

c: c Venae subclaviae.

d Radix venae f tabulae XXV. n°. II.

e: e Radices venarum mammariarum, l: l figurae XII.

f: f Radices venarum jugularium internarum.

g: g Radices venarum jugularium externarum.

h: h Radices venarum axillarum.

i Vena vertebralis dextrae, quae radicibus duabus oritur, k altera ab axillari ultra jugularem externam: l altera a subclavia pone jugularem internam.

n Vide k, l tabulae XXVI. n°. II.

m Venae vertebralis dextrae ramus internus, qui per canalem processuum transversorum vertebrarum colli pertinet.

n Venae vertebralis dextrae ramus externus, n tabulae XXVI. n°. II.

o, p, q Conjunctiones rami interni externique venae vertebralis.

r, s Venae vertebralis sinistrae.

t Ramus internus venae vertebralis sinistrae, qui per canalem processuum transversorum colli pertinet.

u Radices venarum intercostalium ab utraque parte primarum, t: t figurae XII.

v Radix venae intercostalis sinistrae secundae, u figurae XII.

w Vena, quae azygae munere in sinistro latere fungitur.

Si ad ferendos anatomiae labores quispiam piger non sit, post nonnullas obitas sectiones, facile intelliget, in hominibus aliam venam w non semel reperiri, quae azygae munere in sinistro latere fungatur, quaeque aut a ramo primae divisionis venae cavae in jugulo ortum ducat, &c. De vena sine pari, antigrammate XII.

Haec eadem vena, ubi a trunco sinistro cavae, juxta aliam, quae sinistrum septi transversum nervum concomitata in ipsum inferitur, & pericardio, ac membranis thoracem dividens furculos spargit, aut sub ortu jugularis internae, aut non longe ab eo principium sumit, deorsum procedens super an-

- teriore arteriae sedem, quae axillam petit, ad posteriora versus tertiam aut quartam thoracis vertebrae contorquetur, indeque juxta radices costarum sui lateris emergens, si magna fuerit w, venae sine pari conjunctionem renuit, & usque ad undecimam sola incedens octo intervalla costarum, quae sunt inter duo prima, & duo ultima, x, y, z, α, β, γ, δ, ε, nutrit. Ibidem.
- x, y, z, α, β, γ, δ, ε Radices venarum intercostalium sinistrarum: x tertiae, y quartae, z quintae, α sextae, β septimae, γ octavae, δ nonae, ε decimae.
- ζ Vena sine pari, quae circa undecimam thoracis vertebrae dividitur η in ramum dextrum θ, & sinistrum ι.
- κ Azygae dextrae ramus, à quo venae intercostales dextrae, λ secunda, & μ tertia.
- ν, ξ, ο, π, ς, σ, τ, υ, φ Radices reliquarum venarum intercostalium dextrarum: ν quartae, &c. Quae sunt rami venae sine pari, ramique ejus dextri θ eorum, in quos circa undecimam thoracis vertebrae dividitur.
- χ, ψ Radices venarum intercostalium sinistrarum: χ undecimae, ψ duodecimae. Quae sunt rami rami ι sinistri eorum, in quos vena sine pari circa undecimam thoracis vertebrae dividitur.

FIGURA OCTAVA.

Quaedam dextri brachii venae.

a Vena cava superior juxta cor recifa.

b: b Venae subclaviae.

c Radix venae jugularis internae.

d Radix venae jugularis externae.

e Vena axillaris.

f, f, f Rami, qui pertinent ad pectus, latus thoracis, &c.

g Venae duae, quae sunt loco axillaris profundae. Ramo intermedio conjunctae, post confluent in unam i juxta cubiti flexum.

k Externa axillaris. De vena communi profunda brachii, antigrammate iv.

l Humerariae vices gerens.

Hanc eandem venam (humerariam puta) opinio deesse interdum observavi; sed ab externa axillari, ante medium longitudinis humeri, tenuem surculum erumpere, qui flexo itinere ad consuetum locum perductus, humerariae vices gereret, & circa cubiti articulum ramo uno m cum axillari externa, altero autem (hic duobus n) cum interna de more conjungeretur. De vena communi profunda brachii, antigrammate iv.

o Axillaris parum supra internum humeri tuberculum in duos ramos diviso; quorum exterior p cum altero humerariae ramo m conjunctus communem superficiariam q constituit. Explicatione figurae i. K, & ii. k tabulae viii.

r Venae communis superficiariae conjunctio cum axillari profunda.

s Conjunctio rami venae communis superficiariae cum ramo externae axillaris.

FIGURA NONA.

Quaedam sinistri brachii venae.

Lancisio quidem visum, delineare arteriam, quae ad brachium fertur.

At

At venas exhibere, tota explicatio, quam dedi, ita declarat & probat, ut necesse non videatur argumenta hic afferre.

- a Vena cava superior juxta cor recisa.
- b Radix venae subclaviae dextrae.
- c Vena subclavia sinistra.
- d Radix venae f tabulae xxv. n°. 11.
- e Radix venae jugularis internae.
- f Radix venae jugularis externae.
- g *Vena humeraria ita mihi exilis quandoque occurrit, ut nisi animum una cum oculis diligenter advertissem, me prorsus effugisset.* De vena communi profunda brachii, antigrammate iv.

Ad hanc venam pertinere hic locus visus est. Expendant porro intelligentes, pertineatne, nec ne.

- h Humerariae illius conjunctio cum trunco venae axillaris externae, & i cum ramo ejusdem.
- k Axillaris vena.
- l Vena axillaris profunda.
- m Vena axillaris externa. De vena communi profunda brachii, antigrammate iv.
- n Venae axillaris externae conjunctio cum axillari profunda.
- o Axillaris in duos ramos diviso, quorum exteriore p cum humerariae ramo i conjuncto fit vena q: ad quam alius ramus r à ramo interiore divisionis axillaris externae adjungitur.
- s Ramus à vena communi superficiali ortus, conjunctusque cum axillari profunda.

Praeterea apparent venae superficialiæ, rami axillaris externae, humerariae, communis superficialiæ: quae per cubitum manumque ramosae, ac crebre conjunctae. Et illae quidem, quae superiores in icone, per internam partem cubiti: quae inferiores, per externam, perque manum ad extremos usque digitos ducuntur.

FIGURA DECIMA.

- a Auricula dextra, b hac parte à corde recisa.
- c Vena cava inferior.
- d e *Duæ partes aequales, in quas vena cava, superato diaphragmate, scinditur: de vena sine pari, antigrammate xii. d Dextra, & e sinistra.*

FIGURA UNDECIMA.

Animalium, quibus in sinistra thoracis parte vena inferiora costarum spatia alens tributa est, alia unam tantum habent, alia duas; unam echinus & mus, quorum vena cava, superato diaphragmate, in duas partes aequales scinditur, dextraque earum cordi infigitur, indeque ad jugulum sui lateris adscendit; sinistra vero inter cor & jugulum azygam venam producit, quae arteriam magnam comitem sibi adjungens, juxta sinistrum vertebrarum latus deorsum fertur, ramisque hinc inde distributis, venae sine pari officio fungitur. De vena sine pari, antigrammate xii.

Xx

a Au-

- a Auricula dextra, b hac parte à corde recifa.
 c Vena cava inferior.
 d: e *Duae partes aequales, in quas vena cava, superato diaphragmate, scinditur:*
 d dextra, & e sinistra.
 f Venae azygae radix.

FIGURA DUODECIMA.

- a Vena cava superior juxta cor recifa.
 b: b Venae subclaviae.
 c Radix venae f tabulae xxv. n°. 11.
 d: d Radices venarum jugularium internarum.
 e: e Radices venarum jugularium externarum.
 f: f Radices venarum axillarum.
 g Arteria aorta juxta cor recifa.
 h Radix communis arteriae subclaviae dextrae & carotidis dextrae.
 i: i Radices arteriarum carotidum.
 k: k Radices arteriarum subclaviarum.
 l: l Venae mammae, quae cum venis epigastricis conjunguntur. Dextra dividitur in duas, unius arteriae comites, quam mediam continent.
 m: m Arteriae mammae, comites venarum, cumque arteriis epigastricis conjunctae.
 n, o, p, q, r, s: n, o, p, q, r, s Venarum mammariarum rami, cum comitibus ramis arteriarum. Conjunguntur cum intercostalibus: n: n cum primis, o: o cum secundis. Ramos emittunt, per spatia intercostalia ad pectus penetrantes: quorum hic radices exhibitae.
Caeterum ubi alii intercostales rami, qui venae azygae germina sunt, & a quibus memorati pullant, juxta sternum perducti sunt, tunc venae utriusque propagines, hinc inde sub eo recta deorsum procedentes, singulis illorum occurrunt, & cum eis ita coeunt, ut quisque eorum unius venae, a duplici principio originem ducentis, intuentibus speciem referat; & praeterea non longe a pectoris osse, perforatis ejus loci musculis, alios insignes, aut certe non obscuros ramos, a singulis spatiis intercartilaginibus, ac etiam sub sterno a musculis rectis abdominis emittunt, qui sub cutem distributi, cum nonnullis aliis a magno axillaris venae exteriori germine pullulantibus, variis modis commiscuntur, atque uniuntur. De vena sine pari, antigrammate xviii.
 t, u: t, u Venae intercostales ab utroque latere superiores duae: t: t primae, u: u secundae.

Illud venarum jugum, quod ex posteriori sede utriusque trunci venae caevae in jugulo, juxta initia venarum jugularium, oritur, & sub arteria brachii reflectitur, in geminos ramos plerumque dividitur, qui in duo superiora costarum intervalla distributi cum ramis intercartilaginibus venae sterni junguntur. De vena sine pari, antigrammate xv.

- v, w: v, w Arteriae intercostales ab utroque latere superiores duae: v: v primae, w: w secundae. Comites venarum t, u: t, u.
 x: x Venae iliacae tum supra tum infra epigastricas recifae.
 y: y Arteriae iliacae tum supra tum infra epigastricas recifae.
 z: z Venae epigastricae, quae cum mammariis conjunguntur, ramisque pertinent ad rectos abdominis, &c. Dextrae majores rami bifidi sunt, ut mamma bifida, cum qua conjuncti.

a: a

- α : α Arteriae epigastricae, comites venarum $z:z$, conjunctaeque cum arteriis mammariis.
 β Ramorum majorum venae epigastricae sinistrae conjunctio, ibi ubi cum mammae ramis conjuncti.
 γ : γ Radices venarum saphaenarum.

FIGURA DECIMA TERTIA.

Aspera arteria, venaeque atque arteriae pulmonares, ut per pulmones pertinent. Exhibitae à parte priore.

a Aspera arteria, juxta laryngem recisa.

b: b Bronchi, qui

c, c, & c. Ramis suis per pulmones pertinent.

d Arteria pulmonaris juxta cor recisa. Ut figura v. tabulae xv. H.

e: e rami duo, in quos arteria pulmonaris dividitur. Ut figura v. tabulae xv. K: L.

f, f, & c. Arteriae pulmonaris rami per pulmones pertinentes.

g Sinus venarum pulmonarium, juxta cor recisus. Ut figura v. tabulae xv. M.


h, i, k, l Venae pulmonares quatuor, à sinu illo emissae, ut figura v. tabulae xv. O, P, Q, R; ramisque suis per pulmones pertinentes.

FIGURA DECIMA QUARTA.


Difficile mentem Eustachii assequi.

FIGURA DECIMA QUINTA.

Pedis venas & arterias exhibere videtur.



TAB.



T A B U L A XXVIII.

Exhibet musculos post-integumenta toti corpori communia. Detracti autem latissimi colli.

a: a Frontales. α Eorum conjunctio. β Pars per dorsum nasi excurrent.

b b Temporalis.

c Attollens auriculam.

d Zygoma.

e: e Orbiculares palpebrarum. α Pars, quam orbicularis hic à zygomatico minore accipit. Vide L- β figurae 1. tabulae xli.

f Compressor naris. Quem, ut videtur, in unum conjunxit cum depresso alae. Vide F figurae 111. tabulae xli.

g Levator labii superioris alaeque nasi.

h: h Levatores labii superioris.

i: i Levatores angulorum oris.

k Zygomaticus major. α Origo ejus ab osse jugali.

l Malleus.

m Maxilla inferior.

n: n Depressores angulorum oris.

o Aut depressores labii inferioris, aut tantummodo locus eorum.

p p Biventer maxillae inferioris.

q Os hyoides.

r Stylohyoideus.

s Larynx cum pharynge, obscure.

Videbatur primum hyothyreoideus esse hoc posse. Et certe quod ejus est infra os hyoides, insertionemque coracohyoidei, speciem musculi illius hyothyreoidei praebet: & confirmare etiam posset tabulae xxxiii. S. Sed quandoquidem inde etiam usque ad biventrem maxillae pertinet; ubi cornu ossis hyoidis & hyoglossus deberent sequi; potius, quod laryngis & pharyngis cum partibus ad ea pertinentibus, inter quas etiam hyothyreoideus est, ibi loci est situm, una rudi nec distincta figura expressisse visus est.

t: t Recti capitis interni majores: aut loci eorum. Confer t tabulae xxxii, & T tabulae xxxiii.

uu: uu Coracohyoidei.

w: w Sternohyoidei.

x Sternothyreoidei.

y: y Sternomastoidei.

z: z Cleidomastoidei.

A: A Scaleni medii.

B Levator scapulae.

C: C Cucullares.

D: D Claviculae.

E: E Deltoides.

F: F Pectorales.

G: G Serrati magni.

H: H Latissimi dorsi.

IK: IK Obliqui externi abdominis. I: I Partes carnae. K: K Aponeuroses.

Pro recto abdominis indicat Boerhavius, in institutionum §. lxxxvi. b.

ry

Est

Est aponeurosis obliqui externi; sub qua, si velis, rectus, sed perobscure, ut ejus speciem quandam referat.

L: M Umbilicus.

M: M Offa ilium.

N: N Funiculi vasorum spermaticorum, una cum cremasteribus penetrantes per annulos obliquorum externorum.

O: O Cremasteres.

P: P Pectinei.

Q: Q Psoae magni.

Esse psoas magnos, ex tabulae xxxiii. Θ, & xxxviii. rs-a facile cognosces. Quorum tendinibus iliaci interni adjunguntur quidem, ut exhibui in musculorum hominis tabula iii. s v in femore, & in tabula iv. yx; non ita tamen, quin tendines illi ad psoas potius, quam iliacos referendi sint. Lancisius autem *iliacorum internarum tendines* esse tradit.

R: R Tenfores vaginarum femorum.

S: S Glutei medii.

Hoc, quod Lancisius *principium fasciae latae* esse tradit, est gluteus medius: de quo confer musculorum hominis tabulae .i. K. in femore. Nisi velit gluteum illum hic tectum aponeurosi sua, eamque fasciae latae accenseat.

T: T Vasti externi.

V: V Recti crurum.

W: W Vasti interni.

X: X Sartorii.

Y: Y Adductores longi femorum.

Z: Z Z Graciles.

Γ: Γ Semitendinosi.

Δ: Δ Gemelli.

Θ: Θ Plantaris.

Λ: Λ Solci.

Ξ: Ξ Flexor longus digitorum pedis.

Incuria factum esse puto, ut *digitorum extensor longus* apud Lancisium hic vocatus sit: quamvis bis vocatus sit in hujus tabulae explicatione; hic, ubi designat numeris 77. 23; & ubi scribit de ligamento, *quo sub malleolo interno vinciantur tendines musculorum extensoris longi digitorum, tibiaei postici*, & *flexoris pollicis*. Ignorare autem non potuit, *extensorem longum* non esse; eoque minus, quod in hac ipsa explicatione, paulo ante, quam meminit *ligamenti illius, quo sub malleolo interno vinciantur tendines musculorum extensoris longi digitorum, tibiaei postici*, & *flexoris pollicis*; paulo, inquam, ante recte indicat *extensorem illum longum*, quum tradit, *Eustachium ostendisse solitum ligamentum in tarso (7), colligans tendines musculorum extendentium digitos pedis*.

Π Π Flexor longus pollicis pedis.

Σ Ligamentum, quo retinentur tendines, flexoris longi digitorum pedis, flexoris longi pollicis pedis, tibialis postici.

Φ Φ Tibialis posticus.

Ψ: Ψ Tibiarum ossa.

Ω Ω: Ω Ω Tibiales antici.

1 1, 1, 1, 1: 1, 1, 1 Extensores longi digitorum pedum.

2 Peroneus longus.

Hic

Hic peroneus longus à brevi non distinctus. Confer tabulæ xxxiii. 7, 8; & musculorum hominis tabulæ i. o g, s in crure.

3 Soleus.

4:4:4 Extensores proprii pollicum pedum.

5 5 Peroneus tertius.

6:6 Malleoli interni.

7:7 Ligamenta, quibus retinentur tendines in confinio crurum & pedum extremorum, à priori parte.

8:8 Abductores pollicum pedum.

9:9 An aponeuroses, quæ à tendinibus extensorum propriorum pollicum pedum pertinent ad ossa prima pollicum, ligamentaque, quibus articuli eorum cum metatarso continentur? An potius indicare voluit aponeuroses, quæ tendinibus illis adjungerentur, emissæ aut à flexoribus brevibus pollicum pedum, aut ab adductoribus eorum, aut à transversis pedum?

De his sequentibusque aponeurosisibus & tendinibus videri possunt, quæ scripsi in historia musculorum: conferri quoque, quæ in tabulis musculorum hominis exhibui.

10:10 Aponeuroses, quæ interno lateri tendinum extensorum longorum digitorum pedum, ad digitorum parvorum primos pertinentium, adjunguntur. Eas invenio oriri partim à ligamentis articulos digitorum illorum cum suis metatarsi ossibus continentibus, partim ab interossei primis digitorum eorundem, partim à lumbricalibus eorundem, partim à latere primi ordinis ossium eorundem illorum digitorum.

11:11 Aponeuroses similes, quæ adjunguntur lateri externo tendinum extendentium digitorum parvorum primorum. Eas oriri invenio partim à ligamentis articulos digitorum illorum cum suis metatarsi ossibus continentibus, partim ab eorundem digitorum interossei secundis, partim ab eorundem digitorum ossium primi ordinis latere. Adjunguntur autem illi tendinum extendentium parti, quæ est ab extensore brevi digitorum pedis.

12:12 Tendines communes, qui fiunt è conjunctis inter se extensorum longorum & brevium tendinibus.

13:13 Aponeuroses similes illis, ad quas 10:10 apposui; similiter orientes à ligamentis articulorum, interossei primis, lumbricalibus, primique ordinis ossibus digitorum parvorum secundorum.

14:14 Aponeuroses similes illis, ad quas 11:11 apposui; similiter orientes à ligamentis articulorum, interossei secundis, primique ordinis ossibus digitorum parvorum secundorum.

15:15 Tendines communes, ut ad quos 12:12 apposui.

16 Aponeurosis similis illi, ad quam 10 apposui; similiter oriens à ligamento articuli, interosseo primo, lumbricali, primique ordinis osse digiti tertii parvorum.

17 Aponeurosis similis illi, ad quam 11 apposui, similiter oriens à ligamento articuli, interosseo secundo, primique ordinis osse digiti tertii parvorum.

18 Tendo communis, ut ad quem 12 apposui.


19 Aponeurosis similis illi, ad quam 10 apposui; similiter oriens à ligamento articuli, interosseo primo, lumbricali, primique ordinis osse digiti quarti parvorum.

20 Aponeurosis, quæ adjungitur extensoris longi digitorum pedis tendini, qui pertinet ad digitum minimum. Oriri eam invenio ab abductore digiti minimi pedis.

- 21 Latus tendo per dorsum digiti minimi ductus, à solo extensoris longi digitorum pedis tendine.
- 22 Tricipitis brachii caput, quod longus appellatur.
- 23 Tricipitis brachii caput, quod vocatur brachialis externus.
- 24:24 Bicipites brachiorum.
- 25 25:25 Brachiales interni.
- 26 Tricipitis brachii caput, quod brevis appellatur.
- 27 Condylus humeri prior, idemque minor.
- 28 Tendinis tricipitis brachii mucro tenuior, olecrani parti priori, & spinæ, quæ infra eam ex ulna eminet, inserta.
- Apparet, si conferatur tabula xxix, & xxxi, & xxxvi. MN-ε. *Anconæus* autem, quem Lancisius hoc esse indicat, exhibitus tabula xxxvii. G.
- 29:29 Radiales externi longiores.
- 30:30 Supinatores longi.
- 31 Pronator teres.
- 32 Radialis internus.
- 33 Palmaris longus.
- 34:34 Ulnares interni.
- 35, 36 Abductoris longi pollicis manus tendines.
- 37 Flexor longus pollicis manus.
- 38 Ligamentum quoddam, distinctum ab eo, quod armillam refert. Ab una parte adhaeret tendini ulnaris interni; ab altera radio, multangulo majori, &c. partimque etiam conjunctum cum interiore armillam referente. Per partem ejus penetrat tendo palmaris longi.
- Lancisius hoc *ligamentum* esse indicavit *annulare carpi*: quam recte, non disquiram. Hoc tamen non praetermittendum esse duxi, ut monerem, non esse notissimum illud ligamentum carpi interius, quod exhibitum tabula xxxii. 48, & tabula xxxiii. 70: à quo quantum differat, facile, si comparare velis, cognosces.
- 39 Palmaris brevis.
- 40 Aponeurosis palmaris longi, per volam explicata.
- 41 Flexoris brevis pollicis manus pars, quæ pro abductore ejus brevi altero haberi potest. Vide musculorum hominis tabulae xi. u in manu dextra.
- Esse eundem muscolum, cui 44 inscripti tabula xxxii, ex comparatione factis, puto, cognoscitur. Quare in Lancisii explicatione pro hoc, quod exstat, *tendo pollicis adductor*, fortasse reponendum, *musculus pollicis adductor*, aut *pollicis adductor*, ut appellat eum in explicatione tabulae xxx, ubi 15 inscripti.
- 42 Tendo flexoris longi pollicis manus.
- 43, 43, 43, 43 Tendines sublimis.
- 44 Tendines profundi.
- 45 45 Extensor communis digitorum manus.
- 46 46 Ulnaris externus.
- 47 Abductoris longi pollicis manus pars superior.
- 48 Abductoris longi pollicis manus pars inferior.
- 49 Extensor minor pollicis manus.
- 50 50 50 Tendo radialis externi longioris.
- 51 51 Tendo radialis externi brevioris.
- 52 52 Extensor major pollicis manus.
- 53 53 Extensor proprius auricularis.
- 54 Ligamentum, quo tendines obducti in confinio cubiti & dorso manus.

- 55 Tendo extensoris minoris pollicis manus.
- 56 Aponeurosis adjuncta tendini extensoris majoris pollicis manus. Eam invenio partim oriri à ligamento articulum pollicis cum metacarpo suo continente, partim à flexore pollicis brevi. Vide 40 tabulae xxix.
- 57 Communis tendo extensoris pollicis majoris & minoris.
- 58 Tendo indicatoris.
- Hic haud dubie error admissus in scalptura. Nam videtur tendo extensoris communis ad indicem pertinens fissus esse: quum tamen alter sit tendo ille, nempe 45: alter autem indicatoris, nempe 58: quod voluisse, satis declarat tabula xxix, & xxxi.
- 59 Lati tendines extensorum, per dorsum digitorum pertinentes. De aponeurosis, quae principio eorum adjunguntur, vide tabulam xxxiv.





TABULA XXIX.

Hujus pars dimidia, eaque sinistra, exhibet musculos post tegumenta
toti corpori communia positos: dextra, detractis aliquot primis, sequentes.

A: A Occipitales.

B Temporalis.

C Zygoma.

D Masseter.

E Maxilla inferior.

F Pterygoideus internus.

G Processus mammillaris ossis temporis.

H: H Complexi.

I: I Splenii capitis.

K Cleidomastoideus, α affixus mucroni processus mammillaris.

L Levator scapulae.

M Serratus posticus superior.

N Rhomboideus minor.

O: O Rhomboidei majores.

P Cucullaris.

Q Sacrolumbalis cum longissimo dorsi.

R: R Latissimi dorsi.

S, S, S, S Spinae vertebrarum.

T: T Cristae ossium ilium.

V: V Obliqui interni abdominis.

W: W Obliqui externi abdominis.

X Gluteus magnus.

Y Gluteus medius.

b Coccygeus.

c Sphincter ani externus.

d: d Levatores ani.

e Locus ischii & foraminis magni ossis coxae.

f Ligamentum, quod à tubere ischii pertinet ad os sacrum.

g Pyriformis.

h Geminorum superior.

i Obturator internus.

k Geminorum inferior.

l Quadratus femoris.

m Trochanter major.

n n: n Adductores magni femorum.

o Gracilis.

pp: pp Semimembranosi.

q: q Semitendinosi.

Numeri 55. 31, quibus apud Lancisium *semimembranosus* designatus,
designant musculus q, qui semitendinosus est: confer musculorum homi-
nis tabulae v. π in dextro femore, & tabulae vi. α . Fortasse in numeris
vitium, voluitque proximum p, qui est semimembranosus: confer muscu-
lorum hominis tabulae v. γ in dextro femore, & tabulae vi. ϕ .

Z z 2

r r

r: r Bicipitum crurum capita longiora.

Numeri 55. 21, quibus *vastus externus* apud Lancisium designatus, designant caput longum bicipitis cruris sinistri r: de quo capite confer musculorum hominis tabulae v. 6 in femore sinistro, & tabulae vi. 8. Et vastus ille in hoc femore conspicuus non est, utpote sub vagina u.

s Spina ossis femoris.

t Vastus externus.

u Vaginae femoris pars crassior, una cum tenore vaginae.

w Bicipitis cruris caput brevius.

x: y y y Offa femorum.

Si modo ossa exhibere hic voluit. Utcunque sit, certe loci sunt ossium illorum.

z: z Fibularum capita superiora.

Γ Plantaris.

Δ Popliteus.

Θ Λ Ξ Gemellus cruris. Θ Pars interior, Λ exterior. Ξ Tendo: qui in dextro crure truncatus, & ex parte reflexus.

Π: Π Π Solci.

Σ: Σ Peronei longi.

Φ Extensor longus digitorum pedis.

Ψ: Ψ Peronei tertii.

Ω Ω: Ω Ω Peronei breves.

1: 1 Flexores longi pollicum pedum.

2: 2 Tendines achillis.

3: 3 Abductores digitorum minimorum pedum.

4 Malleolus internus.

5 Flexor longus digitorum pedis.

6 Deltoides.

7 Clavicula.

8 Supraspinatus.

9 10 Spina scapulae cum processu superiore. 10 Epiphysis processus superioris.

11 Epiphysis superior ossis humeri.

12: 12 Infraspinati.

13: 13 Teretes minores.

14 Os humeri.

15: 15 Teretes majores.

16 17 18: 16 17 18 Tricipites brachiorum. 16 Longus. 17 Brevis. 18 Venter communis.

19 Brachialis internus.

20 Supinator longus.

21: 21 Condylus minores ossium humerorum.

22: 22 Olecrana.

Inter 21, 22, 30, 32 Quum non videatur aliud quid hoc spatio significare voluisse, nisi intervallum inter musculos, idcirco notam nullam apposui. In hoc autem spatio locus & sedes est supinatoris brevis.

23 Palmaris longus.

24 Condylus major ossis humeri.

25: 25 Ulnares interni.

26 Ulnaris externus.

- 27 Extensor proprius digiti auricularis.
 28 Extensor communis digitorum manus.
 29 29 29 Radialis externus.
 30 30 30 Radialis externus brevior.
 31 31 Radialis externus longior.
 32 33 34: 33 34 Abductores longi pollicum manuum. 33 Pars superior,
 34 inferior.
 35: 35 Extensores minores pollicum manuum.
 36: 36 Extensores majores pollicum manuum.
 37: 37 Indicatores.
 38: 38 Ulnae.
 39: 39 Tendines extensorum minorum pollicum manuum.
 40: 40 Aponeuroses tendinibus extensorum majorum pollicum manuum ad-
 junctae, orientesque partim à ligamentis articulos pollicum cum suis me-
 tacarpi ossibus continentibus, partim à flexoribus brevibus pollicum.
 Nisi modo una cum illa aponeurosi etiam extrema adductoris & flexoris
 brevis pollicis indicare voluit, in manu praefertim sinistra. Vide annota-
 tionem ad 6 tabulae xxxi: & confer musculorum hominis tabulae v. 27,
 28, 29, 30 in manu dextra.
 41: 41 Communes tendines pollicum extensorum majorum & minorum.
 42 Abductor indicis.
 43 Truncatus tendo, qui ab extensore communi digitorum manus pertinet
 ad indicem, & cum tendine indicatoris conjungitur.
 44: 44, 45, 46, 47 Lati tendines extensorum, per dorsum digitorum ducti.
 De adjunctis iis aponeurosibus tendinibusque vide tabulam xxxiv.



TAB. XXX.



T A B U L A XXX.

Musculos post integumenta totī corpori communia exhibet.

a: a Frontales. b Eorum conjunctio. c Eorundem pars, quae per dorsum nasi ducitur.

d d: d d Orbiculares palpebrarum. e Pars, quam orbicularis hic à zygomatico minore accipit. Vide L-β figurae 1. tabulae xlii.

f: f Zygomatici majores.

g: g Levatores angulorum oris.

h: h Levatores labii superioris.

i Levator labii superioris alaeque nasi.

k Compressor naris. Quem videtur in unum conjunxisse cum depresso alae. Vide F figurae 111. tabulae xlii.

l Orbicularis oris.

m Aut depressores labii inferioris, aut tantummodo locus eorum.

n: n Depressores angulorum oris.

o Temporalis.

p Attolens auriculam.

q Zygoma.

r Masseter.

s Sternomastoideus.

t: t Cucullares.

u: u Latissimi colli. w w: w w Eorum principium. x Extremi pars ad maxillam inferiorem desinens. y Pars ad buccam pertinens. z: z Hic sternomastoidei una cum cleidomastoideis prominent, testī latissimis colli. Æ Hac parte latissimus super malam ducitur. A: A Claviculae prominentes, testaeque latissimis colli.

B: B Pectorales.

C Serratus anticus, hac parte nudus à pectorali, ob sublatum brachium.

D Serratus magnus.

E Latissimus dorsi.

F: F Obliqui externi abdominis.

Hunc, ut tabula xxviii, pro *recto* abdominis indicat Boerhavius in institutionum §. lxxxvi. b. Non aliter autem hic, atque ille, dici *rectus* abdominis potest.

G Umbilicus.

H Crista ossis ilium.

I Gluteus magnus.

K Aponeurosis gluteum medium tegens.

L Locus trochanteris majoris.

M: M Tenfores vaginalum femorum. N Extremum tenfores, quo vaginae femoris implicatur.

O: O O Sartorii.

P Pubis locus.

Q Penis.

R: R R Recti crurum.

S Vaginae femoris crassior pars, tegens vastum externum.

T: T Bicipites crurum.

A a a 2

V: V

V:V Semitendinosi.

Musculi, quos designant numeri 66. 28, & 64. 20, quibus *graciles* designati apud Lancisium, sunt *seminervosi*. Gracilis autem in sinistro tantum femore conspicuus, ubi Y inscripti: in dextro enim cerni ab hac parte nequit.

W Semimembranosus.

Musculus, quem numeri 64. 21. designant, quibus apud Lancisium *seminervosus* designatus, semimembranosus est. Seminervosus autem est proximus, cui V inscripti.

X Adductor magnus femoris.

Y Gracilis.

Qui gracilis vocatur, is musculus ille est, quem designant numeri 66. 21, quibus *semimembranosus* apud Lancisium designatus. Semimembranosus est proximus, cui W inscripti.

Z:Z Vasti interni.

α Caput superius fibulae.

β:β Gemelli.

Hi numeri 84. 30, quibus *peronaeus anticus* apud Lancisium designatur, haud dubie (ut fortasse hic etiam alii) mendosi sunt: designant enim gemellum, quem pro *peronaeo antico* habuisse putari non potest, qui est, cui ε inscripti.

γ:γ Tendines achillis.

δ:δ Solci.

εεε Peroneus longus.

ζζζ Peroneus brevis.

ηη Peroneus tertius.

θθ:θ Extensores longi digitorum pedum.

ιιι Tibiales antici.

κκ:κ Extensores longi pollicum pedum.

λ:λ Ligamenta, quibus tendines in priori parte confinii crurum & pedum obducti.

μ Malleolus externus.

ν, ξ Ligamenta, quibus tendines peroneorum, longi & brevis, juxta malleolum externum obducti.

ο Abductor digiti minimi pedis.

π Malleolus internus.

ε Ligamentum, quo retinentur tendines flexoris longi digitorum pedis, flexoris longi pollicis pedis, tibialis postici.

σσ Tibialis posticus.

ττ Flexor longus digitorum pedis.

Numeri hi 80. 11. designant flexorem longum digitorum pedis. *Tibialis* autem *posticus*, qui numeris illis apud Lancisium designatur, est, cui σ inscripti. Confer musculorum hominis tabulam 1x.

υυ Flexor longus pollicis pedis.

Numeri hi 84. 6, quibus *flexor magnus digitorum* designatus apud Lancisium, si regulae *principium in primo tabulae latere, ac supra illam altitudinis lineam, quae figuram immediate respicit, adamussim apponas*, quod faciendum *semper* esse Soldatus monet, designant ligamentum ε, circa flexorem pollicis longum, ut conjicere quis posset, eam designari. Si vero *regulae finem exteriori margini lateris secundi adamussim apponas*, designant fere *flexorem magnum digitorum τ*.

φ Ab-

φ Abductor pollicis pedis.

χ Teres major.

ψ Coracobrachialis.

ω:ω Deltoidei.

Γ:Γ Bicipites brachiorum.

Δ:Δ Tricipitum brachiorum partes, quae longi vocantur.

Illud, quod numeri hi 21. 13. designant, quibus *brevis* designatus apud

Lancisium, est omnino longi pars.

Θ:Θ Tricipitum brachiorum partes, quae brachiales externi vocantur.

ΛΛ:Λ Brachiales interni.

Ξ Extremum tricipitis brachii.

Π Condylus ossis humeri posterior, seu major.

Σ:Σ Pronatores teretes.

Φ Palmaris longus.

Ψ:Ψ Ulnares interni.

Ω:Ω Radiales interni.

Sinister, quem designant numeri 38. 46, est omnino radialis internus.

Flexor autem pollicis, qui iis apud Lancisium designatur, in hoc brachio est, cui 6 inscripti.

1:1 Supinatores longi.

2 Radialis externus longior.

3 Sublimis.

Hic certe sublimis est, non *palmaris*, quod Lancisius vult, designans numeris his, 10. 10. Scilicet palmaris, longi puta, venter una cum tendine aliquibus non datus: quod exhibere hic videtur. Vide super hac re historiae musculorum libri III. caput CLXIV. Quamvis tamen ex icone suspicio trahi quaedam possit, portionem à sublimi abscedentem, subire primum ligamentum 7, dein penetrare per illud, & in aponeurosem volae 12 expandi.

4:4 Tendines portionum superiorum abductorum longorum pollicum manuum.

5 Tendo portionis inferioris abductoris longi pollicis manus.

6:6 Flexores longi pollicum manuum.

7:7 Vide 38 tabulae XXVIII.

Lancisius esse dicit *ligamentum carpi*. Vide annotationem ad 38 tabulae XXVIII.

8 Profundus.

9:9 Ulnae.

Fortasse tantummodo locus est ulnae, aut adumbratio quaedam partis illius, quae mox supra manum est.

10:10 Palmares breves.

11:11 Abductores digitorum minimorum manuum.

12 Aponeurosis volae, quae in sinistra manu à palmari longo expanditur, in dextra, ubi palmaris ille nullus, à ligamento, cui 7 inscriptum. 13 Aponeurosis illius portio, quam adjungi invenio principio abductoris brevis pollicis, Vide annotationem ad 3.

14:14 Adductores pollicum manuum, una cum flexoribus brevibus.

15:15 Partes flexorum brevium pollicum manuum.

16:16 Abductores breves pollicum manuum.

17 Tendo extensoris minoris pollicis manus.


18:18 Tendines flexorum longorum pollicum manuum.

19, 19, 19, 19: 19, 19, 19, 19 Tendines sublimium.

20, 20, 20, 20: 20, 20, 20, 20 Tendines profundorum.


Bb b

T A



TAB.

XXXI.



T A B U L A XXXI.

Musculos post tegumenta totī corpori communia exhibet.

A: A Occipitales.

B Attollens auriculam.

C: C Temporales.

D Frontalis.

Æ Orbicularis palpebrarum.

E Retrahens auriculæ.

F Zygoma.

G Masseter.

H: H Sternomastoidei.

I: I Splenii capitis.

K: K Complexi.

L: L Levatores scapularum.

M: M Cucullares.

N: N Infraspinati.

O: O Teretes minores.

P: P Teretes majores.

Q: Q Rhomboidei majores.

R R R Spinae vertebrarum.

S: S Latissimi dorsi.

T, T, T Latissimi dorsi capitā, quæ à costis oriuntur.

V Serratus magnus.

W Obliquus externus abdominis.

X: X Glutei magni.

Y Tensor vaginae femoris.

Z Pars insignior vaginae tendineae femoris.

a Bicipitis cruris caput breve.

b In sinistro femore, bicipitis cruris caput longum. In dextro, biceps cruris.

c: c Semitendinosi.

dd: dd Semimembranosi.

e Adductor magnus femoris.

f: f Graciles.

g: g Sartorii.

h Vastus internus.

ikl: ikl Gemelli.

mm: m Solei.

nnn Peroneus longus.

ooo Peroneus brevis.

p: pp Flexores longi pollicum pedum.

qq Peroneus tertius.


rrr: r Extensores longi digitorum pedum.

s: s Ligamenta, quibus tendines à priori parte pedum, in confinio cruris & pedis extremi, obducti.

t Malleolus externus.


Bb b z

u, w Li



TAB.

XXXII.



TABULA XXXII.

In sinistro latere exhibitum musculus post integumenta toti corpori communia positi, detracto latissimo colli, detractis quoque aliquot ligamentis, quibus tendines retinentur. In dextro praeterea musculi aliquot prius detracti.

a: a Frontales. α Eorum conjunctio. β Pars per dorsum nasi ducta.
bb: bb. Orbiculares palpebrarum. α Portio, quam accipit à zygomatico minore. Vide L-β figurae 1. tabulae xli.

c Compressor naris. Quem cum depresso alae in unum conjunxit, ut videtur. Vide F figurae 111. tabulae xli.

d Levator labii superioris alaeque nasi.

e: e Levatores labii superioris.

f: f Levatores angulorum oris.

g: g Zygomatici majores.

h Quaedam orbicularis oris nota.

i Aut depressores labii inferioris, aut tantummodo locus eorum.

k: k Depressores angulorum oris.

ll Temporalis.

m Attollens auriculam.

n Occipitalis.

o Retrahens auriculam.

p Zygoma.

q Masseter.

rr: r Biventre maxillae.

s sinistra, stylohyoideus. Cui respondens s in dextro latere stylohyoideus quoque esse videtur.

t Rectus internus major capitis.

u Aut hyothyreoideus, aut larynx cum pharynge, obscurum.

Confer annotationem ad s tabulae xxviii.

ww: ww Coracohyoidei.

x: x Sternohyoidei.

y: y Sternothyroidei.

z Sternomastoideus.

A: A Cleidomastoidei.

B: Scalenus prior: si modo hoc aliquid significet.

C: C Scaleni medii.

Comparatio cum scaleno medio Y sinistro tabulae xxxiii. satis indicare videtur. Lancisio autem scapulae elevator proprius.

D Levator scapulae: si significare aliquid eo voluerit.

E: E Cucullares.

F: F Claviculae.

G Subclavius.

H Sternum.

I Serratus anticus.

K Pectoralis.

L: L Latissimi dorsi.

M: MM Serrati magni.

Cc c

N In-

N Intercoſtalis externus primus.

O, O, &c. Coſtae.

P, P, &c. Intercoſtales interni.

Q Rectus abdominis.

R Obliquus internus abdominis. α Pars ejus carnea. β Aponeuroſis. γ Lo-

cus, ubi funiculus ſpermaticorum vaſorum cum cremaltère penetrat.
Quum rectum. hic indicet Boerhavius in Inſtitutionibus §. LXXXVI. b.
Eſt. T. 31. 45. 28, nequeo quin moneam, dextri partem tantummodo
 ſuperiorem nudam eſſe, Q: de caetero dextrum illum ſub aponeuroſi
 obliqui interni R- β , ſiniſtrum ſub obliqui externi aponeuroſi T- β , latere;
 easque attollendo, ſi velis, eminere, atque ea ratione dici rectos poſſe.

S Umbilicus.

T Obliquus externus abdominis. α Pars ejus carnea. β Aponeuroſis. γ Lo-

cus, ubi funiculus vaſorum ſpermaticorum cum cremaltère penetrat.

Vide annotationem ad R.

V: V Criſtae offium ilium.

W: W Glutei medii.

X Tenſor vaginae femoris.

Y Trochanter major.

Z: Z Pſoae magni.

F: F Cremaltères.

Quas carneas peritonaei productiones Lanciſius eſſe dicit, cremaltères eſſe
 apparet.

Δ : Δ Peſtinci.

Θ : Θ Adductores longi femorum.

Λ Adductor magnus femoris.

Ξ Gracilis.

Π Semitendinoſus.

Σ Sartorius.

Φ : Φ Vaſti interni.

Ψ : Ψ Recti crurum.

Ω : Ω Vaſti externi.

1: 1 Gemelli.

2: 2 Solei.

3: 3 Tibiae.

4 Tibialis anticus.

5: 5 Extenſores longi digitorum pedum.

De latis tendinibus per dorſum digitorum ductis, aponeuroſibusque, quae
 iis adjunguntur, vide tabulam xxviii.

6: 6 Fibula, ant ejus locus.

7 Soleus.

8 Peroneus brevis.

9 Peroneus tertius.

10: 10 Extenſores proprii pollicum pedum.

De aponeuroſi, quae tendini eorum adjungitur, vide tabulam xxviii.

11 Flexor longus digitorum pedis.

12 Tibialis poſticus.

13 Flexor longus pollicis pedis.

14 Tendo achillis.


15 Abductor pollicis pedis.

- 16, 17 Ligamenta duo, quae à processu coracoideo ad scapulae processum
superiorem pertinent.
 18 Processus coracoideus.
 19 19 Os humeri.
 20 Commune principium partis brevioris bicipitis brachii & coracobrachialis.
 21 Coracobrachialis.
 22 Deltoïdes.
 23 24 25: 23 24 25 Bicipites brachiorum. 23 Pars longior. 24 Brevior.
 26: 26 Tricipitum brachiorum partes, quae vocantur longi.
 27: 27 Tricipitum brachiorum partes, quae vocantur brachiales externi.
 28 28: 28 28 Brachiales interni.
 29: 29 Pronatores teretes.
 30: 30 Supinatores longi.
 31: 31 Radiales externi longiores.
 32 Radialis internus.
 33 Palmaris longus.
 34 Ulnaris internus.
 35 Sublimis.
 36 Profundus.
 37 Flexor longus pollicis manus.
 38, 39 Tendines abductoris longi pollicis manus.
 40 Tendo extensoris minoris pollicis manus.
 41 Abductor longus pollicis manus.
 42: 42 Tendines flexorum longorum pollicum manuum.
 43: 43 Abductores breves pollicum manuum.
 Confer musculorum hominis tabulae 1, Y in manu dextra.
 44: 44 Partes flexorum brevium pollicum manuum. Vide 41 tabulae xxviii.
 45 Adductor pollicis manus, una cum flexore brevi.
 46 Abductor indicis, obscure.
 47 Aponeurosis palmaris longi in vola.
 De portione, quae abductor pollicis brevi adjungitur, vide tabulae xxxv.
 Δ-θ.
 48 Ligamentum transversum carpi interius, sub quo tendines ad volam du-
cuntur.
 49: 49 Palmares breves.
 50: 50 Abductores digitorum minimorum manuum.
 51, 52, 53, 54 Lumbricales manus.
 55, 55, 55, 55: 55, 55, 55, 55 Tendines sublimium.
 56, 56, 56, 56: 56, 56, 56, 56 Tendines profundorum.



TAB.

XXXIII.



11111

T A B U L A XXXIII.

Musculos interiores exhibet.

A Temporalis. a Tendo.

B Zygoma.

C Masseter.

D Buccinator.

E Processus styloformis ossis temporis.

F Foramen introitus auris.

G Biventer maxillae.

H Mylohyoideus dexter.

I Geniohyoideus.

Numeri 9. 35, quibus *genioglossus* apud Lancisium designatus, designant geniohyoideum I. Proximus autem K *genioglossus* est.

K Genioglossus sinister.

L Basioglossus.

Numeri 9. 36, quibus *ceratoglossus* designatus apud Lancisium, designant confinia genioglossi K, & basioglossi L, sic ut, quem proprie basioglossum vocamus, designare videantur. Cui proximus N proprio nomine ceratoglossi appellari à multis solet.

M Styloglossus.

N Ceratoglossus.

O O Pharynx, ut videtur.

P Stylopharyngeus.

Q Os hyoides.

Vix dubitandum esse videtur, quin os hyoides sit, in totum rudiore modo indicatum, ut alias alia consuevit. Id tum ex anatome ipsa, tum comparatione facta cum figura v. VIII. XI. tabulae XII. cognoscitur: in cuius quinta etiam imperfecte exhibitum, cornubus à basi non distinctis. De qua re etiam Morgagnum invenio scripsisse haec: *nondum illud animadverti ligamentum quod in ipsa sede ossis hyoidis apud Eustachium tabula XXXIII. (10 ÷ 37.), scalptoris fortasse incuria, delineatum videri potest. Mihi certe & rem ipsam attendenti, & figuras aliquot tabulae XII. cum ea tabula comparanti magna potius suspicio est, in ea quoque os hyoides, sed cornu à basi minus accurate distincto, repraesentari potius, quam ligamentum, ut viris aliqui praestantissimis Lancisio & Valsalvae videbatur. Epistola anatomica XI. §. XI.*

R: S Hyothyroidei.

T Rectus internus major capitis.

V Splenius capitis.

Quum is, cui V inscripti, ad exteriorem processus mamillaris partem pertineat, splenius capitis videri fortasse potuit. Et quum proximus à posteriore splenii parte juxta caput sic complexus, videtur existimari potuisse, complexum esse, cui W inscripti. Adde quod, quum corpora ipsa cum hac figura contuli, illi potissimum esse, visi sunt. At potius fortasse alicui videbitur is, cui V inscripti, trachelomastoideus esse. Sive autem hoc malis, sive illud, non deerunt in figura difficultates. Certe qui ad hunc locum

D d d

cum

cum ex inferioribus partibus ducti pertinent, sunt à priori parte splenius capitis & trachelomastoideus; à posteriore complexus.

W Complexus.

Vide annotationem ad V.

X Levator scapulae.

Y:Y Scaleni medii.

Z:Z Coracohyoidei.

aa:a Scaleni priores.

b:bb Sternothyroidei.

Dexter est sternothyroideus, detracto ab hoc latere sternohyoideo. Et ex icone apparet, non esse *sternohyoideum*, ut Lancisio visum. Discrepat enim à sternohyoideo c, & principii latitudine, & loco unde venit, & figura, & fine ad anteriorem ossis hyoidis partem non pertinente. Responderet autem sternothyroideo sinistro bb, qui sternohyoideo c subjacet. Confer quoque figuram v. tabulae xli.

c Sternohyoideus.

d:d Claviculae.

e Sternothyroidei principium.

f Sternohyoidei principium.

g Sternum.

h, h, &c. Intercostales interni.

i, i, &c. Intercostalium internorum portiones, quae sunt ultra locum, ubi harum costarum cartilagines junctae inter se.

k, k, &c. Costae.

l, l, &c. Intercostales externi.

m Serratus magnus. $\alpha\beta$ Caput ejus, quod partim à costa prima α , partim à secunda β , oritur. $\gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, i$ Reliqua capita ejus, quae singula à singulis costis oriuntur: γ à secunda, δ à tertia, ϵ à quarta, ζ à quinta, η à sexta, θ à septima, i ab octava.

n Rectus abdominis. α, β, γ Ejus extrema tria, quae cartilaginibus costarum inserta: α septimae, β sextae, γ quintae. δ, ϵ, ζ Lineae tendineae recti carnem distinguentes.

Transversae lineae, seu circumscriptiones rectorum musculorum abdominis. Ossium examine.

o Linea alba.

p Umbilicus.

q:q Transversi abdominis. $\alpha\alpha$: α Partes eorum carnea, β : β his partibus orientes à cristis ilium. γ : γ Aponeuroses. δ Aponeurolis inserta cartilagini mucronatae. ϵ Haec pars, quae transversus esse videtur, proprie est triangularis sterni, qui hac parte tendinae suo cum transverso conjunctus, insertur ossi cartilaginis mucronatae, ipsique cartilagini.

Satis, puto, ex re ipsa apparet, aponeurolsem esse, cui γ inscripti: non autem *peritonaeum ab aliquot musculis denudatum*, ut Lancisius tradit.

r Recta lamella interna aponeurolis obliqui interni, quae hic cum aponeurolsi transversus conjungitur.

Sic videtur. Confer musculorum hominis tabulae xli. t et in abdomine.

s:s Cristae ossium ilium.

t:t Funiculi vasorum spermaticorum.

u Pyramidalis abdominis. α Origo ejus ex pube. β Extremum, quo lineae albae innectitur.

W:W

w: w Cremasteribus adjunctae portiones. Quas ab imo margine tendineo obliquoꝝ externorum abdominis orientes inveni.

x: x Cremasteres, α Principium longius & insignius, quod ab inferiore parte obliqui interni & transversi abdominis emitti invenio. β Extremum circa membranam vaginalem testis.

y: y Glutei minores. α Extremum trochanteri majori affixum.

Nequaquam *pars carnea membranosa*, ut Lancisio visum. Confer modo musculos R, R tabulae xxviii, & X tabulae xxxii, qui sunt *pars illa carnea membranosa*: & perpende quantum hic ab illis & figura, & longitudine, & positu differat. Contra autem, vide quomodo cum gluteo minore u tabulae xxxvi. conveniat exteriore circumferentia, & locis, ubi in circumferentia illa incipit, & desinit.

z: z Trochanteres majores.

Γ Os femoris.

Δ : Δ Iliaci interni.

Θ : Θ Psoae magni.

Λ : Λ Pectinei.

Ξ : Ξ Adductores longi femorum.

Horum Ξ , Π neque *origines*, neque *insertiones patent*. *Origines* enim delitescunt pone cremasterem cum funiculo spermatico, & teste: *insertiones*, pone os femoris. At fortasse per *origines* generatim Lancisius hic intellexit principia: per *insertiones*, extrema.

Π : Π Adductores magni femorum. α Extremum superius, idemque latius, femori per longitudinem insertum. β Extremum inferius: quod invenio ad condylum internum femoris pertinere, ut in musculorum hominis tabula viii. B D in femoribus.

Vide annotationem ad Ξ .

Σ Vastus internus.

Φ : Φ Crurales.

Ψ Vastus externus.

Ω Os femoris.

1: 1 Extremitas rectorum crurum tendines, truncati, & deorsum inflexi.

2 Vasti externi tendo extremus, truncatus, & deorsum inflexus.

3 Vasti interni tendo extremus, truncatus, & deorsum inflexus.

4: 4 Communes aponeuroses extensorum genu, α α : α α insertae tibiis.

5 Poplitei extremum, ut videtur. Confer tabulam xxxvi.

6 Caput superius fibulae.

7: 7 Peronei longi. α Origo à capite superiore fibulae, β β à fibula, per longitudinem ejus.

8: 8 Peronei breves. α α Origo à fibula.

9: 9 Fibulae.

10: 10 Tibiae.

11 Flexor longus digitorum pedis.

Confer L tabulae xxxvi.

12 Extensor proprius pollicis pedis. α α Origo à fibula. β Tendo.

13 Caput inferius fibulae.

14: 14: 14 Tali.

15: 15: 15 Ossa navicularia tarsorum.

16: 16: 16 Ossa cuneiformia magna.

17 Os cuneiforme minus.

- 18 Extensor brevis digitorum pedis. α Origo ejus. $\beta, \gamma, \delta, \epsilon$ Caudae quatuor: β ad pollicem pertinens, γ ad digitum minorum primum, δ ad secundum, ϵ ad tertium.
- 19 Peronei brevis tendo, insertus capiti primo ossis metatarsi digiti minimi.
- 20 Os metatarsi quintum, hoc est, digiti minimi.
- 21 Aponeurosis adjuncta tendini extensoris proprii pollicis pedis. Ubi invenio tendinem aponeurosem emittere, quae ambit os primum pollicis, ejusque articulum tum cum metatarso tum cum osse ultimo, atque immiscetur ligamenti, quae articulos illos continent. Vide 9 tabulae xxviii.
- 22 23 Tibialis postici tendo. 23 Extremum ejus, insertum ossi cuneiformi magno.
- Observanda* Lancisius proponit duo ligamenta, ad decussim posita, quibus natura inter se vinciat ossa tarsi: & designat numeris 85. 29, & 85. 30. Qui etsi hunc tibialis postici tendinem cum ligamento suo non designant, ea tamen designari, dubitari non videtur posse. Perspicuum autem accuratius attendenti esse puto, esse tendinem illum, cum ligamento suo. Confer musculorum hominis tabulae iv. $\phi \chi \psi$ in pede, & tabulae i. x, y in pede.
- 24 Ligamentum, quo tendo tibialis postici hic obductus, ab osse calcanei ad naviculare pertinens.
- 25 Calcaneus.
- 26:26 Processus coracoidei.
- 27 Ligamentum à processu coracoideo ad claviculam pertinens.
- 28, 29:28, 29 Ligamenta ab utroque latere duo, quae à processu coracoideo ad superiorem scapulae processum pertinent.
- 30:30 Scapularum processus superiores.
- 31:31 Communia principia capitum breviorum bicipitum brachiorum & coracobrachialium.
- 32:32 Capita breviora bicipitum brachiorum, truncata.
- 33:33 Subscapulares.
- 34:34 Teretes majores. In dextro umbra illa distinguente expressit fortasse vestigium à latissimo dorsi impressum.
- 35 Latissimus dorsi, truncatus.
- 36:36 Coracobrachiales. $\alpha: \alpha$ Extrema humeris inserta.
- 37 37:37 Ossa humerorum.
- 38 Tricipitis brachii pars, quae longus appellatur.
- 39 Tricipitis brachii pars, quae brevis vocatur.
- 40 40:40 40 Brachiales interni.
- 41 Pars bicipitis brachii, ab osse humeri oriens: aut pars brachialis interni, adjuncta bicipiti. Quae est varietas. Vide historiam musculorum in brachiali interno, libro iiii. capite cl.
- 42:43 Partes duae similes illi, cui 41 inscriptum. Varietas altera.
- 44:44 Tricipitum brachiorum partes, quae vocantur brachiales externi.
- 45 Condylus humeri major.
- 46, 47 Ventres duo bicipitis brachii, ad extremum truncati.
- 48 Extremum bicipitis brachii.
- 49 Videtur supinator brevis esse.
- Comparatio cum musculo, cui I tabula xxixvixxi inscripti, indicat.
- 50 Extremum bicipitis brachii, truncatum.
- 51 Pronator teres.

- 52: 52 Radiales externi longiores.
 53 Sublimis. α Hac parte oritur à condylo majore ossis humeri. β Hac à radio.
 54: 54 Profundi.
 55: 55 Flexores longi pollicum manuum. $\alpha\alpha$ Origo à radio.
 56: 56 Radii.
 57: 57 Pronatores quadrati.
 58 Radialis externus brevior.
 59 Abductor longus pollicis manus. α, β Partes duae, in quas dividitur.
 60 Extensor minor pollicis manus.
 61 Tendo radialis externi longioris.
 62 Hic tendinis radialis externi brevioris obscurum indicium esse videtur.
 63 Os metacarpi indicis.
 An inter 63 & 64 interosseus prior indicis? Illa certe sedes ejus est.
 64 Abductor indicis manus.
 65 Tendo extensoris majoris pollicis manus, truncatus.
 66 Extremum adductoris pollicis manus & flexoris brevis. Unde aponeurosis ad tendinem extensorum pollicis. Vide 40 tabulae xxix.
 67 Aponeurosis, quae ab abductore brevi pollicis manus pertinet ad tendinem extensorum pollicis.
 68 Communis tendo extensoris pollicis majoris & minoris.
 69 Videtur esse opponens pollicis manus.
 Confer musculorum hominis tabulae xi. q in manu dextra, & historiae musculorum iconis xi. E.
 70 Carpi ligamentum transversum interius, sub quo tendines ducuntur ad volam.
 71 Adductor ossis metacarpi quarti esse videtur.
 72 Abductor digiti minimi manus.
 73, 73, 73, 73 Tendines sublimis.
 74 Tendo flexoris longi pollicis manus.
 75 Tendo profundi.

The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that a knowledge of the past is essential for a full understanding of the present. The author then proceeds to a detailed examination of the early years of the Republic, from the time of the signing of the Declaration of Independence to the end of the War of 1812. This section covers the political, economic, and social developments of the period, and the role of the various states in the formation of the new nation.

The second part of the paper deals with the period from 1812 to 1860. This was a time of great change and growth for the United States. The country expanded its territory to the Pacific Ocean, and its population grew rapidly. The author discusses the various factors that contributed to this growth, including the discovery of gold in California, the invention of the steam locomotive, and the development of the cotton gin. He also examines the political and social issues of the time, such as the debate over slavery and the role of the federal government.

The third part of the paper covers the period from 1860 to 1890. This was a time of great conflict and change. The Civil War, which began in 1861, was a turning point in the history of the United States. It resulted in the abolition of slavery and the establishment of a more unified nation. The author discusses the various factors that led to the war, and the role of the different states. He also examines the social and economic changes that took place during this period, including the growth of the industrial revolution and the development of the railroad.

The fourth part of the paper deals with the period from 1890 to 1914. This was a time of great progress and change. The United States emerged as a world power, and its influence was felt in many parts of the world. The author discusses the various factors that contributed to this rise to power, including the development of the navy and the expansion of the country's territory. He also examines the social and economic changes that took place during this period, including the growth of the city and the development of the automobile.

The fifth part of the paper covers the period from 1914 to 1945. This was a time of great conflict and change. The United States entered the First World War in 1917, and played a major role in the defeat of the Central Powers. The author discusses the various factors that led to the war, and the role of the United States. He also examines the social and economic changes that took place during this period, including the growth of the city and the development of the automobile.


The sixth part of the paper deals with the period from 1945 to 1960. This was a time of great change and growth. The United States emerged as a world power, and its influence was felt in many parts of the world. The author discusses the various factors that contributed to this rise to power, including the development of the navy and the expansion of the country's territory. He also examines the social and economic changes that took place during this period, including the growth of the city and the development of the automobile.

The seventh part of the paper covers the period from 1960 to 1980. This was a time of great change and growth. The United States emerged as a world power, and its influence was felt in many parts of the world. The author discusses the various factors that contributed to this rise to power, including the development of the navy and the expansion of the country's territory. He also examines the social and economic changes that took place during this period, including the growth of the city and the development of the automobile.


The eighth part of the paper deals with the period from 1980 to 1990. This was a time of great change and growth. The United States emerged as a world power, and its influence was felt in many parts of the world. The author discusses the various factors that contributed to this rise to power, including the development of the navy and the expansion of the country's territory. He also examines the social and economic changes that took place during this period, including the growth of the city and the development of the automobile.

The ninth part of the paper covers the period from 1990 to 2000. This was a time of great change and growth. The United States emerged as a world power, and its influence was felt in many parts of the world. The author discusses the various factors that contributed to this rise to power, including the development of the navy and the expansion of the country's territory. He also examines the social and economic changes that took place during this period, including the growth of the city and the development of the automobile.

The tenth part of the paper deals with the period from 2000 to 2010. This was a time of great change and growth. The United States emerged as a world power, and its influence was felt in many parts of the world. The author discusses the various factors that contributed to this rise to power, including the development of the navy and the expansion of the country's territory. He also examines the social and economic changes that took place during this period, including the growth of the city and the development of the automobile.



TAB.



T A B U L A XXXIV.

Musculi aliquot, plerique autem exteriores, ad sceletum separatim apposti.

A Attollens auriculam. *a* Principium ejus, quo abscedit ab epicranio. *β* Extremum, quod ad auriculam pertinet, rescissum.

B Occipitalis. *αα* Origo ejus ab osse occipitis, & temporis. *ββ* Extremum, quod in aponurosem vertitur.

C Retrahens auriculam, oriens à processus mammillaris radice. *a* Ejus extremum, quo ad auriculam pertinet, rescissum.

D Cucullaris: ex transverso in partes duas divisus, ab intervallo inter spinas inferiorum colli vertebrarum duarum, usque ad summum humerum. *a* Origo ejus ab osse occipitis. *β* Pars tendinea, qua cum simili cucullaris alterius conjunctus est, oriturque à ligamento, quod ad spinas colli adnexum, cervicem distinguit. *A γ* ad *δ* origo à spinis extremis colli vertebrarum inferiorum duarum, dorsique omnium. *δ* Pars tendinea juxta spinas dorsae vertebrarum inferiorum trium. *ε* Plaga tendinea juxta spinas colli vertebrarum inferiorum duarum, totidemque superiorum dorsae. *ζ* Tendinea pars juxta spinam scapulae. Ab *η* ad *θ* extremum spinæ scapulae ejusdemque processui superiori insertum.

E Rhomboideus minor. *a* Origo ejus à spinis colli vertebrarum inferiorum duarum. *β* Extremum basi scapulae juxta primum initium spinæ ejus insertum.

Lancisii numeri 18. 31, & 19. 32, quibus *portionem serrati possici superioris* designat, designant rhomboideum majorem, quem *rhomboïdaeum* esse paulo ante scripserat. Descriptio autem, quam addit, alium, atque illum, cui **E** inscripti, designare non videtur. Si designat, pro 18. 31, & 19. 32, reponendum erit 16. 31, & 18. 32. Hunc autem rhomboideum quem voco minorem esse, hoc est, cui **N** inscripti tabula xxxix, non autem *portionem serrati possici superioris*, hoc est, cui **M** eadem tabula xxxix. inscripti, comparatio aperte docet. Et in tabula quoque xxxvi, in qua *plenorem serrati illius iconem* esse Lancisius indicat, vides eum superiore parte extremi sui non pertinere ad scapulae basem, qua parte spina ejus primum surgit, ut in hac tabula pertinere vides rhomboideum hunc minorem. Confer musculorum hominis tabulae vi. m in dorso.

F Rhomboideus major. Ab *a* ad *β* origo ejus, à spina imae colli, dorsique superiorum quatuor. *A γ* ad *δ* extremum basi scapulae infra spinam insertum.

G Latissimus dorsae. *a* Pars ejus tendinea ampla, qua incipit. *β* Pars carnea. *A γ* ad *δ* origo ejus ab extremis spinis vertebrarum dorsae inferiorum septem, lumborumque omnium, atque ossis sacri. Ab *ε* per *ζ* ad *η* origo à crista ilium, *εζ* parte tendinea, *η* carnea. *θ* Extremum, quo circum inferiorem oram teretis majoris flectitur, posteaque applicatur ad partem ejus internam.

Hic *θ* si quis fortasse Lancisium, quum ait, *latissimum dorsae tendine acuto alligatum esse inferiori parti superioris sectionis humeri juxta illius caput*; si quis, inquam, eum, eo quod locum designet numeris 20. 37, de insertionem tendinis, quæ exhibita sit, intelligat; monendus est, non apparere

rere tendinis insertionem in iconē, ut qui subeat os humeri, longius perti-
nens, ante quam inferatur.

H Gluteus medius. $\alpha\beta\gamma$ Origo ejus à crista ilium. δ Extremum tendineum, trochanteri majori insertum.

I Gluteus magnus. α Pars tendinea. A β ad γ oritur à crista ilium, cohae-
retque cum latissimo dorso. γ Hac parte oritur ab osse sacro: δ hac à coc-
cyge. ϵ Extremus tendo, femori insertus.

K Gracilis, α hic oriens ab osse pubis. β Tendo.

L Semitendinosus. α Origo ejus à summo dorso tuberis ischii. β Tendo.

M Bicipitis caput longum. α Origo ejus à summo tuberis ischii dorso. β Ten-
do, γ insertus capiti superiori fibulae.

N Plantaris. α Tendo ejus.

O O Soleus, α hic oriens à fibulae capite superiore, β hic à tibia.

P Gemelli latus tendo, juxta illam partem, qua soleo adjungitur, truncatus
 $\alpha\alpha$: deinde ab illa parte, ubi tendo plantaris est, reflexus β .

Chordam magnam abscissam Lancisius, qui est abscissus gemelli tendo.

QRS Gemellus. Q Ejus pars exterior, R interior. S Tendo. α , α Capitum
origo à femore, supra condylos. β , β Fila carnea ductu à proximis discre-
pantia.

T: T Tendines achillis, calcaneorum parti posticae inserti.

V Deltoides. $\alpha\beta$ Origo ejus à spina scapulae, ejusque processu superiore. γ
Extremum, ossi humeri insertum.

W X Y Extensor digitorum manus communis, hic è portionibus tribus con-
stans. X Portio, quae praecipue ad indicem pertinet. W Quae ad me-
dium. Y Quae ad tertium, quartumque. α Portionis mediae origo à con-
dylo minore ossis humeri. β Portionis primae tendo ad indicem pertinet.
 γ Portionis secundae, id est, mediae, tendo ad medium, in dorso manus
bifidus. δ Portionis tertiae tendo, mox bifidus, alteraque parte ad ter-
tium, altera ad quartum pertinet. ϵ Tendinea portio, qua tendo indicis
& medii in dorso manus juxta principia digitorum conjuncti. ζ Tendinea
portio similis, qua tendo medii & tertii conjuncti. η Similis portio, qua
conjuncti tendines, in quos tendo portionis tertiae dividitur.

Radiaecum externum, pro quo habuit Lancisius, non esse docet tabula
xxxI, in qua similis constructio extensoris communis digitorum: cujus
portiones tres ξ , ξ , ξ respondent tribus in hac, W, X, Y. Praeter illas au-
tem radialis etiam externus, & distinctus omnino ab iis, in tabula illa
xxxI. exhibitus: cui ibi litteram π inscripti. Et incidi in corpora, in
quibus ejusmodi extensoris illius constructio erat.

Z Ulnaris externus. α Origo ejus à condylo ossis humeri minore. β Tendo
ejus, γ insertus capiti superiori ossis metacarpi minimi.

a Extensor proprius auricularis. α Tendo ejus ad digitum minimum pertinet,
accipiensque portionem ab extensoris digitorum communis tendine ad digi-
tum tertium pertinente.

b Tendo indicatoris, truncatus.

c Communis tendo, qui fit è tendine indicatoris, illoque extensoris commu-
nis, qui ad indicem pertinet.

d Tendo lumbricalis primi, adjunctus tendini extensorum indicis.

Ex tabulae xxxvi. Γ - β colligere possemus Eustachium hanc aponeu-
rosam ab abductore indicis emitti voluisse. Hic autem loci tendini communi
adjungitur tendo lumbricalis, & aponeurosis, quae partim à tendine illo
lum-

lumbricalis emittitur, partim ab abductore indicis. Vide historiae musculorum iconis *iv. gr u*, & musculorum hominis tabulae *v. 5 6 7* in manu dextra.

e Interossei posterioris indicis tendinea pars adjuncta tendini extensorum indicis.

f Lumbricalis secundi & interossei prioris digiti medii pars tendinea adjuncta extensoris tendini digiti illius medii.

g Interossei posterioris digiti medii pars tendinea adjuncta extensoris tendini digiti illius.

h Lumbricalis tertii & interossei prioris digiti annularis pars tendinea adjuncta extensoris tendini digiti illius.

i Interossei posterioris digiti annularis pars tendinea adjuncta extensoris tendini digiti illius.

k Lumbricalis quarti & interossei prioris digiti auricularis pars tendinea adjuncta extensoris tendini digiti auricularis.

l Abductoris digiti auricularis pars tendinea adjuncta extensoris auricularis tendini.

m, n, o, p Lati extensorum tendines, per digitorum dorsum ducti: quos simplices exhibet, pertinentesque ad ossa tertii ordinis, *α, α, α, α*.

q Extensor major pollicis manus. *α* Origo ejus ab ulna. *β* Tendo.

r Indicator. *α* Origo ejus ab ulna. *β* Tendo.

s Truncatus tendo, qui ab extensore digitorum manus communi ad indicem pertinet.

t Communis tendo, qui fit ex tendinibus *r-β* & *s* conjunctis inter se.

u Interossei posterioris indicis pars tendinea adjuncta tendini extensorum indicis.

w Tendo lumbricalis primi, adjunctus tendini extensorum indicis.
Vide annotationem ad *d*.

x Latus tendo extensorum indicis, per dorsum indicis ductus: quem tendinem simplicem exhibet, insertumque ossi tertii ordinis *α*.

y Aponurosis, quae adjungitur tendini extensoris majoris pollicis manus, emissa à flexore brevi pollicis.


z Aponurosis, quae ab abductore brevi pollicis manus pertinet ad tendinem extensoris majoris.

De his, *e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, u, x, y, z*, vide historiam musculorum, & musculorum hominis tabulam *v. vi. vii*.

Γ Latus tendo extensoris majoris pollicis manus, per dorsum pollicis ductus, insertusque ossi ultimo *α*.


Quadratus, cujus Lancisius meminit, non existat in hac iconē. Designat eum numeris 44. 33. Quod vero designant, ischion est, ut docet figura sceleti tabulae *xlii*: quum quadratus exhibitus sit tabula *xxix. l*, & tabula *xxxvii. u*.

1896



TAB.

XXXV.



TABULA XXXV.

- a: a **F**rontales. α Eorum conjunctio. β Pars, quae per nasi dorsum ducitur.
 γ Mucro in angulum oculi majorem pertinens: ut videtur.
 bb: bb Orbiculares palpebrarum.
 c Compressor naris.

Si modo musculum hoc significat. Hic certe locus compressoris.

- d Levator labii superioris alaeque nasi.
 e: e Levatores labii superioris.
 f: f Zygomatici majores.
 gg Orbicularis oris.
 h: hh Depressores labii inferioris.
 i: i Depressores angularum oris, α lunato ductu circa mentum continuati inter se.
 kk: kk Mylohyoidei, α inter mentum & os hyoïdes convenientes, & conjuncti inter se.
 ll: ll Stylohyoidei. Per sinistrum penetrat tendo biventris maxillae: per dextrum autem non.
 mn: mn Biventre maxillae. m Venter primus, n postremus. α Tendo medius. β Ventris primi origo ad radicem internam processus mammillaris.
 γ Venter postremus maxillae insertus.
 opp Os hyoïdes. o Basis. p, p Cornua.
 q Attollens auriculam; cujus extremum, quo ad auriculam pertinet, rescissum.
 r Retrahens auriculam, cujus extremum, quo ad auriculam pertinet, rescissum.
 Suppicionem movere archetypa posset, duos esse.
 s Sternomastoïdeus, α oriens à sterno, β insertus ossi mammillari.
 tt: tt Cleidomastoïdei. α Origo à clavicula. β Extremum tendineum insertum mucroni processus mammillaris.

De septimo musculorum pari tantum auctorem etiam injuria reprehendunt; nam musculi utrimque gemini sunt, & facillime in duos dividi, nonnunquam etiam in tres, possunt, quorum exterior s carnosus simul ac nerveo principio a superiori anteriorive sterni regione oritur, & oblique sursum ascendens ante medium ipsius ductum alium tegit, ulteriusque procedens eundem amplectitur, ac undique involvit, & in posteriorem regionem radices apophysis papillae mammillarum similis, & in partem huic vicinam carneus atque nerveus semicirculi instar latus inseritur. Alter musculus t carnosus origine a tertia claviculae parte sterni proxima enatus; dum ad caput fertur; semper angustior evadit; & post medium quasi teres effectus, a priorique involutus, partim carneo, partim nerveo sine, in apicem memoratae apophysis acutus definit.
 De motu capitis.

- u Subclavius. α Tendo, quo incipit, β oriturque à cartilagine costae primae.
 γ Extremum, claviculae insertum.
 w Processus coracoïdeus.
 x Serratus anticus. $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ Principia ejus, oriunda à costis, secunda, tertia, quarta, quinta. s Extremum processui coracoïdeo affixum.
 y Pectoralis. α Oritur à clavicula, & à β ad γ à sterno. Dein, à γ ad δ , cohaeret cum aponeurosi obliqui externi abdominis. s Extremum, ossi humeri insertum.

- z Deltoïdes. $\alpha\alpha$ Origo à clavicula. β Extremum, ossi humeri insertum.
- A Obliquus externus abdominis. α Pars carnea, β aponeurosis. $\gamma, \delta, \epsilon, \zeta$ Capita, quibus à costis oritur: γ à sexta, δ septima, ϵ octava, ζ nona. η Origo à crista ilium. θ Aponeurosis ora tendinea, sub qua iliacus internus cum psoa magno, arteria cruralis venaque ac nervus penetrant. Hac parte aponeurosis in pube definit. Ab ϵ ad κ , hac ad lineam albam pertinet. A κ ad λ , hac ad os pectoris definit.
- B Aponeurosis obliqui externi, hac parte conjuncta cum interni aponeurosi. $\alpha\alpha$ Truncata aponeurosis obliqui externi: ut quidem videtur.
- C Obliquus internus abdominis. α Pars carnea, β aponeurosis. γ Pars carnea oriens à crista ilium, δ inserta costae decimae parti osscae, & ϵ cartilagineae. ζ Aponeurosis inserta costae decimae, η nonae, θ ossi pubis.
- D Rectus curis. α Tendo ejus, quo incipit, β oriturque à tuberculo, quod in ora prioris ossis ilium est. γ Tendo, quo rectus ille definit. δ Tendinis hujus conjunctio cum vastorum tendinibus.
- E Truncatus vastus externus.
- F Truncatus vastus internus.
- G Aponueurosis extensorum genu, α hac parte patellam integens, $\beta\beta$ hac tibiae inserta.
- H Extensor longus digitorum pedis. α Origo ejus à tibia, & $\beta\beta$ à fibula. γ Tendo ejus, qui finitur in minores quatuor $\delta, \epsilon, \zeta, \eta$, ad digitos parvos quatuor procedentes.
- Quum Lancisius hunc esse dicat *peronaeum anticum*, & simul hic indicet *tendinem extensoris magni digitorum*, qui est γ , (etsi numeri 83. 23, quibus eum designat, revera tendinem peronei tertii I- β designant: quos tamen ad eum, aut, si peroneum illum ab extensore digitorum non distinguat, ad eum solum non pertinere, sed etiam ipsum extensoris tendinem designare, censendum est, quatinus extensoris tendo proximus est in icone, nihilque esse potest evidentius, quam eum tendinem illum esse) videri potest putasse, haec duo ad unum eundemque musculum non pertinere, fortasse ob majorem carnis in archetypa umbram in confinio tendinis: quum tamen pertinere appareat attendenti. Confer musculorum hominis tabulam IX. in pede sinistro. *Peronaeus* autem *anticus* est plane alius, exteriori fibulae parti adjacens, ut tabulae XXXIII. 7: confer musculorum hominis tabulae III. G in crure. Nisi quis fortasse, ut Lancisium excuset, (quem libenter ego vellem ubique exculare posse) intelligendum de illo esse velit, quem peroneum tertium appello: quem tamen numeri 75. 23, quibus designat, non designant. Praeterquam quod ille etiam *peronaeus anticus* appellandus nude non esset, quum hoc nomine notus sit plane alius.
- I Peroneus tertius. α Origo ejus à fibula. β Tendo, γ bicorni extremo insertus capiti primo ossis metatarsi quinti.
- K, K, K, K Lati tendines extensorum digitorum pedis, per dorsum eorum ducti. Simples exhibet, insertosque ossibus ordinis tertii. De aponeurosis, quae his tendinibus adjunguntur, vide tabulam XXVIII.
- L Gracilis. α Origo ejus ab osse pubis. β Tendo, γ insertus tibiae.
- M Semitendinosus. N Ejus latus tendo, α tibiae insertus.
- O Sartorius. α Tendinosum principium, quo ab osse ilium oritur. β Tendo, in quem vertitur, γ tibiae insertus.
- P Tibialis anticus. $\alpha\alpha$ Tendo ejus. β Ab eo tendo gracilior ad pollicem pertinet.

Hunc

Hunc tendinem, α inferior, qui certe est tibialis antici, designant numeri 84. 3^o; quibus *tendinem extensoris pollicis* designat Lancisus. Quum vero proximus sit tendo, qui à tendine tibialis antici per dorsum pollicis pertinet P- β , eum designare fortasse voluit.

Q Abductor pollicis pedis. α Origo ejus à calcaneo. β Tendo, γ insertus ossi primo pollicis pedis.

R Commune principium partis brevioris bicipitis brachii, & coracobrachialis, oriens à coracoide.

SS Coracobrachialis.

T Pars longior bicipitis brachii. V Pars brevior. α β Tendo, quo incipit pars longior. α Is ducitur super caput ossis humeri, & β per sinum humeri. γ Caput communis venter, qui in δ tendinem vertitur, & radio insertum.

W Supinator longus. α Tendo ejus, β radio insertus.

X Videtur esse pars flexoris brevis pollicis manus. α Principium ejus, oriens è ligamento interiore carpi. β Extremum ad pollicem pertinens.

Y An ligamenti carpi interioris (quo coërcentur tendines, qui à cubito ad volam pertinent) pars, à qua palmaris brevis oritur?

Z Palmaris brevis.

Γ Radialis internus. α Principium, quo oritur à condylo majore humeri. β Tendo.

Hunc Lancisus dicit esse *flectentem pollicem*: deque alio, ac flexore pollicis longo, intelligi posse non videtur. At plane diversum à flexore illo esse apparet, qui exhibitus tabulae xxxviii. K. Et esse radialem internum, vel ex tabula xxxii. satis superque discimus, ubi tres iidem illi musculi exhibit: nempe 34 ulnaris internus, qui est Θ hujus tabulae: & 33 palmaris longus, qui est Δ hujus: & 32 radialis internus, qui in hac est hic ipse Γ, de quo dicimus. Invenies quoque, si conferre velis, similiorem hunc Γ esse musculo Ψ in dextro brachio tabulae i. musculorum hominis, quam musculo Π dextri brachii tabulae iii.

Δ Palmaris longus. α Caput à condylo majore oriens. β Tendo. γ Aponeurosis in vola. $\delta, \epsilon, \zeta, \eta$ Portiones quatuor, in quas aponeurosis finditur: quae ad postremum bicornes sunt. θ Aponeurosis portio, quam invenio adjungi principio abductoris pollicis brevis.

Θ Ulnaris internus. α Principium, quo à condylo majore ossis humeri oritur. β Tendo, γ insertus ossi subrotundo carpi.

Α Fortasse pars flexoris brevis pollicis manus.

T A B U L A XXXVI.

- T**emporalis. $\alpha\alpha\alpha$ Origo ejus prima à latere calvariae. β Tendo.
- M**assefer.
- S**plenius capitis. $\alpha\alpha$ Origo ejus à spinis vertebrarum. $\beta\gamma$ Extremum, insertum β ossi occipitis, & γ mammillari.
- Si modo oriri à spinis superiorum colli vertebrarum voluit. Confer historiae musculorum libri **III.** caput **CVI.**
- Duo (qui caput movent) a recentioribus anatomicis ante alios descripti, adeo facile scalpello dividuntur, ut non duorum loco, sed potius quatuor habendi sint. De motu capitis.*
- L**evator scapulae. α Origo ejus ab ora scapulae, quae media inter superiorem & basalem. $\beta, \gamma, \delta, \epsilon$ Extrema quatuor, inserta processibus transversis vertebrarum colli, β tertiae, γ quintae, δ sextae, ϵ septimae.
- S**erratus posticus superior. $\alpha\beta\gamma\delta$ Principium tendineum, quo incipit à spinis vertebrarum, α colli secundae, β primae, γ dorsi duodecimae, δ undecimae.
- S**erratus magnus. $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta$ Capita ejus distincta. θ Capitis illius, quo à costa nona incipit, origo.
- A**poneurosis communis serrati postici inferioris & obliqui interni abdominis. $\alpha\beta$ Origo ejus à spinis: γ Hic adhaeret ad cristam ilium. A γ ad δ , hac parte fit obliquus: à δ ad ϵ , hac serratus.
- S**erratus posticus inferior. $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ Extrema ejus, inserta costis inferioribus quatuor.
- O**bliquus internus abdominis. Ab α ad γ oritur à crista ilium. $\beta\gamma\delta\epsilon$ Hac parte insertus costis, β duodecimae parti osseae, γ cartilagineae, δ cartilagineae undecimae, ϵ decimae.
- P**ars aponeurosis latissimi dorsi, qua obducta aponeurosis communis obliqui interni abdominis & serrati postici inferioris. Ab α ad β refecta ab aponeurosi illa communi, libera ab ea.
- Vide musculorum hominis tabulae **VI.** **bbb** in lumbis & dorso.
- C**ommune principium longissimi dorsi & sacrolumbalis. α Pars ejus tendinea, β carnea. γ Sacrolumbalis. δ Longissimus dorsi. Ab ϵ ad ζ origo partis tendineae à spinis, dorsi inferioribus duabus, lumborum omnibus, ossisque sacri. η Hic carnea oritur à crista ilium.
- Musculum sacrum α esse indicat Lancisius, quum sit pars tendinea communis principii sacrolumbalis longissimique dorsi: cui parti subjacet quem sacrum vulgo vocant, exhibitus tabula **XXXVII.** & tabula **XXXIX.** figura **I. m.***
- P**yriformis. α Tendo ejus, extremo β insertus trochanteri majori.
- T**runcatum tendineum principium capitis longi bicipitis cruris.
- S**emitendinosi principium tendineum truncatum.
- L**igamentum ab osse sacro ad ischii tuber pertinens. α Hac parte ischii tuberi annexum, β hac sacro.
- L**evatores ani.
- S**phincter externus ani. α Hac parte affixus coccygi extremo.
- C**occygeus. α Origo ab acuto ischii processu. $\beta\gamma$ Extremum, insertum β ossi sacro, γ coccygi.

t Ligamentum, quod ab osse sacro ad ischii processum acutum pertinet. α Hac parte affixum processui illi, β hac sacro.

u Gluteus minor. $\alpha\alpha$ Origo ejus prima à dorso ossis ilium. β Extremum, trochanteri majori insertum.

w Adductor magnus femoris. Hac parte α oritur ab osse pubis; β hac ab ischii tubere. $\gamma\gamma$ Extremum latius, quo osse femoris per longitudinem insertus. δ Extremum gracilius, in tendinem ϵ migrans, insertum ζ tibiae capiti superiori.

Condylo interiori femoris insertum in corporibus invenio. Vide historiae musculorum libri III. caput CCIV, & musculorum hominis tabulae VII. BD in femoribus.

x Cruralis. $\alpha\alpha$ Origo ejus à femore.

y Popliteus. α Tendo ejus, ut videtur, oriens à condylo exteriori femoris. β Extremum, tibiae insertum.

Musculus popliteus. De motu capitis.

z Peroneus longus. α Origo ejus à capite superiore fibulae, & $\beta\beta$ à fibula per longitudinem. $\gamma\delta$ Tendo, in quem inigrat: qui δ hac parte pertinet per sinum malleoli externi.

A Abductor digiti minimi pedis. α Origo ejus à calcaneo. β Portio, quae inserta capiti primo ossis metatarsi quinti. γ Portio ad digitum pertinens. δ Tendo, in quem migrat.

B Truncatus tendo extensoris longi digitorum pedis, ad digitum minimum pertinens.

C Latus tendo: qui fit è tendine extensoris longi digitorum pedis, & adjunctis ei aponeurosis, ab altero latere ab interosseo & lumbricali, ab altero ab abductore minimi emissis. Hunc simplicem exhibet, pertinentemque α ad os tertium.

D Semimembranosus. α Caput ejus tendineum, quo oritur à dorso tuberis ischii. β Pars tendinea lata. γ Tendo, in quem migrat.

EE Vastus internus. $\alpha\alpha$ Origo ejus à femore.

F Vastus externus. $\alpha\alpha$ Origo ejus à femore.

G Caput breve bicipitis cruris. $\alpha\alpha$ Origo ejus à femore. H Caput longum bicipitis illius, truncatum. I Tendo extremus, α insertus capiti superiori fibulae.

K Flexor longus pollicis pedis. $\alpha\alpha$ Origo ejus à fibula. β Tendo.

L Flexor longus digitorum pedis. $\alpha\alpha$ Origo ejus à tibia. $\beta\gamma$ Tendo, β hac parte ductus pone tibiam extremam.

Anatome docet, hunc esse flexorem longum digitorum pedis. Confer musculorum hominis tabulae VII. f in crure. *Tibiaeus* autem *posticus*, pro quo Lancisius habuit, est cui x inscripti tabula XXXVII: qui quantum dissimilis sit, apparet. Confer musculorum hominis tabulae VIII. II. in crure.

M Tricipitis brachii caput, quod brevis vocatur: cujus α summa origo ab osse humeri. N Tricipitis brachii caput, quod longus vocatur: cujus α origo ab ora scapulae, juxta cervicem. β Filorum carneorum brevis & longi conjunctio. γ Tendo communis, δ insertus vertici olecrani, & ϵ parte tenuiore pertinens ad olecrani partem priorem, infraque eam ad ulnam.


O Abductor longus pollicis manus, $\alpha\alpha$ oriens ab ulna.

P Extensor minor pollicis manus, $\alpha\alpha$ oriens ab ulna.

Q Abductor digiti minimi manus. α Tendo ejus.


R Trun-


- R Truncatus tendo extensoris proprii digiti auricularis.
- S Aponeurosis, quae extensoris proprii digiti auricularis tendini adjungitur. Oritur ab interosseo digiti illius, & ab ejusdem lumbricali.
- T Tendo latus; qui fit è tendine extensoris proprii digiti auricularis, adjunctisque ei ab altera parte aponeurosi abductoris minimi, ab altera aponeurosi interossei ejusdem, & lumbricalis. Simplex exhibitus, α insertusque ossi tertio.
- V Teres major. α Origo ab angulo inferiore scapulae. β Tendo extremus, quo ossi humeri inferitur.
- W Tricipitis brachii pars, quae vocatur brachialis externus. α Origo ejus ab osse humeri. $\beta\beta\beta$ Hac parte adjungit se tendini communi longi & brevis. X Truncatus tendo communis longi & brevis.
- Y Tendo extremus communis capitum trium tricipitis brachii. α Hac parte insertus summo olecrani: β hac, priori parti olecrani, infraque eam ipsi ulnae.
- Z Radialis externus longior. α Tendo ejus, β hac parte per sinum radii pertinens, γ hac insertus capiti superiori ossis metacarpi indicis.
- Γ Abductor indicis manus. α Origo ejus ab osse metacarpi pollicis. β Tendo, in quem migrat.
- Δ Truncatus tendo communis extensorum indicis, hoc est, indicatoris & portionis extensoris communis digitorum, ad indicem pertinentis.
- Θ Aponeurosis adjuncta tendini extensorum indicis, orta ab interosseo posteriore indicis.
- Λ Latus tendo per dorsum indicis ductus. Fit è tendine communi extensorum indicis, adjunctaque ei ab altera parte aponeurosi interossei posterioris indicis, ab altera communi lumbricalis primi & abductoris indicis. Simplicem exhibet hunc tendinem ad os tertium usque, eique insertum α .
- Quadratum* Lancisius esse indicat numeris 44. 23: quod ischion est, si cuti jam annotatum ad tabulam xxxiv.




TAB.

XXXVI.





TAB. XXXVII.



TABULA XXXVII.

Musculos interiores exhibet.

a: a. Complexi una cum biventribus cervicis in unum conjuncti. *α* Prima origo à processu transverso vertebrae dorſi ſeptimae à lumbis. *β* Portio, quae adjungitur, oriens à ſpina unius, aut etiam alterius ex ſuperioribus dorſi vertebrais. *γ* Extremum oſſi occipitis inſertum. *δ, δ, δ* Plagae tendinae.

Qui hos ſequuntur, varias proſecto, ut Galenus ſcribit, circumſcriptiones habent, non tamen illas, quas poſteriores anatomici licenter eis attribuentes oratione & pictura delineant; neque enim, ut alias modo taceam, ulla ipſorum portio tendinem, inſtar muſculorum os aperientium in medio producit; neque ea, quae externam ſedem occupat b, proprie circumſcriptio dicenda eſt, quando non minus, quam alii muſculi, a vicina parte dividatur. De motu capitis.

Maniſteſtum mendum in Lanciſii explicatione, *transverſalem* hic deſignante numeris his, 15. 34: ut qui deſignant complexum, quem paulo ante recte indicavit. *Transverſalem* autem d deſignant hi, 15. 35: quem voluiſſe videtur.

Has *δ, δ, δ* à Lanciſio deſignari plagas numeris 12. 32, etſi eas non deſignant, res loquitur ipſa. Anatome autem plagas eſſe docet, aut partes tendineas integras horum muſculorum: non autem *portiones abſciſſas minimorum tendinum, qui à muſculis complexis ad commune membranae carnoſae velamentum ea ratione exporrigantur, ut majus robur in colli ad poſteriora retractionibus adipiſcantur.*

b: b Trachelomaſtoidei. *α* Extremum proceſſui mammillari inſertum.

Quamquam numeri 10. 31, & 10. 35, quibus *ſplenii* deſignati apud Lanciſium, muſculos, quibus b: b inſcripti, non deſignant, ſed tantum proxima eis loca; tamen ex re ipſa apparet, eos deſignari. At *ſplenii* non ſunt. Nam *ſplenii* pars inferior eſt, cui c inſcripti: ſuperior autem exhibitā tabula xxxvi. c. Et *ſplenios* non eſſe, vel ex eo ſatis apparet, quod illi à ſpinis vertebrae incipiunt, indeque complexos extrinſecus ambiunt: non autem, ut hi muſculi, & plenius etiam qui idem eſt, h tabulae xxxix. figurae 1, à proceſſibus tranſverſis incipiunt, & complexis à latere externo adjecti ſunt. Explicat autem eos Euiſtachius ipſe, de motu capitis: portionem (eorum puta, quos complexos appellant) *quae externam ſedem occupat*, quae eſt hic ipſe muſculus b, trachelomaſtoidei nomine à me in hiltoriae muſculorum libri 111. capite cx. deſcriptus, *proprie circumſcriptionem dicendam non eſſe, quando non minus, quam alii muſculi, a vicina parte dividatur.* Confer muſculorum hominis tabulae vii. z: z in cervice.

c Splenius colli. *α* Origo à ſpinis aliquot dorſi vertebrae.

Duo (qui caput movent) a recentioribus anatomicis ante alios deſcripti, adeo facile ſcalpello dividuntur, ut non duorum loco, ſed potius quatuor habendi ſint. De motu capitis.

Hi numeri 20. 33, quibus *ſemipinatus* deſignatus apud Lanciſium, deſignant ſplenium colli c. Videtur autem voluiſſe ſemipinalem ſiniſtrum l, qui infra ſequitur. Certe dextrum recte deſignat.

d Tranſverſalis cervicis. *α, α, α, α, α* Capita ejus, à proceſſibus tranſverſis dorſi vertebrae ſuperiorum orientia.

Hb b 2

c Sca-

e Scalenus posticus. α Origo ejus à costâ secunda.

f:f Scaleni medii. α Origo à costâ prima. β An varietas, etiam à secunda orientis?

Scalenus primus hic e f, & in figura 1. tabulae xxxix. à Boerhavio indicatus in institutionum §. 106xxi. a. At qui vulgo primus vocatur, qui à Cowpero, cujus myotomiam in textu secutus est, is ab illa costae primae parte oritur, quae non longe abest ab ejus extremo cartilagineo: ut i tabulae xxxviii, & ut exhibui in musculorum hominis tabula 111. IIΣ in collo. Quod sane cum nullo neque hujus xxxviii. tabulae, neque xxxix. convenit.

g, g, &c. Intercostales externi.

h Longissimus dorsi.

Transversalis in sinistro cervicis latere indicatus apud Lancisium numeris his 15. 31. Circa illum autem locum exstat scalenus, spleniusque colli, ac longissimi dorsi portio. At nullus in hoc latere, *transversalis* nomen cui conveniat, aut qui respondeat transversali d.

i Sacrolumbalis, detractus, & reflexus.

k Commune caput sacrolumbalis longissimique dorsi. α Pars ejus carnea, β hac parte oriens à crista ilium. γ Pars tendinea.

Sacrum, ubi γ inscripsi, esse dicit Lancisius, ut tabula xxxvi. l-a: ubi vide annotationem.

l:l Spinales dorsi.

mm Multifidus spinae.

n Ligamentum, quod à processu transverso extremo lumborum vertebrae quintae pertinet ad costam imam.

Figura videtur ligamenti speciem referre.

o:o Transversi abdominis. α Aponeurosis, $\beta, \beta, \beta, \beta$ oriens à processibus transversis vertebrarum lumborum; γ adhaerensque ad cristam ilium, δ atque ad costam infimam. ϵ Pars carnea, ζ oriens à crista ilium, η adhaerensque ad costae duodecimae partem osseam, & θ cartilagineam, ι oriensque ab eadem, & κ ab undecima.

p Sphincter externus ani, diductus.

q Haud dubie mucro, in quem sphincter ani externus à parte priorè migrat.

r:r Levatores ani. α Origo ab acuto processu ischii. β Hac parte partim inseritur coccygi, partim subjicitur sphincteri ani externo.

s:s Geminorum superiores. α Origo ab acuto processu ischii.

t:t Geminorum inferiores. α Origo à tubere ischii.

u Quadratus femoris, α insertus femori, ad posteriorem partem radicis trochanteris majoris.

w Obturator internus, ibi, ubi oritur, separatus, & in latus reflexus, ut pars ejus interior appareat. $\alpha\alpha$ Ramosa tendinis ex carne principia. β Tendo.

x Tibialis posticus. α Origo à fibula. β Tendo, γ pertinens hac parte per sinum malleoli interni.

Utique tibialis posticus, non autem *flexor pollicis*, ut in Lancisii explicatione. Flexor pollicis est K tabulae xxxvi: ubi recte explicat. Utrumque ex anatome perspicuum. Conferatur flexor pollicis musculorum hominis in tabula vii. h in crure: & tibialis posticus in eadem tabula Z in crure, & plenius exhibitus in tabula viii. E in crure. Conferri quoque potest ipsius Eustachii tabula xx, quamvis rudis sit in his: in qua in eodem sinistro crure est flexor longus pollicis H n°. 1, & tibialis posticus F: qui

re-

respondent, ille musculo K tabulae xxxvi, hic musculo, de quo agitur, x tabulae hujus.

- Y Peroncus brevis. αα Origo à fibula. β Tendo, γ hac parte pertinetur per sinum malleoli externi: δ hac insertus capiti primo ossis metatarsi minimi.
- A: A Supraspinati. α Origo à dorso scapulae, juxta oram, quae media inter basem oramque superiorem. β Extremum vertici tuberis magni & inaequabilis, quod in capite superiore ossis humeri est, insertum.
- B: B Infraspinati. αα Origo à dorso scapulae, juxta basem. β Tendo, in quem convergunt fila carnea. γ Tendo insertus tuberi inaequabili magno capitis superioris ossis humeri. δ, ε Carneae partes, quae cum tendine ad os humeri pertinent.
- C: C Teretes minores. α Tendo, β insertus tuberi inaequabili magno capitis superioris ossis humeri. γ, δ Partes carneae, quae tendinis comites, cum eo inferuntur.
- D Teres major. α Origo ejus ab angulo inferiore scapulae.
- EE Brachialis internus.
- F Radialis externus brevior. α Principium, oriens à condylo minore eodemque priore ossis humeri. β Tendo, γ insertus capiti primo ossis metacarpi medii.

Quum Lancisius ita hic scripserit in explicatione, ut eundem illum *radiaem externum*, qui in dextro brachio *duplici tendine in metacarpum definit*, in sinistro *unico tendine in metacarpum desinere*, videri possit voluisse, annotandum esse existimavimus, radiales in utroque brachio esse solere duos; longiorem alterum, alterum breviorum, eosque aut plane distinctos, aut facile distinguendos. Monendumque, separatim exhibitos eos esse: longiorem quidem in tabula xxxvi. Z: breviorum autem in hac, in brachio sinistro, F. Confer musculorum hominis tabulae vii. B & G in brachio dextro.

Album illud spatium inter F & G, supinatorem brevem refert.

- G Anconeus. α Origo à condylo priore & eodem minore ossis humeri. β Tendo. γ γ Carnea pars ulnae inserta.
- H Profundus.


Respondet profundo L brachii sinistri tabulae xxxviii: sicut totum illud brachium brachio huic respondet. Et discrepat quoque ab ulnari interno dextri brachii tabulae xxix. 25. Quare Lancisio, *cubitaem internum* esse dicenti, assentiri nequeo: quamvis tamen non omnino pronum sit, hos duos ab hac parte discernere.

- I Radialis externus bicornis. α Origo ab humero. β Tendo, qui mox in duos γ & δ dividitur: quorum alter pertinet ad caput superius ossis metacarpi indicis ε, alter ad medii ζ.


Hic in dextro brachio *anconaeum* numeris designat his 17. 54. Lancisius: qui designant principium radialis externi. Fortasse videbitur voluisse proximum illud spatium. Utcunque sit, non existat in hoc brachio anconeus: qui, si existeret, teneret maximam partem supinatoris brevis, quae hic nuda est.

- K Supinator brevis. αα Origo ejus ab ulna.

In manibus quidem aliqui praeterea indicati, sed ita obiter, aut perobscurum, ut praeterire eos posse mihi videar, quum praeterea ex aliis tabulis facile intelligantur.



TAB. XXXVIII.



T A B U L A XXXVIII.

Exhibet musculos intimos.

a: a Recti laterales capitis.

Vide annotationem ad b.

b: b Recti interni minores capitis.

Et si numeri 9. 23, quibus *rectum majorem dextrum* designat Lancisius, rectum hunc internum minorem b non plane designant, illum tamen ipsum voluisse, non est dubium. Ita quoque rectum lateralem dextrum non designant numeri 9. 22, quibus *obliquum*, quem putat, *superiorem* idem Lancisius designat: quem tamen designari, hoc etiam, si necesse, confirmari potest, quod numeri, quibus sinistrum designat, 9. 26, eum omnino designant. Quum vero, postquam hos musculos b & a, a, quos dicit *rectum esse majorem dextrum*, & *obliquos superiores*, memorasset, subjiat, eos, *ut praesentem tabulam abscessos*, (nullus tamen hic loci, qui abscessus dici possit, ut obiter hoc moneam) *ita sequentem integros*, & *in situ demonstraturam*: & in sequenti illa tabula, postquam dixerat, *observari in figura 1. eos praesertim musculos, quos praecedens tabula abscessos solum exhibuerit*, numeret etiam *rectum majorem*, & *obliquum superiorem*; hos b & a in hac xxxviii. tabula, eosdem esse putasse videtur, atque illos tabulae xxxix. figurae 1, quibus ibi b & c inscripti: quorum ille est rectus posticus major capitis b, hic obliquus superior c. Nisi autem musculos, quibus de loquimur, b & a tabulae hujus xxxviii, rectum esse internum minorem capitis, & lateralem, constaret, neque *abscessos exhiberi*; vel tabulae xli. figurae xlii. id aperte indicaret, in qua musculi Ξ , Ξ , & Λ , Λ omnino sunt b, b, & a, a tabulae hujus xxxviii.

c Rectus internus major capitis.

d Longus colli.

e, f Longus colli. e, f Partes duae, è quibus constat. Quarum altera e ad corpora vertebrarum colli pertinet: f altera ad processus transversos.

g: g Scaleni medii. a Origo à costa prima, principio tendineo.

h: h Trachelomastoidei cum complexis, obiter.

Hi quum exteriore circumferentiae parte satis respondeant trachelomastoideis b, b tabulae xxxviii, & h tabulae xxxix. figurae 1; & tamen iis aliquanto latiores sint; hic trachelomastoideos una cum portionibus complexorum, qui proximi iis iisdem in tabulis sunt, obiter exhibitos esse, possumus suspicari. Ad trachelomastoideum autem tabulae xxxix. figurae 1. h videtur etiam Lancisius hic attendisse, quem videri potest hac in tabula xxxviii. inter eos ponere, qui in ea *abscessi*, in *sequenti integri*, & *in situ demonstrantur*: in sequenti autem haud dubie inter eos posuit, quos *praecedens tabula*, haec scilicet xxxviii, *abscessos solum exhibuerit*. Et quum illum in tabula xxxix. *splenium* esse putaverit, hos quoque h, h in hac tabula xxxviii, utpote ei respondentem, *splenios* esse dixit. At quum post scalenorum mediorum superiorem partem trachelomastoidei sequantur, & post hos demum splenii (capitis puta: nam de spleniis colli, qui ad vertebrarum superiorum colli processus transversos pertinent, inrelligi nequit), atque, ut in tabula xxxviii, à posteriore scalenorum illorum

l i i 2

par-

parte trachelomastoïdeos positos videmus, ita etiam in hac xxxviii. musculos h, h sequi post eodcm scalenos videamus; trachelomastoïdeos esse censendum, puto, potius, quam splenius. Confer musculorum hominis tabulae 111. E.

i Scalenus prior, α oriens à costa prima, principio tendineo.

k, k, &c. Intercostales externi.

l, l, &c. Intercostales interni.

Interiores ad radices costarum non pertingunt. De vena sine pari, anti-grammate xviii.

m n, &c. Intercostalium interiorum portiones, quae ultra costam proximam sequenti inferuntur n.

o: o Transversi abdominis. α Aponeurosis, β adhaerens ad costam ultimam. Pars carnea adhaeret γ ad costae ultimae partem osseam, & δ cartilagineam. Eadem oritur ε à costa ultima, ζ penultimaque, ac η η crista ilium.

p: p Quadrati lumborum. α α Origo à crista ilium. β β Extremum costae ultimae insertum.

q Psoas parvus. α Tendo ejus ad extremum latescens.

rs: s Psoae magni. s Portio distincta. i Quod psoae praeter portionem illam reliquum est, truncatum. α Tendo.

Ex re ipsa perspicuum est, hanc truncatam musculi partem designari apud Lancisium numeris 42. 22. Eam vero, si comparisonem facere cum psoa magno sinistro velis, cognosces, puto, recisam magni partem esse; non autem, ut Lancisio visum, esse *tendinem psoae minoris recisum*. Et plenius etiam illud cognosces, si hoc attendas, psoam parvum in altero latere esse, cui q inscripti: de quo confer musculorum hominis tabulae 1v. rs in lumbis.

u: u Iliaci interni. α α Origo ab amplitudine interna ossis ilium, mox infra cristam.

w: w Pyriformes. α α Origo ab osse sacro.

x: x Obturatores externi. α Principium oriens ab osse pubis.

Pectinaeos Lancisius. At pectinei sunt, quibus Λ, Λ inscripti tabula xxxiii: à quibus hi tantopere discrepant. Neque pectinei illis, quos *tricipites* appellat, subjacent, ita ut, si pectinei essent hi x, x, subjacerent in hac tabula. Subjacent autem obturatores externi, suntque omnino illi. Confer musculorum hominis tabulae 1v. α in trunco.

y Adductor brevis femoris, α oriens ab osse pubis.

z A: z A Adductores magni femorum. z Pars, quae lato extremo femori per longitudinem inserta, α oriens ab osse pubis. A Extremum inferius, quod tendine α, in quem migrat, condylo interno femoris insertum in corporibus invenio.

B: B Peronei breves. α α Origo à fibula. β Tendo.

C Peronei brevis tendo, α insertus capiti primo ossis metatarsi quinti.

D Supraspinatus. α Tendineum extremum, quo affigitur superiori parti tuberis magni inaequalis, quod est in capite ossis humeri superiore.

E Subscapularis. α Extremum, insertum tuberi inaequali minori capitis superioris ossis humeri, proximaeque parti trunci.

F Teres major: α Extremum tendineum, quo ossi humeri inseritur.

Lancisius dicit *tendinem esse latissimi dorsi*. Respondet tereti majori D tabulae xxxv 11. Confer musculorum hominis tabulae 111. z circa scapulam sinistram. Neque latissimi dorsi partem esse, ex his ipsis Eustachii tabulis

bulis cognosces, si comparare cum hac figura velis latissimum illum tabulae xxxii. L.

G Brachialis internus. $\alpha\alpha$ Bicornae principium, quo primum oritur ab osse humeri.

H Radialis externus brevior. α Principium, quo oritur à condylo minore ossis humeri.

I Supinator brevis, $\alpha\alpha$ insertus radio.

K Flexor longus pollicis manus. α Hac parte oritur à radio. β Tendo, γ insertus ossi ultimo pollicis.

L Profundus. $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ Tendines, in quos migrat, quatuor, $\epsilon, \epsilon, \epsilon, \epsilon$ inserti ossibus ordinis tertii.

Profundum esse, id tam aperte indicat hoc, quod tendinibus suis ad digitorum ossa ordinis tertii pertinet, ut fugere id Lancisium nequiverit; in cujus explicatione *sublimem* appellatum esse videmus.

M, N, O, P Lumbricales manus.

Q Adductor ossis metacarpi digiti minimi esse videtur, α oriens ab osse cuneiformi carpi.

R Radialis externus, idem, puto, qui I tabulae xxxvii.

SST Flexor longus pollicis manus. T Portio adjuncta ei: quae in aliis occurrit. α Origo à radio. β Tendo primum conspicuus. γ Tendo portionis T, qui adjungitur tendini β mododicto. E quibus tendo communis $\delta\delta$, à pollice recisus, & reflexus.

Quaedam hujus cum *palmari*, longo puta, formae similitudo causa Lancisio fuisse potuit, cur pro illo ipso habuerit. Talem autem flexoris longi pollicis portionem, qualem Eustachius hic exhibet, postea Cowperus quoque frequenter se animadvertisse tradidit in myotomiae reformatae capite xxx, & exhibuit tabula lxi. 132. A. Talem in nonnullis quoque inveni, memoravique primum in historiae musculorum libri lxi. capite clxix, ac deinde exhibui in musculorum hominis tabula xxi. Φ in brachio dextro. In ipsa quoque Eustachii icona haud obscure apparet conjuncta esse cum flexore longo pollicis. Discrepat autem à palmari Δ tabulae xxxv.

V Pronator quadratus, $\alpha\alpha$ oriens ab ulna, β insertus radio.

W Abductor digiti minimi manus, α oriens ab osse subrotundo carpi.

X Interosseus digiti auricularis.

Y Interosseus posterior digiti annularis.

Z Interosseus prior digiti annularis.

Γ Interosseus posterior digiti medii.

Hic XYZ Γ *interossei* internos Lancisius generatim indicat. Eorum autem duo hi X, Z sunt interni: hi Y, Γ partes duorum, qui externi appellantur.

Δ Interosseus prior digiti medii.

Θ Interosseus posterior indicis.

Λ Interosseus prior indicis.

Ξ Adductor pollicis manus. α Origo ejus ab osse metacarpi medii.

Confer musculorum hominis tabulae xv. s in manu dextra.

$\Pi\Sigma$ Flexor brevis pollicis manus, α oriens ab osse cuneiformi carpi, β capitato, γ multangulo minore, δ majore.

Confer musculorum hominis tabulae xv. l p in manu dextra.

Φ Commune extremum tendineum adductoris pollicis manus, & flexoris brevis. Quod etiam in sinistra manu exhibitum esse videtur, supra M.

Confer musculorum hominis tabulae xv. q in manu dextra.

An *ligamentum* est hoc, quod Lancisius designat numeris 87. 27?

Kk k


T A-


... ..

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first of these is the fact that the
2. second of these is the fact that the
3. third of these is the fact that the
4. fourth of these is the fact that the
5. fifth of these is the fact that the
6. sixth of these is the fact that the
7. seventh of these is the fact that the
8. eighth of these is the fact that the
9. ninth of these is the fact that the
10. tenth of these is the fact that the

... ..





117

TABULA XXXIX.

FIGURA PRIMA.

Exhibet musculos intimos.

Hoc non quo praeterire, ad posteriores aliquos capitis musculos non pertinere Eustachii illa, quae ex epistola de motu capitis Lancisius hic affert: ne quis fortasse parum attentus pertinere putet. Pertinent enim ad rectum internum minorem capitis, & ad rectum lateralem: ubi adjecti in explicatione tabulae xli. figurae xlii. Z & A. Ac cum illis tota illa Eustachii descriptio ad verbum ita convenit, ut dubium non relinquat.

a Rectus posticus minor capitis, α oriens ab atlante, β insertus ossi occipitis.

Parvi muscoli a prima vertebra in caput recta inserti. De motu capitis.

b Rectus posticus major capitis, α oriens à spina epistrophaei, β insertus ossi occipitis.

Parvi muscoli a secunda vertebra in caput recta inserti. De motu capitis.

c Obliquus superior capitis, α oriens à processu transverso atlantis, β insertus ossi occipitis.

Posterior, a capite in primae vertebrae transversum processum insertus.

De motu capitis.

d Obliquus inferior capitis, α oriens à spina epistrophaei, β insertus processui transverso atlantis.

Duo parvi muscoli, a secundae vertebrae spina in processus transversos primae oblique infixi. De motu capitis.

e Scalenus medius. α Origo à costa prima. $\beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta$ Caudae sex, insertae processibus transversis colli vertebrarum inferiorum sex.

Vide annotationem ad f tabulae xxxvii.

f Spinalis cervicis. $\alpha \alpha$ Principia à processibus transversis superiorum dorsi vertebrarum orientia. β, γ, δ Extrema tria, inserta spinis colli, à dorso β quartae, γ quintae, δ sextae.

g Complexus cum biventre cervicis in unum conjunctus. $\alpha \alpha$ Principia à processibus transversis superiorum dorsi vertebrarum orientia. $\beta \beta$ Extremum ossi occipitis insertum. γ, γ, γ Plagae tendineae.

h Trachelomastoideus. $\alpha \alpha$ Principia ejus à processibus transversis superiorum duarum dorsi vertebrarum orientia. β Extremum processui mammillari ossis temporis insertum. γ Plaga tendinea.

Perspicuum est, esse eundem, cui b inscripti tabula xxxvii. Eoque huc quoque pertinent, quae ibi notavi ad probandum, non esse *splenios*; pro quibus Lancisius, ut illos, sic hunc quoque habuit.

i Scalenus medius, α oriens à costa prima.

Vide annotationem ad f tabulae xxxvii.

k Scalenus posticus, α oriens à costa secunda.

Vide annotationem ad f tabulae xxxvii.

l, l, &c. Intercostales externi.

m m : m m Multifidi spinae.

n : n Quadrati lumborum. α Principium oriens à crista ilium. β Extremum insertum costae ultimae.

K k k 2

o,

o, p, q, r, s: o, p, q, r, s Hic intertransversarii lumborum interferti. An accensuit eos quadratis lumborum?

t: t Ligamenta à processibus transversis primae lumborum vertebrae pertinentia ad propinquas partes ossium ilium.

u Infraspinatus, B tabulae xxxvii.

w: w Supinatores breves. $\alpha\alpha$ Origo ab ulna, β à ligamento articulum radii cum ulna & humero continente. $\gamma\gamma$ Extremum radio insertum.

x Interosseus prior indicis.

y Interosseus posterior indicis.

z Interosseus prior digiti medii.

A Interosseus posterior digiti medii.

B Interosseus prior digiti annularis.

C Interosseus posterior digiti annularis.

D Interosseus digiti auricularis.

Hic x, y, z, A, B, C, D generatim Lancisus indicat *interosseos internos*, qui *versus pollicem digitos adducunt*. Interni sunt hi, y, B, D: externos quos appellant, hi, x, z, A, C. Inter eos adducunt pollicem versus hi, x, z, B, D: abducunt ab eodem hi, y, A, C.

E An adductor ossis metacarpi digiti minimi?

Quum abductor digiti minimi non à cuneiformi oritur, sed ab osse subrotundo carpi, ut tabulae xxxviii. W, & in historia musculorum iconis 1. C, & in musculorum hominis tabulae 11. ψ in manu dextra; hic autem E oritur à cuneiformi, à quo adductor metacarpi oritur; suspicari fortasse licet, adductorem illum esse, non autem *abducentem*; ut Lancisio placuit: quamvis tamen rudior ossium carpi figura aliquid dubitationis afferre possit. Confer historiae musculorum iconis 11. D, & musculorum hominis tabulae 111. U in manu dextra.

FIGURA SECUNDA.

Nervi optici cum globo oculi dextri palpebraque superiore, ac musculis eorum, à parte superiore.

A Cilium.

B Tarsus.

CC Globus oculi.

DD Rectus adductor oculi. α Ejus principium.

E Obliquus superior oculi. α Ejus principium. β Tendo, γ inflexus circum cartilaginem orbiculi sui, indeque δ ad globum pertinens.

Nemo -- Eustachio (Tab. 39. Fig. 2. 3. & 4.), qui tendinem (obliqui majoris) ad trochleam accedentem sane teretem ostenderat, eundem à trochlea ad insertionem se dilatantem aut magis, aut constantius delineavit; ut cum in caeteris de quibus dictum est, rebus ejus diligentiam agnoscam; in hac quoque interdum suspicer, non tendinem modo, sed Θ vaginam, ipsum à trochlea ad insertionem completentem; nobis indicare voluisse. Morgagnus epistola anatomica xvi. §. xxxvi.

F Cartilago orbiculi cantio majori affixi: per quem orbiculum tendo obliqui superioris ducitur.

G Levator palpebrae superioris. α Ejus principium. β Aponeurosis, in quam migrat, $\gamma\gamma$ pertinens ad tarsum.

H Rectus attollens oculi. α Ejus principium.

I Rectus

- I Rectus abductor oculi. α Ejus principium. β Tendo extremus, γ ad globum pertinens.
 K Nervus opticus dexter.
 L Nervus opticus sinister, truncatus.
 M Continuitas opticorum.
 N:O Optici ante continuitatem, truncati.

FIGURA TERTIA.

- Dextri oculi globus cum musculis suis, nervoque optico, à parte superiore.
 A B Globus oculi. B Cornea.
 C C Rectus adductor oculi. α Ejus principium.
 D Obliquus superior oculi. α Ejus principium. β Tendo, γ inflexus circum cartilaginem orbiculi sui, post δ ad globum pertinens.
 Vide annotationem ad E figurae II.
 E Cartilago orbiculi, qui in cantho majore ossi frontis affixus, sustinet tendinem obliqui superioris.
 F Rectus attollens oculi. α Ejus principium. β Extremum tendineum, $\gamma\gamma$ pertinens ad globum.
 G Rectus abductor oculi. α Ejus principium. β Extremum tendineum, γ pertinens ad globum.
 H Opticus nervus, truncatus.

FIGURA QUARTA.

- Dextri oculi globus cum nervo optico, musculisque suis, detracto recto attollente: à parte superiore.
 A B Globus oculi. B Cornea.
 C C Rectus adductor oculi. α Ejus principium. β Extremum tendineum.
 D Obliquus superior oculi. α Ejus principium. β Tendo, γ inflexus ad cartilaginem orbiculi sui, post δ ad globum pertinens, ϵ insertusque ejus superiori parti.
 Vide annotationem ad E figurae II.
 E Cartilago orbiculi, qui ossi frontis in cantho majore oculi affixus, sustinet tendinem obliqui superioris.
 F F Nervus opticus.
 G Rectus abductor oculi. α Ejus principium. β Extremum tendineum, γ ad globum pertinens.

FIGURA QUINTA.

- Dextri oculi globus cum nervo optico, suisque musculis, à parte inferiore.
 A B Globus oculi. B Cornea.
 C Rectus abductor oculi. α Ejus principium. β Extremum tendineum, γ ad globum pertinens.
 D Obliquus inferior oculi. α Principium ejus tendineum, rescissum.
 E Rectus depressor oculi. α Ejus principium. β Extremum tendineum, $\gamma\gamma$ ad globum pertinens.
 F Rectus adductor oculi. α Ejus principium. β Extremum tendineum.
 G Nervus opticus, truncatus.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932









1933

1934


1935

1936

1937



TAB. XXXX.



T A B U L A XL.

FIGURA PRIMA.

Globus oculi dextri hominis, à superiore parte exhibitus.

A Cornea.

B Adnata, una cum vasculis suis, qua parte globo superinducta est.

Nusquam, ni fallor, alibi in his tabulis, nisi hic in adnata, & in retina figura 111. IV. V. IX. X. venae arteriaevae simplicibus lineis indicatae sunt. Vascula tamen esse, non videtur dubitandum: quae fortasse ejusmodi lineis indicavit, quoniam obscuriora tantum eorum lineamenta sibi apparuerint.

CC Adnata reflecta à palpebris, quas, à globo circumcirca continuata, ex interiore parte vestit.

D Sclerotica.

E Nervus opticus, non longe à globo truncatus.

F Vide D figurae XII.

FIGURA SECUNDA.

Globus oculi à posteriore parte.

AAAA Sclerotica circum opticum reflecta, ac deinde quadrifariam incisa usque ad globi medium, reclinatis angulis.

B Opticus, non longe à globo truncatus.

C Vide F figurae 1.

Hoc fortasse foramen Boerhavius voluit, quum in institutionum §. 10XVI, postquam nervos opticos *porosos* esse scripsit, addit hoc, a --- *Eustach.* T. 40. F. 2. 3 11. 12.

D Choroides, in eaque vasa.

Lineolae, quae in choroide apparent, non videntur significare aliud posse, nisi speciem ejus.

In tertiam, & in decimam, conveniunt Boerhavi haec: *ingressa haec medulla (meaullosam portionem internam nervi optici ingredi fundum bulbi oculi tradiderat) mox expansa in fundo bulbi sub vitreo, undique assurgens, in ingressu (Eust. T. 40. F. 2. 11.) arteriis majoribus, una cum ea expansis, stipatur: institutionum §. 10XXV. Ubi tamen, ut vides, indicata figura 11. & XI; in quibus nihil eorum invenitur.*

FIGURA TERTIA.

Idem globus, ab eadem parte. Cujus non modo sclerotica eodem modo incisa, & reclinata: sed cum ea etiam choroïdes.

A, A, A, A Scleroticae incisae reclinati anguli.

B, B, B, B Choroïdis incisae anguli, una cum scleroticae angulis reclinati. Ex qua reclinatione choroïdis anguli aliquantum rugosi sunt. In choroide haec eadem omnino vasa, quae in figura 11.

C Nervus opticus, non longe à globo truncatus.

D Vide F figurae 1, & C 11.

EEE Retina. In qua vasa ex nervo optico venientia.

Quod animadvertisse videtur Galenus, ubi asserit, retinam oculi tunicam

LI I 2

ce-

cerebro esse similem, quatenus habet venas & arterias ipsum perreptantes, quas sane à cerebro, per intimiorem nervi visusii substantiam trajici, ac inde in retinam oculi tunicam dispensari, tum accurata sectio, tum firma ratio ostendit. De multitudine, capite xxxix. paginà cxlviii. D.

FIGURA QUARTA.

Idem globus, ab eadem parte. Sclerotica, & choroïdes, eodem modo incisae, & reclinatae: ac praeterea etiam una cum iis retina.

A, A, A, A Anguli reclinati scleroticae incisae.

B, B, B, B Anguli reclinati incisae choroïdis.

C, C, C, C Anguli reclinati incisae retinae. In quibus vasa, ut figurae iii. EEE.

D Optici extremum, uni angulorum retinae adhaerens.

E Vide F figurae i, & C ii, & D iii.

F Humor vitreus.

FIGURA QUINTA.

Globus idem, à parte eadem, sclerotica, choroïde, retina, eodem quoque modo incisus, & reclinatus. Praeterea autem humor vitreus remotus.

A, A, A, A Scleroticae incisae anguli reclinati.

B, B, B, B Choroïdis incisae anguli reclinati.

C, C, C, C Retinae incisae anguli reclinati.

D Optici extremum, uni ex angulis retinae adhaerens.

E Vide F figurae i, & C ii, & D iii, & E iv.

FFF Retinae pars anterior, integra, ad humorem crystallinum pertinens.

In retina indicata vasa, quae ab optico per incisae retinae angulos, ac dein per integram partem ejus crystallinum versus ducuntur ramosa. Vide EEE figurae iii.

G Humor crystallinus.

Nullus hic vitreus, quem Lancisius dicit hanc figuram *posteriori facie, suo in sinu crystallinum excipientem, patefacere*. Vitreum quarta, ipso etiam Lancisio recte interpretante, exhibet: à qua facies hujus quintae tota discrepat.

FIGURA SEXTA.

Globus idem, eodem modo ab eadem parte incisus, & apertus: sed remotis, praeter vitreum, etiam crystallino & retina.

A, A, A, A Anguli reflexi scleroticae incisae.

B, B, B, B Anguli reflexi choroïdis incisae.

CCCCD Choroidis pars anterior integra.

Per choroïdis tum incisae angulos, tum integram partem, vasa eadem, quae figura iii.

DDD Ligamenta ciliaria.

EE Uvea.

F Pupilla.

Nullus in hac *crystallinus humor*, quem exhiberi Lancisius indicat. Crystallinum exhibet figura v. Haec sexta autem crystallino remoto, ea exhibet, quae ante eum sequuntur, uveam cum pupilla.

F I.

FIGURA SEPTIMA.

Globus idem ab eadem parte incisus modo eodem, apertusque: sola autem constans sclerotica cum cornea; remotis in totum humoribus, retinaque ac choroïde.

A, A, A, A Anguli reflexi scleroticæ incisæ.

BBB Scleroticæ pars anterior integra.

C Cornea.

Vitreum non in quarta modo, sed etiam in hac, & in decima, indicat, cujus meritis summa laus debetur, Boerhavius, in institutionum §. 13xxviii. Satis autem, ut opinor, apparet, nudam in hac esse scleroticam: apparet certe, esse in angulis reclinatis. Declarat id illa à secunda ad hanc usque series partium aliarum post alias, ut sequuntur, remotarum, donec in hac nuda superfit sclerotica cum cornea. Ostendit præterea figura ipsa, integram illam rotundam partem, quæ pro vitreo fortasse habeatur, non esse vitreum, ut quæ non eminet globi instar, ut vitreus in figura iv, in qua recte indicavit: sed concava est, ut ex luminis & umbræ ratione perspicuum est. Quum enim à primo tabulæ latere icones hæc luminosæ sint, globosum corpus à primo illo latere lumen habere debet, ab altero umbram, ut vitreus quoque habet in figura iv: contraria ratione, hoc est, ut in hac vii, pars concava. In decima autem nudam retinam esse, eodem modo declarat series figurarum, ab octava ad hanc decimam, & ab hac ad duodecimam. Declarant vasorum lineamenta eadem, quæ in figura xii, ubi de retina non videtur dubitari posse. Ac corpus globosum mediam illam rotundam partem non esse, sed concavum, eoque vitreum esse non posse, cognoscimus ex eadem, de qua modo dixi, luminis & umbræ ratione.

FIGURA OCTAVA.

Idem globus, sed à parte priore. Cornea cum sclerotica à medio corneæ quadrifariam ad medium globi incisæ, atque anguli reflexi. Sic apertus globus à priore parte.

A, A, A, A Reflexi anguli incisæ corneæ cum sclerotica.

BBB Choroïdes. Cujus pars interior CCC figuræ vi.

In choroïde indicata vasa omnino eadem, quæ in parte integra CCC figuræ vi.

CCC Orbiculus ciliaris. Cujus pars interior DDD figuræ vi.

DD Uvea. Cujus pars interior EE figuræ vi.

E Pupilla. Quæ F figuræ vi.

FIGURA NONA.

Idem à priori parte eodem modo incisus, apertusque globus. Cum sclerotica autem etiam choroïdes incisæ, & reflexæ.

A, A, A, A Anguli reflexi incisæ corneæ cum sclerotica.

BCD, BCD, BCD, BCD Anguli reflexi incisæ choroïdis. B Pars uveæ. C

Pars ligamentorum ciliarium. D Choroïdes proprio nomine appellata.

EEE Retina. In qua vasa eadem, quæ in figura v.

M m m

FFF

FFF Ligamentorum ciliarium vestigia.

G Humor crystallinus. Cujus pars posterior G figurae v.

FIGURA DECIMA.

Idem globus à priori parte eadem eodem modo incisus, & apertus. Sed cum sclerotica & choroide retina quoque incisa, & reflexa: ac crystallinus, & vitreus, remoti.

A, A, A, A Reflexi anguli incisae corneae cum sclerotica.

B, B, B, B Reflexi anguli incisae choroïdis.

C, C, C, C Reflexi anguli incisae retinae.

DDD Retinae posterior pars integra. Cujus pars exterior EEE figurae III.

Per retinam vasa indicata: per partem integram eadem, quae per eandem figuræ III. EEE.

Hic *vitrei propriam membranulam* indicat Boerhavius, in institutionum §. 10xxiii. c: & *vitreum* ipsum, §. 10xxviii. Vide autem annotationem ad figuram vii. in calce.

FIGURA UNDECIMA.

Idem globus eodem modo ab eadem parte incisus, & apertus. Sed, praeter crystallinum, vitreumque, remota quoque retina.

A, A, A, A Corneae cum sclerotica incisae anguli reflexi.

BCD, BCD, BCD, BCD Choroïdis incisae anguli reflexi, ut figura ix. B Pars uvulae. C Pars ligamentorum ciliarium. D Choroïdes proprio nomine appellata.

EEE Choroïdis pars posterior integra. Cujus pars exterior D figurae II.

An *Ruyfchiana* sit, quaerit Boerhavius, in institutionum §. 10xix. i *An Eustach. T. 40. F. 11. 82. 74. 24. 31.* Est hic certe choroïdes ex interiore parte exhibita: placuitque Ruyfchio parti interiori choroïdis Ruyfchianae nomen dare. Ex icone autem non apparet, Eustachium aliud, nisi choroïdem ex interiore parte, exhibere voluisse. Certe non apparet, de parte choroïdis interna à choroïde reliqua separanda, ac pro distincta quadam membrana proponenda, cogitasse.

Per partem choroïdis integram eadem vasa, quae per eandem figuræ II. Per incisam, eadem, quae per eandem integram BBB figurae vii.

F Choroïdis prima à sclerotica origo.

G Nuda à choroïde sclerotica; in cujus medio foramen: unde retina se explicat, id est, (quod primum edito hoc opere, quoniam nihil de eo Eustachius, non addidi) à foramine medio vena arteriaque; circum illud à foraminulis minutioribus medulla. Vide D figurae xii.

Ad hanc figuram pertinent quoque, quae postremo loco annotavi ad figuram II.

FIGURA DUODECIMA.

Idem globus eodem modo ab eadem parte incisus, & apertus. Sclerotica sola est, remotis humoribus, retina, choroïde.

A, A, A, A Incisae corneae cum sclerotica anguli reflexi.

BB


BB Scleroticae pars posterior integra.

CC Per hanc circumferentiam sclerotica eminet, orbiculi instar. Ab eo choroïdes oritur: quod exhibitum figura xi. F.

D Intra orbiculum mododictum CC inuenio partem membranaceam tenuiorem, sed tamen firmam: eaque continua scleroticae; cui eam idcirco accensui, D in hac, & G in figura xi. Foraminulorum plena est, cribri angustissimi instar. In ipso autem medio foramen majus habet, exhibitum hac figura D, & figura xi. G. Ad eam totam extrinsecus medulla nervi optici pertinet. Perque minutiora foraminula penetrat. Per medium autem illud majus penetrat arteria venaque, ex optico medio.


Eamque partem membranaceam Boerhavius indicat *medullosam esse portionem interiorē nervi optici, in medio perforatam*, in institutionum §. 13xxv, b. Dubium enim esse nequit, quin velit partem, cui D in hac, G in undecima inscripsi.

Nonne soluto prius oculo in singulas sui membranas, quod vix animus capere potest, foramen nervi visorii tibi & aliis, vel multis reclamantibus, ante oculos sexcenties exposui? ossium examine. Quod utrum ad partem membranaceam, quae orbiculo continetur, pertineat totam, an ad foramen, quod ejus in medio exhibet, dubitari posse putavi. Pars illa membranacea foraminis speciem praebet: nec, nisi *soluta prius oculo in singulas sui membranas*, cernitur. Foramen ejus medium eodem modo, *soluta prius oculo in singulas sui membranas*, cernitur. Exitus autem est cujusdam veluti canaliculi optici nervi, quo arteriam venamque continet, ad retinam pertinentes. Cernitur canaliculus, quamvis non *soluta prius oculo in singulas sui membranas*, optico per transversum secto, ut exhibuit figura i. F, & ii. C, & iii. D, & iv. E, & v. E. Potuit, contra, partem membranaceam *nervum visorium* vocare, cujus extremum sit, ex interiore parte oculi cernendum: potuit illius partis foramen medium *foramen* vocare *nervi visorii*, quod, quia minutum, *vix animus capere possit*. Morgagnus tradit tum ad hoc foramen medium figurae hujus xii. D, & xi. G; tum ad illud nervi optici figurarum primarum quinque locum Eustachii pertinere: quem quum attulisset, in tab. xl. (fig. i. ii. iii. iv. v. xi. xii.) inquit, *nusquam ejus nervi sectionem, aut finem delineavit, quin illud etiam foramen ostenderit.* Epistola anatomica xvii. §. xlv.



TAB.

XXXI.



T A B U L A X L I .

F I G U R A P R I M A .

Exhibet musculos primos post integumenta communia.

A Attollens auriculam. *αα* Principium, ex epicranio nascens.

B Temporalis. *αα* Prima origo à cranio.

Habes in hac figura, inquit Lancisius, *quod animadvertas musculum temporalem, ab autore sorte propius ad cranium dissectum, ex unico duntaxat fibrarum carnearum plano sine ullo tendine, & sine illis tendineis divisionibus, quas in tabula xxxiii. evidentissime patefecit.* Fortasse tamen causa quaerenda potius est in rudiore res indicandi ratione, qua frequenter usus Eustachius est: quamvis mirum tamen sit, tendinem indicatum non esse.

C Zygoma.

D Masseter. *αα* Principium ejus, oriens à zygomate.

E:**E** Frontales. *αα* Principium carnis ex tendine medio epicranii nascentis.

β Frontalium conjunctio. *γ* Pars per dorsum nasi pertinens.

FF:**FF** Orbiculares palpebrarum.

G Compressoris naris extremum.

H Levator labii superioris alaeque nasi.

IK Levator labii superioris, duobus capitibus **I**, **K** incipiens. *α* Hujus levatoris & levatoris labii superioris alaeque nasi extremum commune.

Lancisius quum duos pyramidales alarum nasi dilatatores in hac figura exhiberi tradat, non tantum illum, quem numeri ejus 17. 19. designant, hoc est, **I** cui inscripti, indicare videtur; sed etiam, qui ei à parte nasi proximus est, **H**: nam qui eidem ab altera parte proximus est **K**, eum primum, & proprium superius labrum attollentem esse dicit. Eorum autem, quibus **I** & **H** inscripti, alterum, nempe cui **I**, potius levatori labii superioris accensemus.

L Zygomaticus minor. *α* Origo ejus ab osse jugali. *β* Pars, quae adjungitur imae orae orbicularis palpebrarum.

M Levator anguli oris.

N Zygomaticus major. *α* Origo ejus ab osse jugali.

O Buccinator.

P Depressor anguli oris. *αα* Principium à maxilla inferiore oriens. *β* Continuatus hac parte zygomatico majori.

Hic in Lancisii explicatione pro *mandibulae* reponendum *labri*, ut velit depressorem labri inferioris, perspicuum est: ad quod etiam attentos nos Winslowus facit, explicatione q. Est autem hic musculus depressor anguli oris, sive, ut vulgo vocant, communis labii utriusque.

QQ:**Q** Depressores labii inferioris.

RR Orbicularis oris.

S An nasalis labii superioris?

Valde dubito an quidem sit Cowperianus depressor labri superioris, & alarum nasi restrictor, ut Santorino placuit: qui scribit, *tab. xli. fig. 1. fibras ab superioris labri medio, sub iis, quae orbis in modum, utrumque labium circumeunt, versus nasi septum, seu interiora narium sic produci, ut non*

Nn n

alium

aliud velle ostendere videantur, quam labii superioris depresso-rem, & alarum nasi constrictorem. Id tamen in hujusce musculi delineatione desiderari, quod sicut à nimia Cowperianae figurae, seu fibrarum amplitudine scite declinavit Eustachius: ita in contractiorem lacertum, atque unum dumtaxat, contra, atque ipse observare consuevit, nimio coegerit: observationum anatomicarum capite I. §. XVII. Winslowus appellat *le petit muscle de la sous-cloison des narines*, explicatione tabulae CC figurae 1. y. Boerhavius sic: *ex anteriore parte maxillae superioris ad medium basos nasi ortus, in medium labium superius dispersus*. Institutionum §. LXII.

T Levator labii superioris.

Caninum Winslowus, explicatione tabulae CC, o sinistra. *Caninum*, quem vulgo vocant, non esse, sed levatorem labii superioris, satis, opinor, apparet ex eo, quod ad orbicularem palpebrarum usque pertinet, cumque subit: quum caninum illum ipse Eustachius in figura III, in qua est cui E inscripti, multo breviorē exhibeat. Et si hunc musculum, cui T in hac prima inscripti, quaeras in dextra parte hujus faciei, nullum, puto, aliud in ea invenias, cui magis respondeat, quam levatori labii superioris.

V Zygomaticus major.

W Depressor anguli oris.

FIGURA SECUNDA.

Simiae, haud dubie.

a b In illa enim (simia) lata oblongaque apophysis à inferiore parte ossis v literam referentis efformat, quae deorsum adeo produciuntur, ut instar clypei gutturis cartilagini, quae scuto similis est b, obducatur. Ossium examine.

c Hyothyreoides.

d Sternothyreoides.

FIGURA TERTIA.

Musculos intimos una cum aliquot primis exhibet.

A Temporalis. aa Prima origo à cranio.

B Zygoma.

C Masseter. aa Principium ejus, oriens à zygomate.

D Buccinator.

E Levator anguli oris.

F Compressor naris cum depresso alae nasi, ut videtur, conjunctus in unum. Pars certe per nasum ducta, ad compressorem naris pertinet.

Confer musculorum hominis tabulae 1. t in capite, cum tabulae 11. F in capite, & cum tabulae 111. 1m in capite.

GG Orbicularis oris.

H Levator anguli oris sinister esse videtur.

FIGURA QUARTA.

a Temporalis.

b An pars carnea tenuis, oriens à parte interiore membranae tendinosae, qua temporalis extrinsecus vestitus?

Num tendineus temporalis processus, ut Lancisio visum?

F I-

FIGURA QUINTA.

a Mylohyoideus dexter. $\alpha\beta$ Principium ejus, quo à maxilla oritur. $\gamma\delta$ Extremum hyoïdi insertum.

b Geniohyoideus sinister. α Principium, quo à maxilla oritur. β Extremum insertum hyoïdi.

c Glandula sublingualis.

Maxillarem internam esse Boerhavius in institutionum §. Lxv. Esse autem, quam sublingualem appellant, praeterquam quod Winslowus, anatomicus praestantissimus, mecum consentiat, explicatione k, ipsa docet sedes. Posita enim est contra linguam, ut sublingualis: quum submaxillaris ponatur infra mylohyoideum, hoc in latere detractum, ad ostendenda quae supra eum sunt, inter quae sublingualis est.

d: d Styloglossi. α Origo à processu styloformi.

e: e Hyoglossi. Videtur ceratoglossum & basioglossum non distinxisse: quamobrem hyoglossi nomine hic utor.

f: f Ligamenta à processibus styloformibus ad os hyoïdes pertinentia.

Haec, & G figurae VIII, ligamenta referunt potius, quam stylohyoïdeos alteros.

g Processus styloformis.

h Stylopharyngeum refert. α Principium ejus à processu styloformi oriens.

i Stylohyoideus. α Extremum ad os hyoïdes pertinens.

k Os hyoïdes.

l Coracohyoïdeus. α Principium, quo à scapula oritur. β Tendo medius. γ Extremum ossi hyoïdi affixum.

m Sternohyoïdeus. $\alpha\alpha$ Ejus principium. β Extremum affixum ossi hyoïdi.

n: n Sternothyreoidei. $\alpha\alpha$ Principium. β Extremum insertum cartilagini thyreoïdae.

Sinistrum sternohyoïdaeum non esse, ut Lancisius existimavit, manifestum est. Nam & è latiori principio insigniter angustatur, contra quam sternohyoïdeus m, quem recte, ut alia, interpretatus est: & cum extremo hyothyreoïdei ad cartilaginem thyreoïdeam convenit, contra quam idem sternohyoïdeus m, qui ad os hyoïdes pertinet: & plane similis est musculo, cui in dextro latere n n inscripti, qui subjacet sternohyoïdeo m, atque omnino sternothyreoïdeus est. Confer musculorum hominis tabulae III. π in collo.

o Hyothyreoïdeus. α Origo ab osse hyoïde. β Extremum insertum cartilagini thyreoïdae.

p: p Cartilago thyreoïdea.

q Fasciculum quendam è fibris constantem refert, qui ab osse hyoïde ad glandulam thyreoïdeam pertineat.

Non ab re fuerit huc transcribere, quae Morgagnus, anatomicus eximius & consideratus, ad hanc appendicis hujus figuram, simulque ad illam, quam figura VIII. exhibet, annotavit, etiam si legi apud eum possunt in epistolis, quas cum Valsalvae scriptis divulgavit, opere praecclaro, quo me, qua fuit humanitate, donavit. In epistolae igitur IX. §. xxxiv, quum de appendice glandulae thyreoïdae egisset, pergit sic: Deinde cum illam iterum, tertiumque vidissem; suspicari coepi, num peculiaris esset musculus quo glandula nonnihil versus os hyoïdes ciceretur, aut ad ejus motus

N n n 2

agi-

agitaretur, ut eo potissimum tempore suum in aeris, cibiue fistulam humorem immitteret. Quid Eustachio id visum esset, qui tanto ante animadverterat; cum ejus tabulae adhuc laterent, tunc ne cogitare quidem poteram. Ex quo autem illae è tenebris tandem erutae sunt; ut ipsi notum fuisse, vidi, ita si certus quidam linearum ductus quali in delineandis musculis uti solemus, non chalcographi arbitrio, sed potius ut in geminis ejusdem rei iconismis (tab. cit. (XLI) fig. v. n. 52. 15. & fig. VIII. n. 52. 41.) pariter servatus, constanti auctoris judicio esset tribuendus; haud multum à veri similitudine absuturum credidi qui aliquid ejusmodi Eustachium, censeret, quale tum nobis in mentem venerat, existimasse & colore, & forma inductum tenuis & plani quasi musculi, magis magisque quo magis ascendit, in caudam, ut vocabant, gracilescens. Sed me ipsa glandulae substantia in illud corpusculum producta eo manifestius, quo interius, secundo, utriusque continuatio, & structura patebat, ut glandulae appendicem & crederem, & appellarem, permovit. Tamen cui bono ista appendix facta, & alie adeo producta esset, cogitanti cum quae de musculi usu conjeceram, hac translata, minus satisfacerent; magis placebat suspicari, intra ipsam sorte quem frustra alibi quaesiveram, hujus glandulae ductum latere. &c.

r Glandula thyreoidea.

s Aspera arteria.

FIGURA SEXTA:

Figuras VI. & VII. persimiles esse figurae II, nisi quod in illis iidem musculi alio in situ observandi proponantur, Lancisius. Non situ autem musculorum discrepant, sed rebus ipsis: quippe quod aliorum sunt animalium, ostendentibus figuris ipsis.

a Os hyoïdes.

bb Cartilago thyreoidea.

c Hyothyreoïdeus.

d Sternothyreoïdeus, duabus partibus e, f ad cartilaginem thyreoideam pertinet.

FIGURA SEPTIMA:

Vide annotationem ad figuram VI.

Canis, ut videtur.

abcc Os hyoïdes. a Basis. b Cornu. c, c Additamenta; quae cum processibus styloformibus ossium temporum conjunguntur, ex ossiculis aliquot composita.

d Cartilago thyreoidea.

e Hyothyreoïdeus.

f Musculus in extrema duo divisus: quorum altero g ad thyreoideam pertinet, altero h ad hyoïdes.

FIGURA OCTAVA.

A Masseter.

B Processus styloformis.

C Fo-

C Foramen, per quod sinus lateralis meningis craffae penetrat, post in venam jugularem internam migrans.

Vide annotationem ad Y, Y figurae xiii.

D Rectus lateralis capitis. α Origo à processu transverso atlantis. β Extremum, quo ad cranium pertinet.

E Rectus internus minor capitis. α Origo ab atlante.

F Stylopharyngeus. α Origo à processu styloformi.

G Ligamentum à processu styloformi ad os hyoides pertinens.

Hoc certe, quod numeri 44. 41, quibus apud Lancisium *stylopharyngeus sinister* indicatus, designant, potius ligamentum refert, à processu styloformi ad hyoides pertinens. Musculus autem, cui F inscripti, stylopharyngeo similior. Confirmare potest stylopharyngeus I figurae xi, ad cuius similitudinem à processu styloformi incipit: quamvis, ut duae hae figurae similes sint inter se posito, illi tamen musculi ductu aliquantum diversi in iis sint. Fortasse Lancisius hunc ipsum, cui F in hac viii. inscripti, voluit: quod etiam Winslowo visum, explicatione i.

H Styloglossus. α Origo à processu styloformi.

I Ceratoglossus. α α Origo à cornu ossis hyoidis.

K Basioglossus. α Origo à basi ossis hyoidis, & à cornu.

Hic apud Lancisium in numeris his, 45. 35, & 46. 36, & 45. 37, & 45. 38, videri potest erratum esse. Nam 45. 35, qui *geniohyoideum rectum*, quem geniohyoideum vocamus, designent, designant non musculum aliquem, sed, ante musculos quoscunque, maxillam. Sequentes quidem musculos ab hac parte primos tres designant. Nempe 46. 36, qui *basioglossum* designent, designant primum N, qui est mylohyoideus. Dein 45. 37, qui *geniohyoideum obliquum*, quem mylohyoideum vocamus, designent, designant secundum ab hac parte musculum M, qui est geniohyoideus. Post 45. 38, qui *basioglossum* designent, designant tertium ab hac parte musculum L, qui est genioglossus. At, qui sequitur hoc ordine musculus ab hac parte quartus K, numeris nullis in explicatione designatus est. Jam vero si uno gradu in numeris illis erratum sit, singulisque quidem latitudinem designantibus addatur unus, neque primi 45. 35, ut nunc, designabunt locum ante musculos, neque postremus musculus K erit in explicatione omisus: sed erunt musculi hi omnes N, M, L, K indicati. Quum enim 45. 35, qui *geniohyoideum rectum*, hoc est, geniohyoideum vocatum à nobis, designent, designent locum ante musculos: si reponantur 45. 36, (aut potius 46. 36.) designabitur musculus N, qui est mylohyoideus. Dein, quum 46. 36, qui *basioglossum* designent, designent musculum N, qui est mylohyoideus: si reponantur 46. 37, designabitur musculus M, qui est geniohyoideus. Et quum 45. 37, qui *geniohyoideum obliquum*, quem mylohyoideum appellamus, designent, designent musculum M, qui est geniohyoideus: si reponantur 45. 38, designabitur musculus L, qui est genioglossus. Quum denique 45. 38. qui *basioglossum* designent, designent musculum L, qui est genioglossus: si reponantur 45. 39, designabitur basioglossus K. Quod si igitur ita, ut dictum est, emendes, unus ex his quatuor basioglossus recte explicatus erit: nisi emendes, omnino nullus. Etenim N, ut in textu 46. 36, *basioglossum* esse, aut, ex emendatione, 45. 36. vel potius 46. 36, *geniohyoideum rectum*, quem geniohyoideum vocamus, quemadmodum Winslowus quoque Lancisium velle existimavit explicatione tabulae CC figurae

VIII. o: eorum plane neutrum anatome concedere potest. Nequit itidem M *geniohyoideum obliquum* esse, hoc est, mylohyoideum, 45. 37, ut in textu: aut basioglossum 46. 37, ex emendatione, sicuti etiam Lancisium velle Winslowus existimavit explicatione l. Et qui hos duos, N & M, comparabit cum a & b figurae v, fortasse non ita plane obscurum esse animadvertet, esse eosdem, hoc est, M hujus esse b illius, & N hujus esse illius a, sive, quod idem est, M hujus esse geniohyoideum, N autem mylohyoideum. Neque concedere anatome potest, L *basioglossum* esse 45. 38, ut in textu; aut mylohyoideum, quem vocat *geniohyoideum obliquum*, 45. 38. ex emendatione, sicuti Winslowus quoque Lancisium intellexit explicatione n, addens, melius vocari genio-glossum. Nam Basioglossus omnino est K: de quo confer muscutorum hominis tabulae x. figurae 11. o. Mylohyoideus autem ab hoc sinistro latere non exhibitus: qui exhibitus si esset, neque basioglossi, neque styloglossi extrema apparere, ut nunc, possent, ut quae integeret. Superest musculus K, in textu intactus, ex emendatione autem, pro 45. 38. reponendo 45. 39, recte *basioglossus* dictus. Post haec, si mea icon 11. tabulae x. muscutorum hominis fide digna sit, poterit illa haec Eustachii illustrari, quamvis positum discrepet. Est enim perspicuum, Eustachianae musculum K esse illius basioglossum o; L esse ejusdem genioglossum q; M geniohyoideum r: ne dicam de proximis illis, styloglossi, ceratoglossi, osse hyoide, maxilla.

L Genioglossus sinister.

Vide annotationem ad K.

M Geniohyoideus sinister. α Principium, quo oritur à maxilla. β Extremum, quo ossi hyoïdi inseritur.

Vide annotationem ad K.

Hic, nisi fallor, geniohyoideum refert potius, quam, quem Winslowus in explicatione l referre visus, genioglossum: eo quod fila ejus à maxilla recta ad os hyoides pertinent, ut fila pertinent geniohyoidei: non autem tanquam radiata forma, & ad illum quidem locum, ubi linguae sedes est; ut pertinent genioglossi fila. Et geniohyoideum esse colligi etiam potest ex comparatione figurae xi, in qua musculus, cui B inscripti, est genioglossus sinister idem, cui L inscripti in hac viii: praetereaque, cui A in illa inscripti, genioglossus, ni fallor, dexter apparet, eo quod remotus est geniohyoideus ille, cui M in hac inscripti octava.

N Mylohyoideus dexter, basi ossis hyoïdis insertus:

Vide annotationem ad K.

Assentiri Winslowo nequeo, tanquam portionem basioglossi apparere tradenti in explicatione o: quippe quod is à basi hyoïdis juxta cornu oritur, eoque hoc positu hyoïdis dexter (dexter enim esset) cerni ab hac parte nequit. Quoniam vero ei ille, cui M inscripti, genioglossus visus est, hic, cui N, tanquam basioglossus apparere potuit, ut qui genioglossi illi extrinsecus adiaceat, ut in sinistro latere basioglossus K, genioglossi L. At si is, cui M inscripti, geniohyoideus est, ut ex iis, quae in annotationibus ad K & M attuli, apparere puto, obscurum esse nequit, hunc, de quo quaeritur, cui N inscripti, potius, quam basioglossum, mylohyoideum esse, ut qui geniohyoideo extrinsecus adiectus sit: quod convenire in mylohyoideum potest, in basioglossum non potest.

O Ossis hyoïdis basis, P Cornu.

Q Con-

Q Constrictor medius pharyngis.

R Constrictor inferior pharyngis, $\alpha\alpha$ oriens à cartilagine thyreoidea.

SS Cartilago thyreoidea.

T Fasciculus ab osse hyoide ad glandulam thyreoideam pertinens.

Vide annotationem ad q figuræ v.

V: V V Cricothyreoidei.

W Cartilago cricoidea.

X Glandula thyreoidea.

Y Aspera arteria, truncata. In ea glandulae indicatae.

Z Oesophagus, truncatus.

a Rectus internus major capitis.

b, c, d, e, f, g, h h Processus transversi colli vertebrarum septem.

Vide praeterea quae Morgagnus de hac figura, & de XI, & de IV. & VI. tabulae XLII. solenter tradit in epistola anatomica XI. §. XV.

FIGURA NONA.

Ad epistolam de organis auditus pertinent. tria ossicula. in caverna ossis petrae similis recondita, & musculus motioni eorum praefectum ostendit. Explicatione tabulae VII. figurarum parvarum.

a Ossiculum incudi simile.

b Ossiculum malleum referens.

c Ossiculum stapedi vocatae comparatum, a Vesalio praetermissum.

d Musculus nemini anatomicorum non incognitus, qui in majorem processum ossiculi malleum referentis inseritur.

Oritur a substantia ligamentis simili qua parte os, quod cuneum imitatur, cum temporis osse committitur, indeque carneus evadens redditur sensim ad medium usque aliquanto latior; deinde vero angustior effectus tendinem a gracillimum producit, qui in majorem apophysim ossiculi malleo comparati, fere e regione minoris apophysis ejusdem, inseritur β . De auditus organis.

FIGURA DECIMA.

Eadem ab altera parte.

FIGURA UNDECIMA.

A Genioglossus dexter. α Principium, quo oritur à maxilla.

Nullam invenio musculi, cui A inscripsi, cum geniohyoideo aliquo, de qua meminit Winslowus in explicatione a, similitudinem. Fila enim geniohyoidei à maxilla recta ad os hyoides pertinent: hujus autem musculi A fila à maxilla tanquam radiorum instar in eum ducuntur locum, ubi lingua posita; quemadmodum fila genioglossi. Et quum eadem ratio sit filorum musculi proximi, cui B inscripsi: ex hoc solo satis apparere potest, eum quoque genioglossum esse. Ex quo praeterea satis perspicuum est, basioglossos non esse, contra atque in Lancisii explicatione indicatum videmus. Et basioglossus sinister est truncatus ille, cui D inscripsi, idem, cui K figura VIII: dexter autem non apparet in hac. Mirum tamen, quum alii

O o o 2

atque

atque genioglossi, esse nequeant, à principio tanto intervallo disjunctos inter se esse. Et sinister quidem convenit cum sinistro, qui figura VII. exhibitus, L: dextri autem principium à principio sinistri longius, quam par esse videtur, distat.

B Genioglossus sinister. α Principium, quo oritur à maxilla.

Vide annotationem ad A.

C An Lingualis?

Si *ceratoglossus sinister* esset, ut esse Lancisus tradit, ejus principium non poneretur post principium constrictoris pharyngis medii L, sed ante illud, ut recte exhibitum est figura VIII: ubi *ceratoglossus* ille I positus ante principium constrictoris illius Q. Confer praeterea musculorum hominis tabulae x. figuram ix. *Ceratoglossus* autem in hac xi. Eustachii est truncatus ille, cui E inscripti, illi respondens, cui I figura VIII.

D Basioglossus, truncatus.

E Ceratoglossus, truncatus.

F Styloglossus, α oriens à processu styloformi. β Principium alterum, ab angulo maxillae oriens.

β *Ligamentum musculi stylo-glossi* appellat Winslowus, explicatione k. Sic apparet, tanquam si Eustachius voluerit, esse principium alterum styloglossi.

G Masseter.

H Processus styloformis.

I Stylopharyngeus, α oriens à processu styloformi.

K Stylohyoideus alter, α oriens à processu styloformi.

Recte quidem Lancisus *stylohyoïdaeum*. At non verus tamen est, hoc est, proprie sic vocatus, qui semper adest: quippe qui extremo suo ducitur ante *ceratoglossum* & *basioglossum*, ut in figura v. i ante e. Sed potius est *stylohyoideus* alter, qui in aliis reperitur, extremoque suo ducitur post *ceratoglossum*, hic detractum, ut cujus extremum truncatum E supra apparet.

L Constrictor medius pharyngis. $\alpha\alpha$ Origo à cornu ossis hyoïdis.

Num hujus pars inferior est *syndesmo-pharyngeus* aliquis? ut Winslowo placere video, in explicatione m. Apparet in icone à cornu, ni fallor, hyoïdis oriri: ideoque *ceratopharyngei* nomen ei quoque conveniret, si quis à parte superiore separare fortasse velit, & nomen à parte, à qua oritur, imponere.

M Cornu ossis hyoïdis. N Basis.

O Cartilago thyreoïdea. $\alpha\alpha$ Locus, unde oritur constrictor inferior pharyngis.

P Commune extremum stylopharyngei & palatopharyngei. α Pars thyreoïdeae inserta. β Pars in membrana pharyngis evanescens.

Winslowus esse "portionem inferiorem stylo-pharyngei, annexam partim thyreoïdeae, & nonnihil cornu ossis hyoïdis", in explicatione n. Esse autem commune extremum stylopharyngei & palatopharyngei, colligere possumus ex figura vi. tabulae XLIX: ubi stylopharyngeum O, & palatopharyngeum M in commune illud extremum Q, & P, conjunctos exhibet. Atque extremum illud in hac xi. tabulae hujus xli. videtur inferiori parti cornu ossis hyoïdis una lineola adnexum quasi esse, tanquam si ab eo oriretur. Quod an voluerit Eustachius, & anne potius sculpturae vitium sit, dubitari fortasse posset; quum plures extremi illius lineolas, ante-

tequam constrictorem pharyngis medium attingant, desinere videamus, tanquam si ultra sub eo non ducerentur.

Q Constrictor inferior pharyngis, à cartilagine thyreoidea & à cricoidea resectus, & in latus reflexus. $\alpha\beta$ Pars, qua oritur à thyreoidea. $\beta\gamma$ Pars, qua à cricoidea.

R Pharyngis membrana nuda.

S: S Cricothyreoidei. $\alpha\alpha$ Origo à cartilagine cricoidea. $\beta\beta$ Extremum insertum thyreoideae.

T Cartilago cricoidea.

V Aspera arteria, truncata.

W Oesophagus, truncatus.

X, X, &c. Processus transversi vertebrarum colli.

FIGURA DUODECIMA.

AB Os hyoïdes. A Basis. B Cornu sinistrum.

C Extremum ligamenti, quod à processu styloformi ossis temporis pertinet ad os hyoïdes.

D Cartilago thyreoidea.

E Hyothyreoideus sinister. α Principii pars oriens à basi ossis hyoïdis; β pars, à cornu. $\gamma\gamma$ Extremum cartilagini thyreoideae insertum.

F Cartilago cricoidea.

G Sternothyreoideus sinister. $\alpha\alpha$ Principium ejus. β Extremum cartilagini thyreoideae insertum. γ Portio ad cornu ossis hyoïdis pertinens, δ eique inserta.

γ *Parvum musculum peculiarem* appellat Winslowus in explicatione e.

H Aut processus superior cartilaginis thyreoideae, aut ligamentum ab eo ad extremum cornu hyoïdis pertinens, aut utriusque rudis figura.

Anne illud, quod mox supra F apparet, spatium inter cartilaginem cricoideam & thyreoideam est potius, quam *parvus* quidam *musculus peculiaris*, ut Winslowo potuit videri, in explicatione f? Certe figura similis est spatio illi in figura xi. mox supra T: nisi quod ibi juxta cricothyroideum sinistrum S, ob eum ipsum appositum, aliquantum discrepet.

FIGURA DECIMA TERTIA.

Γ Pterygoideus internus, α oriens ex sinu pterygoideo, β insertusque maxillae.

Δ: Δ Pterygoidei externi. α Origo ab osse maxillari superiore. β Extremum insertum collo maxillae.

Θ Circumflexus palati. $\alpha\alpha$ Principium, quo ab osse multiformi oritur. β Tendo, inflexus circum hamulum processus pterygoidei, post truncatus.

Vide annotationem ad F: F tabulae xlii. figurae iv. in fine.

Λ: Λ Recti laterales capitis. α Origo à processu transverso atlantis. β Extremum, insertum ad posteriorem oram foraminis, per quod sinus lateralis penetrat.

Alter musculus praedictis brevior & angustior, magis tamen in principio, quam in fine, oritur parumper nervus a posteriori & externa sede foraminis sextum nervorum cerebri jugum emittentis, qua scilicet os asperum est & inaequale; deinde obscure latior effectus ad interiora procedens, in anteriorem

Pp p

ela-

elatioremque partem transversî processûs primæ vertebrae desinit. De motu capitis.

Σ: Σ Recti interni minores capitis. α α Origo à corpore atlantis. β β Extremum insertum ossi occipitis.

Prope asperam & inaequalem scissuram occipitis ossi, & alteri petram referenti communem, qua parte nimirum arteriae soporalis gratia hoc perforatum est, eminens quaedam linea oblique ad interiora procedens occurrit, a qua musculus digitalis latitudinis carneum principium sumit, (oviri enim, an inferi hunc musculum dicat, parum nunc refert, dummodo scias, quomodo ad utrumque os pertineat) indeque oblique deorsum ad exteriora procedens, nonnihil angustior & tenuior redditur, ac deinde quibusdam in partibus producto tendine juxta radicem anteriorem transversî processûs primæ vertebrae, non longe ab insertione alterius, quem modo describam, inseritur.

De motu capitis.

Π Rectus internus major capitis. α Extremum ossi occipitis insertum. β β Portiones, quibus incipit.

Vide annotationem ad Σ: Σ.

Σ: Σ Longi colli. α Pars altera, quæ extremis suis pertinet ad corpora vertebrarum colli, β quintæ à dorso, γ sextæ, δ septimæ. ε Pars altera, pertincens ad processûs transversos.

Vellem etiam mihi indicarent, quam ob causam musculi stomacho subjecti duorum loco in utroque latere haberi non debeant, neque inter capitis motus reponendi sint? quum & sine ulla difficultate separari possint, & illorum nec brevis, nec angusta portio Π in occipitis os adeo alte inferatur, ut pene ad lineam transversam, quæ id ab alio osse cuneo simili dividit, pertinere videatur. De motu capitis.

Lancisius, postquam Eustachii locum, quo hos musculos ipse tam clare explicat, recte hic attulit, subjicit hæc: cum iidem (musculi) non semper eandem habeant utrinque insertionem; idcirco auctor hoc loco demonstrat in dextero occipitis latere inferiorem (Σ - δ) in sinistro vero superiorem (Π - α). Quæ quomodo intelligenda sint, disputare nihil attinet. Utcunque autem velis, hoc certum, in sinistro latere duos esse ostendi; alterum Π, quæ illa portio est, quam in os occipitis inferi scribit, rectus internus capitis major nunc appellatus; alterum Σ, qui mododictæ majorem partem subjectus, vocatur longus colli: in dextro autem latere, recto detractò, nudum exhiberi longum Σ.

a: a Maxillæ inferioris, in mento dissectæ, partes duæ in latera reclinatae.

Dentes infixi apparent.

b: b Processus coronoidei maxillæ.

c: c Processus condyloidei maxillæ.

d Introitus canalis, in quem arteria venaque ac nervus penetrant.

e Nasi rudis figura.

ff Ossis frontis rudis figura.

g: g Suturae communes ossi frontis cum jugalibus.

h: h Ossa jugalia.

i: i Suturae communes ossibus jugalibus & maxillaribus superioribus.

k: k Suturae ossium maxillarium superiorum propriae.

l: l Exitus canalium, qui per fundum foraminum oculorum pertinent.

m: m Ossa maxillaria superiora. In quibus dentes infixi apparent.

n: n Processus laterales maximi ossis multiformis.

ooo:ooo Offa squamosa. Quorum cum processibus lateralibus maximis ossis multiformis communes suturae indicatae.

p:p Ossium maxillarium superiorum partes ad palatum pertinentes.

q:q Suturae ossium maxillarium propriae in palato.

Quae palatum transversa dissecat linea, non modo in adultis non aboletur, quod tamen novi anatomici, ut Galeno adversentur, confingunt, verum etiam in illis aperte cernitur, & palatum supra infraque dirimit. Ossium examine.

r Foramen à palato ad nasum pertinens.

s:s Ossium maxillarium superiorum partes ad septum narium pertinentes.

t Sutura communis ossium maxillarium superiorum, ubi in palato sunt.

Ea praeterea linea, quae a maxillae superioris extremo per totum palatum recta procedit, in simiis profecto, ut Galenus scribit, inter duos incisores dentes obscura est, & in hominibus evidentissime cernitur. Ossium examine.

u:u Offa palati.

v Sutura communis ossium palati.

w:w Suturae communes ossibus palati & maxillaribus superioribus in palato.

x:xx Suturae partibus ossium palati illis. quae inferae extremis processibus pterygoideis ossis multiformis, communes cum processibus illis extremis.

y Vomer.

z Sutura, ubi vomer cum multiformi connectitur.

A:A Suturae communes vomeri cum ossibus palati in superiore parte narium,

B:B Suturae, ubi ossa palati cum basi multiformis connectuntur.

C:C Foramina posteriora nasi ossi.

D Os multiforme.

EF:EF Processus pterygoidei ossis multiformis. E Paries exterior. F Hamulus, in quem paries interior definit.

G Conjunctio ossis multiformis cum osse occipitis.

H:H Foramina ossis multiformis, per quae penetrant tertii rami quinti paris nervorum cerebri.

I:I Foramina, per quae penetrant arteriarum carotidum externarum rami ad meningem crassam.

K:K Extrema partium ossium tubarum Eustachianarum.

A caverna ossis lapidei, in quam meatus auditorius, conchion appellatus, finitur, via in narium cavitatem perforata est; ab illa enim meatus alter oritur rotundo canaliculo similis, & instar tenuioris calami amplius, qui oblique ad anteriorius interiusque basis capitis latus procedens, in medio quatuor foraminum totum istud os penetrat atque perfodit K; nam posteriori ipsius se de arteria soporaria calvariam ingreditur P; anteriori quartum nervorum cerebri jugum extra ipsam emergit H; externum latus arteriae in duram cerebri membranam distributae aditum patefacit I; internum denique fissura quaedam circumscribit, quae a cuneum referentis ac lapidei ossis extremis partibus, oblique infra & ante ductis, fit M. De auditu organis.

L:L Rimae inter ossa squamosa & petrosa.

MM:M Connexio ossium petroforum cum multiformi.

N:N Offa petrosa.

O:O Connexio ossium petroforum cum osse occipitis.

P:P Introitus canalium, per quos arteriae carotides internae nervique intercostales penetrant.

P p p z

Q: Q

Q: Q Processus styloides.

R: R Foramina caeca, exitus aquaeductuum Falloppii.

S: S Osse aurium introitus.

T: T Processus mamillares.

V: V Suturae communes ossibus squamosis cum ossibus verticis.

W: W Offa verticis.

X: X Additamenta suturae lambdiformis.

Y: Y Foramina, per quae penetrant sinus laterales meningis crassae in venas jugulares internas migrantes.

Penetrant quoque nervi octavi paris cerebri, ipso etiam indicante Eustachio, in loco, quem adjeci ad $\Lambda: \Lambda$. Et praeterea cum iis spinales recurrentes appellati, quos octavo pari accensuit.

ZZZZZ Os occipitis.

3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Colli vertebrae septem, cum ligamentis inter corpora earum intercedentibus. 8, 8, &c. Processus earum transversi.

9, 10: 9, 10 Foramina processuum transversorum, 9: 9 atlantis, 10: 10 epistrophaci.

FIGURA DECIMA QUARTA.

Larynx cum osse hyoide & pharynge, atque oesophagi & asperae arteriae principio, à latere sinistro.

a b c d e Ossis hyoidis additamenta, quae cum apophysi styloidea conjunguntur. In quibusdam animalibus inveniuntur.

f Os hyoides. g Cornu esse videtur.

h Cartilago thyreoidea.


i Cartilago cricoidea.

k Asperae arteriae principium.


l Pharynx cum principio oesophagi.

m Musculus à cartilagine cricoidea oriens, pharyngemque ambiens.

n Musculus ab ossis hyoidis additamento oriens, pharyngemque ambiens.



TAB. XXXXII.



TAB. XXXXII .

TABULA XLII.

FIGURA PRIMA.

Larynx, cum principio asperae arteriae, à latere sinistro. Cartilaginis thyreoideae pars sinistra in priora flexa est, ad patefaciendos musculos, quos tegit.

ABBB Cartilago thyreoidea, ex interiore parte. **A** Pars sinistra, **BBB** dextra.

CD Epiglottis. **C** Pars gibba, **D** sinuata.

E Fistulae laryngis pars lateralis membranacea.

F: F Summitates cartilaginum arytaenoidearum.

GGG Arytaenoideus transversus.

H Arytaenoideus obliquus dexter, α insertus cartilagini arytaenoideae sinistrae.

II Arytaenoideus obliquus sinister. α Origo ejus à basi arytaenoideae sinistrae.

K Thyreoarytaenoideus sinister. $\alpha\alpha$ Origo à cartilagine thyreoidea. β Insertus arytaenoideae sinistrae.

L Cricoarytaenoideus lateralis sinister. $\alpha\alpha$ Oritur à cartilagine cricoidea. β Inferitur basi arytaenoideae sinistrae.

M Pars basis cartilaginis arytaenoideae sinistrae.

N Cricoarytaenoideus posticus sinister. $\alpha\alpha$ Oritur à cartilagine cricoidea. β Inferitur basi arytaenoideae sinistrae.

O Cartilago cricoidea.

Juxta musculum cricoarytaenoideum posticum **N**, Winslowus *parvam superficiem articulem lateralem sinistram* notat in explicatione *n*, cum qua articuletur apophysis inferior cartilaginis thyreoideae. Eamque in figura **VIII**. deesse, ejus in explicatione *c*, monet.

PPPQQR Aspera arteria. **P, P, P** Anuli cartilaginei primi tres. **Q, Q** Spatia inter annulos illos media. **R** Asperae arteriae pars postica, tota membranacea.

De hoc, cui **R** inscripsi, quod *portionem oesophagi* esse Lancisius dicit; Winslowus jam notavit, *potius videri portionem membranaceam asperae arteriae*. Explicatione tabulae **DD** figurae **1. m**.

FIGURA SECUNDA.

Larynx à parte posteriore.

A Epiglottidis pars posterior, quae sinuata.

BB Cartilaginis thyreoideae pars interior. **C: C** Processus superiores, qui illicantur ligamentis ad ossis hyoidis cornua extrema pertinentibus. **D: D** Processus inferiores, quibus cartilago cricoidea continetur.

E: E Summitates cartilaginum arytaenoidearum.

FFFF Arytaenoideus transversus.

G Arytaenoideus obliquus dexter.

HH Arytaenoideus obliquus sinister. α Oritur à basi arytaenoideae sinistrae.

I Pars basis cartilaginis arytaenoideae sinistrae.

K: K Cricoarytaenoidei postici. $\alpha\alpha$ Oritur à cartilagine cricoidea. β Inferitur basi arytaenoideae.

L Cartilago cricoidea.

FIGURA TERTIA.

Haec ita respondet Vesalii secundae capitis **xxi.** libri **ix.** de humani corporis fabrica, ut inde huc translata videatur.

FIGURA QUARTA.

Pharynx à posteriore parte, una cum palato molli & lingua à superiore.

A Lingua, à superiore parte.

Morgagnus, cuius prudentiam ut laudavimus alias, ita hic quoque laudandam ducimus, tametsi linguam hoc esse dicat, movet tamen in epistola anatomica **xi.** §. **xv.** suspicionem exhibitae fortasse *palati offsei supernae faciei*. Ac rudior praeterea haec figura suspensos tenere plerosque possit. Quare committendum mihi non fuit, ut, cur linguam potius dixerim, reticerem. Induxit primum luminis & umbratum ratio. Est enim haec pars ad utrumque latus suum convexa, quum *superna palati offsei facies* ibi sinuata sit: si modo non fallor, qui per eam intelligo illam, quae ad narium fundum pertinet. Convexam hic esse *faciem* apparet, quoniam figura illuminatur à dextro tabulae latere, eoque pars, quae lateri illi proxima est, ut in convexa *facie*, multum luminis habet; altera umbrae: contra atque esse deberet, si sinuata esset *facies*. Deinde, sinus, qui per mediam longitudinem hujus partis pertinet, sinui respondet linguae figurae **v.** Si autem *superna palati offsei facies* esset, ibi aut eminentis illius futurae, quae in fundo narium est, aut septi, quod ab ea surgit, aliquam saltem, quamvis rudem, notam videretur omisurus non fuisse. Eoque minus, quod, si palatum osseum esset, nudum esset: quippe quod palati mollis ora tanquam abscissa exhibetur **CC**; certe non tanquam continuata per illam, de qua quaestio est, *faciem*. Et, si etiam tectum esset membranis suis, ibi, ubi septum narium esse deberet, videretur tanquam rescissarum membranarum vestientium oras aliquo fuisse modo indicaturus. In icone autem *facies* haec tota, licet sinum per mediam longitudinem exhibeat, sibi tamen ipsi continuata apparet. Et umbra illa major, quae mox ante oram palati mollis est, magis distare ab ea hoc, quod linguam dico, eoque linguam potius esse, quam palatum, indicare videtur.

B Palati mollis pars superior. **CC** Ejus, à postica parte ossium palati resecti, ora.

DE: DE Circumflexi palati mollis. **D** Pars carnea. **E** Tendo, inflexus circum hamulum processus pterygoidei.

Lancisium, qui *styloglossos abscissos* esse hos tradit, jam emendavit Winslowus in explicatione **t, t**, esse dicens *perystaphylinos externos*: quos in historia muscutorum nominavi circumflexos. Emendavit quoque Morgagnus, epistola anatomica **vii.** §. **xxi**: qui appellat eos dato à Valsalva nomine *muscutorum tubarum novorum*. Scrupulum omnem eximere potest tabulae **xli.** figura **xlii**: in qua dextrum ex iis invenimus **Θ**, omnino eundem, atque hac ex nota certius ibi cognoscendum, quod tendo ejus circum hamulum processus pterygoidei flectitur. Neque obstat hoc, quod Winslowus, in explicatione figurae **xlii.** tabulae **xli.** **e**, appellat *salpingo-staphylinum*, aut potius *ptery-salpingoideum*: in explicatione autem hujus **iv.** tabulae **xlii.** **t**, *perystaphylinum externum*. Hoc enim, quicquid est, explicuit ipse in egre-

egregio illo opere, expositione anatomica constructionis corporis humani. In qua, ut rem paullo altius repetam, in tractatu de capite, primum, §. ccccxcviii, pura, etque laudabili, qua solet, simplicitate, describit musculus *spbeno-salpingo-staphylinum*, qui altero extremo ex parte adnexus sit lateri *spbenoidali* portionis osseae tubae *Eustachii*, ex parte portioni molli finitimae tubae ejusdem. Inde procedat *alam internam* versum (apparet enim pro externe reponendum esse interne) *apophysis pterygoideae*, ubi portio illius musculi adnectat se *alae illi*; altera portio descendat usque ad extremum *alae*, insecletur se circum *rostellum* sive *hamulum* ejusdem *alae*, tanquam circum *rotulam*, posteaque se adnectat *valvulae palati* circa *uvam*. Deinde paragrapho proxima sequente dicit, habere se *portiones illas duas* pro duobus musculis distinctis, quorum unus videatur non nisi dilatandae tubae inservire, scilicet portio illa quae sit adnexa *apophysi pterygoideae*, & quae posset appellari *pterygo-salpingoideus*. Alteram portionem esse verum *spbeno-staphylinum*, & posse etiam habita ratione adhaesionis cujusdam ad tubam, appellari *spbeno-salpingo-staphylinum*, aut *salpingo-staphylinum externum*. Eum illum esse, quem communiter appellant *peristaphylinum externum*. Ex quo primum manifeste apparet, *spbeno-salpingo-staphylini* nomen in §. ccccxcviii. generatim tribuere illi, quem vulgo *pterygo-staphylinum externum* vocant. Quum vero in *portiones illas duas* dividi animadverterit, pro duobus eas distinctis musculis habere, quorum alter posset appellari *pterygo-salpingoideus* appellari: alter proprio sibi magis nomine *spbeno-salpingo-staphylini*, qui sit is, qui communiter appellatur *peristaphylinus externus*. Apparet praeterea, musculus, quem dicit communiter appellari *peristaphylinum externum*, alium non esse, nisi quem vulgo *pterygo-staphylinum externum* scriptores vocant, quem ego *circumflexum*. Ex quo intelligitur, in explicatione tabulae xlii. figurae iv. & vi. 1, per *peristaphylinum* illum *externum* designare quem vulgo *pterygo-staphylinum externum* appellant. Deinde, quum in §. ccccxcix. illum, quem communiter appellant *peristaphylinum externum*, posse etiam appellari *salpingo-staphylinum externum* tradat; ex eo intelligitur, eum, cui e tabulae xlii. figura xlii. inscripsit, *salpingo-staphylinum* esse tradendo in explicatione, eundem illum, quem in explicatione tabula xlii. *peristaphylinum externum* vocat, designare. Neque obstat, puto, hoc, quod in explicatione tabulae xli. nude appellat *salpingo-staphylinum*, in expositione autem, §. illa ccccxcix. *salpingo-staphylinum externum*. Nam *externum* appellat in expositione, ut distinguat ibi ab *interno*: quando scilicet mox, §. 131, *salpingo-staphylini interni* nomen dat illi, quem caeteroquin appellat *pterygo-salpingo-staphylinum*. In explicatione autem tabulae xli. vocat *salpingo-staphylinum* nude, fortasse non ita attentus: quod tamen difficultatem creare non potest. Quoniam enim eundem in explicatione tabulae xlii. vocat *peristaphylinum externum*, in expositione autem *peristaphylinum* illum *externum* tradit appellari etiam posse *salpingo-staphylinum externum*, manifestum est, in explicatione tabulae xli. etiam *externum* illum velle, quamvis *salpingo-staphylinum* vocet nude. Quum igitur *peristaphylinus externus* explicationis tabulae xlii. figurae iv. & vi. 1, & *salpingo-staphylinus* explicationis tabulae xli. figurae xlii. c, sint unus idemque *pterygo-staphylinus externus*, quem *circumflexum* appello; perspicuum est, in nomine tantum differentiam esse in explicatione, non in re. Quid autem causae sit, cur in explicatione tabulae xli, postquam *salpingo-staphy-*

phylum esse tradidit, mox addiderit, aut potius esse *ptery-salpingoideum*; relictat expendendum. *Pterygo-salpingoideus* quis sit, supra intelleximus ex expositione: nempe esse *spheno-salpingo-staphylini*, quem §. cccxcviii. descripsit, portionem illam, quae adnexa sit *apophysi pterygoideae*: quam in expositione *pterygo-salpingoideum*, in explicatione autem, exigua illa quidem nominis differentia, *ptery-salpingoideum* appellat. Illum igitur potius esse *ptery-salpingoideum* tradit. Quod sic potius videtur intelligendum, ut velit, illum in figura esse locum illius *ptery-salpingoidei*; quam sic, ut velit, illum ipsam revera existare in ea: quippe quod in ea nulla musculi pars adnexa apparet processui *pterygoideo*, quin potius ultra eum totus ad hamulum pertinere conspicitur. Haec tamen omnia, quantumvis vera esse putem, iudicio viventis (anno c1813 cccxlii. opus hoc quum primum ederetur) Winslowi, viri clarissimi amicissimique, ac suorum scriptorum interpretis optimi, lubens subijcio.

F: F Levatores palati molliis, & extremis suis in palato molli convenientes.

Hic, si in Lancisii explicatione pro 36. 16. reponas 39. 16, quibus Morgagnum quoque uti video in epistola anatomica x. §. iv, hos F F *cephalopharyngeum* esse voluit: quemadmodum cum Winslowus quoque intellexit, explicatione g. Voluisse, id satis etiam apparet ex eo, quod iidem sunt, atque illi, quos simul in figura vi. designat numeris his, 38. 44. Ad quod Eustachii magis illustrandum, nequeo, quin primum afferam, quae Morgagnus proluxe, & pro sua consuetudine eleganter tradidit in mododicta epistola anatomica x. §. iv. *Expansionem*, (*salpingostaphylinorum* puta) ante me, inquit, exhibere potuisset Eustachius tab. xlii. fig. vi. (n. 39. 44.), nisi hos musculos cum in hac figura, tum in respondente huic iv. (n. 39. 16.), qua de causa nescio, sic inversos pinxisset, ut ab origine ad finem, non descendere, ut oportebat, sed ascendere videantur. Quae me res; ut verum tibi confitear; vereri interdum cogit, ne in hac forte interpretatione decipiar, praesertim cum viri confirment celeberrimi, non *salpingostaphylinos*, sed *cephalopharyngeos* musculos ibi esse delineatos. Attamen ut in his, aliisque ad pharyngem attinentibus Eustachianis iconibus interpretandis, non sine jucunditate animadverto, me plerumque eadem quae illi, sensisse; ita est nonnunquam ubi invitus fatear, mihi aut sententiam aliam, aut aliquam saltem dubitationem & fuisse, & esse, velut hic. Quaero enim primum, num verisimile esse possit, *salpingostaphylinum* musculum Eustachium ignoravisse, aut cum haberet cognitum, nusquam in tot delineationibus quae ad pharyngem, faucesve spectant, exhibuisse? Certe qui auditoriam tubam, tot jam saecula delitescens, suis accuratissimis perquisitionibus retexerit, ejusque non osseam partem inter duos faucium seu gulae musculos, & paucis ad suum usque tempus bene cognitos, --- procedere scripserit (de audit. organ.), illi non possis incognitum musculum existimare neque minimum, & tubae eidem secundum longitudinem appositum: aut cum satis nosset, cumque huic proximum novum tubae musculum vel quinque pinxisset (tab. xli. fig. xiii. & tab. xlii. fig. iv. & vi.), nunquam hunc alterum delineasse. Atqui, nisi ubi nos suspicamur, ibi pictum agnoscas; nusquam pictum esse, sciendum est. Viris quidem celeberrimis videtur tab. xli. fig. xiii. ubi ipsi literulam e inscripserunt (n. 69. 41.), ibi musculum ostendi *salpingostaphylinum*. Sed praeterquam quod num eodem nomine eundem quem nos, intelligant musculum, incertum est, & continuo se revocant, subijcientes, ostendi potius *pterysalpingoideum*; certe si eum locum in archetypa Eustachii ta-

bula

bula attentius inspiciamus, & cum sinistro, qui nudus omnino pingitur, internae pterygoidis alae extremo processu comparemus; planum fiet, circum processum dexterum pingi tendinem se se introrsum reflectentem musculi videlicet tubae novi, quemadmodum, de hoc alias (epist. VII. n. XXI.) ad te scribentes, confirmavimus; ut non alium quam hunc, esse illum qui proximus ad posteriora appingitur, musculum, & rei ipsius natura doceat, & figurae commonstrent de quibus paulo ante dicebamus, IV. & VI. tab. XLII. eundem musculum cum eadem tendinis inflexione, quater exhibentes, ut qui in his vocant, adscripta littera τ pterygstaphylinum externum, in illa quoque haud alio nomine vocare, & quod consequitur, haud alium quam nos, musculum designare ibi debuisse videantur. Igitur ne salpingostaphylinum ab Eustachio nusquam pictum esse, dicamus; reliquum erit, ut in figuris illis IV. & VI. sub littera g (n. 39. 16. & 39. 44.) delineari, existimemus, praefertim cum in utraque se junctus ostendatur a pharyngis facie posteriore, quod ut cephalopharyngeo, quemadmodum nunc accipiunt, minime; sic maxime convenit salpingostaphylinum. Vide enim in IV. sub ipso inferiore limbo (n. 40. 16.) ejus de quo hic quaeritur, musculi, quid lineolae illae obliquae, brevessque significant. Non crassitudinem certe istius musculi (etsi id scalptor fortasse credidit, qui eas in sinistra praefertim iconis parte vel extra pharyngis latus produxit) num eadem crassitudo in eodem musculo cur ad eundem modum in fig. VI. non appareret? Credam potius, id Eustachium jussisse, ut a posteriore pharyngis facie eum se junctum esse musculum, sive id par musculorum, intelligeremus, neque ad illam faciem, sed ad exos palatum, in quo & pinxit, attinere. Nam si minime in hoc pingere, sed huic dumtaxat a se positum indicare voluisset; non umbrae deerant, quibus in fig. VI. secundum artis leges adjunctis, evidenter posset significare. Quod scini tamen placeat, cephalopharyngeos ibi esse delineatos; iis minus placeat id posse, crederem, quibus pharyngis fornix, rugaeque hujus fornicis in eodem iconismo ad num. 43. 45. videntur proponi, id est infra gurgulionem, quem praeclare delineatum animadverto ad num. 42. 45. Nam supra hunc salpingostaphylinos quidem constat a natura ipsa positos esse; cephalopharyngeos autem non modo supra pharyngis fornix, sed tanto superius monstrari, non est verisimile. Ut enim illum fornix Eustachius simul cum annexa posteriore pharyngis facie tam depressisset, quam satis esset, ut a tergo insipientibus gurgulio appareret; una tamen hos quoque depressisset musculos qui fornice ipso non sunt altiores. Sed mihi; si id forte quaeris; non ibi fornix repraesentari, verum detractis altioribus ac posterioribus ex iis musculis qui pharyngem complectuntur, pars hujus internae tunicae concidentis, eoque rugosae videtur ostendi. Caeterum etsi propositam ostensi salpingostaphylini parvis interpretationem in medio relinquo; non est tamen reticendum, me in ea consentientem invenisse Valsalvam, ut qui in altera adnotavi scheda, eosdem quos dixi musculos pro salpingostaphylinis, non pro cephalopharyngicis ab Eustachio esse delineatos. Quod cum adnotavi, illud animadvertere simul potuit, non teretes illos, sed in trianguli modum per molle palatum se se explicantes haud multo aliter quam ipse indicaveram, a tanto anatomico fuisse exhibitos, si modo trianguli vertex non sursum, sed deorsum versus spectaret. Haecenus Morgagnus. Quem vides dubitanter quidem scribere, sed ita tamen, ut gravia argumenta afferat, cur salpingostaphylini videri debeant, & haud difficulter cernas, inclinare ad credendum, non esse alios. Pro iis etiam habuit Santorinus, in observationibus anatomicis

capite VII. §. xv. Atque ego quoque & antea habui in historia musculorum, libri III. capite LX, ubi appellavi levatores palati molles: & nunc etiam eos esse indicavi in explicatione. Quo magis mearum partium hic esse video, supradictum scrupulum, si possim, eximere. Nempe quo minus *salpingostaphylinos* illos esse musculos haud cunctanter dicamus, obstare hoc videtur, quod *ab origine ad finem non descendere, sed ascendere videantur*, ut recte est à Morgagno animadversum. Et fortasse hoc ipsum, quod communis eorum mucro in figura sursum, & tanquam ad caput erectus sit, adduxit Lancisium, Winslowumque, ad existimandum, esse *cephalopharyngaeum*. Atque idem illud suspensum me olim tenuit. Neque enim alii quidem, ac *salpingostaphylini* esse videbantur: & tamen sursum, non deorsum ducti. Itaque aut errasse Eustachium censendum erat, aut, quod potius erat, intelligere me cum male, suspicandum. Postea autem, figuras iterum ac saepius examinans, ac cum corporibus conferens, pharyngem quidem rectam hic exhiberi animadverti; palatum autem molle una cum musculis ad id pertinentibus, (nimirum *salpingostaphylinis* illis, & *musculis tubarum novis*, quos circumflexos palati molles in historia musculorum nominavi) exhiberi erecta à parte priore, depressa à posteriore. Ut si quis caput ante oculos habeat cum pharyngis parte posteriore palatoque molli ac musculis huc pertinentibus: & pharyngem quidem positu recto consideret, caput autem, unaque cum eo palatum molle ac musculos illos, occipitio in posteriora depresso, facie sursum versus directâ: & in totum illo positu capitis, colligat, qui est figura XIII. tabulae XLI. Ejusmodi enim positu capitis qui à posteriore parte adspiciet, *salpingostaphylinos* illos non deorsum, sed, ut Eustachius exhibet, sursum ductos videbit. Loque eos situ una cum palato molli exhibuisse intelligimus etiam ex *musculis tubarum novis*. Eos enim, aequae atque *salpingostaphylinos*, positu capitis recto, à basi cranii non sursum, sed deorsum duci manifestum est, quoad tendo circum hamulum processus pterygoidei inflectatur. Et in hac tamen IV. figura, & in VI. musculi, quibus D:D inscripti, (quos *musculos tubarum novos* esse, extra omne dubium est) sursum ducuntur, & ad illum quidem modum, ad quem dexter eorum in tabulae XLI. figurae XIII. O, hoc est, capite ut in figura illa posito, facie sursum versus directâ, occipitio deorsum. Solaque differentia haec, ut in figura XIII. tabulae XLI. à parte exhibeantur hoc positu capitis priore: in his autem tabulae XIII. IV. & VI. à posteriori. Hoc etiam confirmat lingua quam puto, sive, si velis, *palati ossis superna facies*, A. Ejus enim sive linguae, sive palati ossis, positus ita quoque erectus est, ut positum esse dixi palati molles. Quae si quidem vera sunt, una tamen alterave difficultas in figuris superest, quarta nempe & sexta tabulae hujus XLII. Prima haec: stylopharyngeorum principium; G-a figurae IV, & O-a figurae VI. altiore in iis in loco positum est, quam principium tum *salpingostaphylinorum* F:F, tum *musculorum tubarum novorum* D:D: & tamen deberet esse inferiore. Oriuntur enim stylopharyngei à radicibus processuum styloformium, quibus Q:Q inscripti in figura XIII. tabulae XLI: *salpingostaphylini* autem ab ossibus petrosi, ibi ubi desinit pars ossea tubae Eustachianae, hoc est, juxta loca, quibus K eadem in figura inscripti: & mox juxta eos oriuntur *musculi tubarum novi* O-aa in figura eadem. Quae si aut in figura illa, aut in capite etiam ipso, eodem modo posito, considerabis, manifestum erit, infimam inter eas esse stylopharyngeorum originem, contra atque in

figura

figura IV. & VI. tabulae XLII. exhibitum esse videmus. Altera difficultas haec: in figuris illis, IV. & VI. tabulae XLII, *salpingostaphylinorum* principium etiam pone stylopharyngeos collocatum esse videtur. Et tamen revera distant inter se à principio stylopharyngei magis, quam prima principia *salpingostaphylinorum*: quippe qui, ut dixi, oriuntur è locis K:K figurae XLII. tabulae XLI; quum stylopharyngei à radicibus orientur processum styloformium Q:Q figurae ejusdem. Sive autem Eustachius ad illa non ita attenderit, &, ut aliquando in mentem venit suspicari, superiorem iconis partem, ex lingua, palato molli, circumflexis, & levatoribus constantem, ad sequentia minus recte accommodaverit: sive aliud aliquid subfit, dubium esse non potest, quin in tabulae XLII. figura IV. G:G, & in VI. O:O, sint stylopharyngei; in IV. & VI. B sit palatum molle; in iisdem DE:DE sint *musculi tubarum novi*, & ita quidem positi, ut in figura XLII. tabulae XLI. O. Et quoniam eo posita capitis etiam *salpingostaphylini* sursum ducuntur, apparet, ni fallor, quo minus illos, de quibus hic quaeritur, quibus F:F in figura IV. & VI. tabulae XLII. inscripsi, *salpingostaphylinos* illos esse credamus, non obitare hoc, quod *adscendant* in figuris illis.

G:G Stylopharyngei. *a:a* Principia, quibus oriuntur à processibus styloformibus ossium temporum.

H:H Constrictores superiores pharyngis. *αβ* Extrema, quae in media postica parte pharyngis conveniunt.

I:I Constrictores pharyngis medii. Dexter nudus: sinister tectus inferiore. *α* Extrema, quibus conveniunt.

A latere exhibuit tabulae XLII. figura XI. L. Ubi exhibuit à cornu ossis hyoïdis orientem.

K Constrictor pharyngis inferior. *αα* Extremum, quo sinister cum dextro convenit.

Hic mendum aliquod in explicationem Winslowi irrepsisse, ut facile sit, non dubito; ac pro *hyo-crico-pharyngeo* voluisse *thyro-crico-pharyngeum*. Quod tamen per se satis apparet, monendum tamen duxi, ne quem fortasse moretur.

L Commune extremum stylopharyngei & palatopharyngei, *ααα* in membrana pharyngis evanescens, & cartilagini thyreoideae insertum.

Esse portionem communis illius extremi declarat idem illud extremum Q figurae VI.

M Pharyngis membrana.

N Oesophagus, truncatus.

O Cartilaginis thyreoideae processus inferior dexter.

PPP Aspera arteria, truncata.

FIGURA QUINTA.

Lingua cum epiglottide & osse hyoïde, à latere sinistro.

A Lingua.

BC Epiglottis. B Dorsum. C Pars sinuata.

DEFG Os hyoïdes. D Basis. E Cornu sinistrum. F Cornu dextrum. G Additamentum graniforme.

H An fila, quae à radice linguae ad epiglottidis dorsum pertinent? An ligamentum epiglottidis?

R r r 2

Con-

Confer Morgagni epistolam ad Lancisium, & Santorini observationum anatomicarum capitis vi. §. xvi, & Winslowi explicationem tabulae DD figurae v. c.

I Glandulae in dorso radices linguae.

Numeri 46. 34, sub quibus *sinistrum ex lateribus ossis hyoidis ligamentum* apparere indicat Lancisius, designant basem D ossis hyoidis. Fortasse designare voluit lineolas, quae sunt mox supra principium sinistri cornu hyoidis: quas Winslowus vocat *ligamentum hyo-epiglotticum sinistrum*, explicatione d. Ego in medio relinquere hanc rem malui, quae satis perspicua non apparuit.

FIGURA SEXTA.

Pharynx, una cum palato molli & lingua, ut figura iv.

A Linguae dorsum.

Vide annotationem ad A figurae iv.

BB Palati mollis pars superior. CC Ora ejus à postica parte ossium palati resecti.

DE:DE Circumflexi palati mollis. D Pars carnea. E Tendo, inflexus circum hamulum processus pterygoidei.

Vide annotationem ad D:D figurae iv.

FF:F Levatores palati mollis, αα extremis suis convenientes in palato molli.

Vide annotationem ad F:F figurae iv.

G Uva.

HH Faucium concavum.

III Ora incisivae membranae faucium. Supra quam, quicquid membranae faucium in nates pertinet, non exhibitum, quo in fauces inspicere ab hac parte possit.

K Membrana faucium, sive pharyngis, nuda.

De hac parte aliquid memoratum in annotatione ad F:F figurae iv.

L Salpingopharyngeus.

Hunc esse salpingopharyngeum, quem in historia musculorum libro xii. capite lvii. descripsi, ut olim, scribens historiam illam, existimavi, & in ea indicavi, tum in libri xii. capite lvii. & lviii, tum in libri xi. capite xii. & xi; ita nunc quoque mihi videtur. Eadem in historia indicavi, *salpingo-pharyngaeum* esse Santorini, observationum anatomicarum capite vii. §. iv. Antequam cum à Drakio, in anthropologiae libri i. capite ix, musculum illum *carneis illis fibris*, quae oriuntur à *radice cartilaginis excavatae pro meatu a palato ad aurem*, descriptum esse, adducto ibi Drakii illo loco, significavi. Neque, ut ab Eustachio exhibitum non esse sentirem, haec satis me movebant, quae Santorinus tradit, *pharyngis musculorum paris, quod, habita utriusque extremi ratione, salpingo-pharyngaeum dicat, --- Eustachium, --- qui tubae primum notitiam in anatomicis invenit, --- non modo descriptionem, verum ne indicium quidem dedisse*. Ex figura autem salpingopharyngei, quam nunc dedi in tabulis meis anatomicis musculorum hominis, tabulae x. figura xiii. q, judicari poterit, ane ei & Santorini descriptio satis conveniat, & Eustachii figura. Quamquam huic in totum similis non est, & partim differt obliquitate, & eo praesertim, quod illi palatopharyngei orae, qua, per posteriorem eandemque exteriorem interioris membranae pharyngis partem ducta, alter alterum

rum

rum spectat, ut in Eustachii figura, non adjungitur: sed illi parti ejus, quae intra pharyngis lateralem partem eminens, ibi membranam ejus mododictam quodammodo attollit. Ignoramus autem an Eustachius eum pro separato musculo habuerit, an potius pro parte palatopharyngei. Ego sane, quia perexilis est, & cum palatopharyngeo conjunctus, quum historiam musculorum scripsi, deberemne ut separatam à palatopharyngeo proponere dubitavi, qui & alios pharyngis musculos in tam multos dividendos non esse, paullo ante, capite LIV. docuerim, & ab aliis divisos conjunxerim. Quum tamen separandus esse potius videretur, idcirco ejus historiae, capite LVII. subjunxi haec: *erunt fortasse, quibus videbitur palatopharyngeo fuisse adjungendus: nos autem separavimus ab eo, quod ipse diu separatus est; & ne ejus accessione palatopharyngeus intelligeretur difficilior: nihil caeterum quoque moraturus, si quis adjungere ei potius velit.* A quibus video Morgagnum non abhorre: quippe qui in epistola anatomica x. §. xviii. scribit, *salpingopharyngaeum* (hoc scilicet Eustachii, de quo quaeritur, *fasce*) designari, — *si attendas ea quae de salpingopharyngaeo scribens* (epistola xi. n. xlii), *ex Drakin producturus sit, fortasse* (Eustachio) *non omnino indignum videri posse.* In epistola autem illa xi. ex Drakii anthropologiae libri i. capite ix. affert haec: "est in superficie interna saucium aliter ordo carnearum fibrarum, qui priorem ad acutum angulum decussat. Is nascitur non solum ex lateribus uvulae, sed pariter ex radice cartilaginis pro meatu a palato ad aurem (b. e. Eustachiana tuba) excavatae, & oblique ad suam in glandulosa pharyngis membrana, infertionem descendit." Et addit deinde Morgagnus: *quando tamen quod mihi nondum, id saepius, ut video, aliis accidit, ut fibras & tot, & tam confertas, & ita dispositas invenirent, ut ex ipsis mallet peculiarem musculum facere; ego quoque in quibus cadaveribus sic apparebunt, in iis pro musculo libenter agnoscam, nemini tamen propterea obstant, ne arbitrio usus a Valsalva oblato* (vid. ep. x. n. vi.), *Drakium, aut alium potius sequatur, cui forte placeat tenuiores pharyngis musculos ad paucos majoresque contrahere.*

Caeterum fieri posset, ut cuiquam Eustachius tale quid, quale Santorinus de musculi stylopharyngei divisione tradit, exhibere voluisse videretur. Lato eum carneo tendineo exortu, ab styloidis radice proficisci, Santorinus in observationum anatomicarum capite vii. §. vii. scribit, & post tres circiter latos digitos, demissum ad pharyngis lateralem angulum bisariam dirimi: quarum partium altera tenuior & superior sit, altera major. Earumque major videri posset apud Eustachium esse musculus O: tenuior, L. Qua in sententia Winslowum fuisse, qui Eustachii musculum, cui L inscripsi, in explicatione s parvum esse indicat stylo-pharyngeum Santorini, fortasse quispiam suspicetur: atque eo quidem magis, quod Lancisio, musculum, cui O inscripsi, stylopharyngaeum esse tradenti, tacite videtur assentiri. Eiusmodi autem interpretationem assensu nostro comprobare facilius possemus, nisi haud mediocre illud intervallum inter musculum L atque O interjectum apud Eustachium videremus, tanta intercedente palatopharyngei M latitudine: quum tamen tenuiorem illam stylopharyngei partem, de qua meminit Santorinus, partem majorem toto ductu proxime inveniamus comitari. Vide musculorum hominis tabulae x. figuram xi.

MN: MN Palatopharyngei. N Pars ex palato molli veniens, truncata.

Sane quam ab omnibus, à quibus recessi, invitatus recessi, tum ab illis praecipue, qui vivi, ac spirantes, rem anatomicam mirifice ornant, suo

Ss s

que

- que merito in oculis omnium sunt, & in summo apud me honore. Maxima tamen hoc mihi voluptati est, quod, quandoquidem facere cum his in rebus omnibus nequivi, non nisi de paucis, aliter atque existimarunt, sentire coactus sim. A quibus, atque etiam ab aliis quibuscunque, si de iis, quae excidere mihi quoque potuerunt, monebor, & publicae, & meae etiam utilitatis causa vehementer gaudebo, gratiasque iis habebo, agamque. Inter ea autem, de quibus facere non possum, ut idem sentiam, illud denique esse video, quod hunc, cui M inscripti, *petro-pharyngeum* esse Winslowus existimavit, in explicatione r: qui aliquid causae procul dubio habuit, cur existimavit. Mihi autem anatomicum illum esse ostendere visa est, quem palatopharyngeum nominavi in historia muscutorum: eoque, ut olim in historia illa eum esse indicavi, sic nunc quoque non possum, quin idem affirmem. Confer Morgagni epistolam anatomicam x. §. xviii.
- O: O Stylopharyngei. α Principium, à processu styloformi oriens.
- P Commune extremum stylopharyngei, palatopharyngei, salpingopharyngei. $\alpha\alpha\alpha$ Partim cum illo, quod altero in latere est, convenit, partim evanescit in inferiore parte membranae pharyngis, β partim cartilagini thyreoideae inseritur.
- Q Commune extremum stylopharyngei & palatopharyngei. $\alpha\alpha\alpha$ Convenit cum illo, quod in altero latere est; perque inferiorem partem membranae pharyngis evanescit, β ac cartilagini thyreoideae inseritur.
- R R R Cartilago thyreoidea. S: S Ejus processus inferiores.
- T Pharyngis membrana nuda.
- V Oesophagus, truncatus.
- W W W Aspera arteria, truncata.

FIGURA SEPTIMA.

Cartilago cricoidea à parte priore.

- a: a Capitula, quibus cartilagine arietae mobile insident articulis.
- b Pars interior.

FIGURA OCTAVA.

Cartilago cricoidea à latere dextro.

FIGURA NONA.

Compositae cartilagine laryngis, à latere dextro.

a Epiglottis.

b c d Cartilago thyreoidea. c: c Processus superiores. d Processus inferior, cricoideam comprehendens.

e Cartilago cricoidea.

A priori parte inter cartilaginem thyreoideam & cricoideam videri alicui posset indicatum esse ligamentum, quo colligatae inter se.

FIGURA DECIMA.

Cartilago cricoïdea, à parte posteriore.

a: a Capitula, quibus cartilagine arytaenoidae mobilibus articulis insident.
b: b Sinuatae partes, à quibus cricoarytaenoidi postici oriuntur. Inter quas
eminet c.

FIGURA UNDECIMA.

Laryngis mediae per longitudinem aequaliter dissectae pars dimidia dextra, ex
interiore parte exhibita.

a a b c Cartilago thyreoïdea. b Processus superior. c Hac parte secta est.
d e e Cartilago cricoïdea. e, e His partibus secta.

f Epiglottis.


g g Membrana, è qua latera fistulae laryngis, & glottidis.

h Cartilago arytaenoida, membrana mododicta vestita.

i Ventriculus laryngis dexter.


FIGURA DUODECIMA.

Cartilago arytaenoida.



TAB.

XXXXIII.



T A B U L A XLIII.

FIGURA PRIMA.

Sceletus à parte priore.

a a a Os frontis.

b Sutura coronalis.

c Os verticis dextrum.

d Sutura squamosa.

e f g Os temporis dextrum. e Os squamosum. f Processus mammillaris. g Processus zygomaticus.

h Processus lateralis maximus ossis multiformis.

i: ii Offa jugalia.

k: k Processuum lateralium ossis multiformis partes, quae ad foramina oculorum pertinent.

l Processus tenuis ossis multiformis. In eoque foramen, per quod nervus opticus penetrat, arteriaque à carotide interna ad oculum pertinens.

m Os planum.

n Os unguis.

o Ossis maxillaris superioris pars ad fundum foraminis oculi pertinens.

In foramine oculi dextri indicata quoque foramina, sed obscure: quae planiora in figura 1. tabulae XLVI.

p Os nasi.

q r Septum narium. q Interstitium ossis cribriformis. r Vomer.

s An indicatum os spongiosum inferius finistrum?

t: t Offa maxillaria superiora.

u Processus pterygoideus dexter ossis multiformis.

Suturac exiliores melius & facilius cognoscentur ex figura 1. tabulae XLVI.

v Maxilla inferior.

Dentes in utraque maxilla satis apparent.

w, x, y, z, α Colli vertebrae inferiores quinque.

β γ: δ ε ε Dorfi vertebrae superiores duae. γ, ε, ε Processus transversi.

ζ η θ: ι λ μ Sternum. ζ Os superius. η, θ, ι, κ ossa quatuor, quae adultiori aetate confluent in os unum, sterni medium. λ Os cartilaginis mucronatae.

μ Cartilago mucronata.

ν ν, ξ, ο Dorfi vertebrae inferiores tres.

π, ς, σ, ς, ς Lumborum vertebrae quinque.

υ Ligamentum, quod inter corpus primae lumborum primaeque sacri intercedit, eaque connectit inter se. Cujusmodi quoque inter corpora reliquarum vertebrae.

φ Os sacrum.

Quinque particulas, & quatuor utrimque absoluta foramina magna ex parte in hominibus habere solet. Ossium examine.

χ χ ψ: χ χ ψ Costae primae. ψ Extremum cartilagineum.

ω ω Γ: ω ω Γ Costae secundae. Γ Extremum cartilagineum.

Δ Δ Δ Θ: Δ Δ Δ Θ Costae tertiae. Θ Extremum cartilagineum.

Λ Λ Λ Ζ: Λ Λ Λ Ζ Costae quartae. Ζ Extremum cartilagineum.

Π Π Π Π Σ: Π Π Π Π Σ Costae quintae. Σ Extremum cartilagineum.

T t

Φ Φ Φ Φ Ψ:

ΦΦΦΦΨ:ΦΦΦΦΨ Costae sextae. Ψ Extremum cartilagineum.

ΩΩΩΑΑ:ΩΩΩΑΑ Costae septimae. ΑΑ Extremum cartilagineum.

ΒΒΒC:C:C Costae octavae. C Extremum cartilagineum.

ΔΔΔΕΕ:ΔΔΔΕΕ Costae nonae. ΕΕ Extremum cartilagineum.

F, &c. Lateſcentia, inque unum confluentia extrema cartilaginea harum costarum.

In ſuis picturis oſcitantur praetermittunt contextum illum elegantiffimum, quem in hominibus, non autem in ſimiis ſpuriarum costarum cartilagineſ in vicem efficiunt, quemque Galenus nobis innuit, quando ſpuriarum costarum cartilagineſ invicem, & cum ſepto tranſverſo connaſci docuit: oſſium examine. Quem contextum, quemadmodum invenire ſolitus ſim, expreſſi in ſceleti hominis tabula 1.

ΓΓΓΓΗ:ΓΓΓΓΗ Costae decimae. Η Extremum cartilagineum.

ΙΙΙΙΚ:ΙΙΙΙΚ Costae undecimae. Κ Extremum cartilagineum.

ΛΛΛΜ:ΛΛΛΜ Costae duodecimae. Μ Extremum cartilagineum.

N:N Claviculae.

Cerni connexiones claviculae cum ſuperiore, ac laterali ſinu ſterni, & cum ſuperiore ſcapulae proceſſu, utrobique media cartilagine, Lanciſius tradit. Cerni ipſas etiam cartilagineſ voluerit, nec ne voluerit, non ita perſpicuum eſt. In icone non apparent.

ΟΟΟΡΡ:ΟΟΟΡΡ Scapulae. Ρ Proceſſus coracoideus. Ρ Proceſſus ſuperior.

ΡΤΤΥΥΖΥΖ 123:ΡΤΤΥΥΖ 123 Oſſa humerorum. ΡΤ Epiphyſis ſuperior. Ρ Caput cum ſcapula commiſſum. Σ Capitis ſuperioris tuber inaequabile majus. Τ Ejusdem minus. Υ Sinus, per quem ducitur tendo capitis longioris bicipitis brachii. Χ Sinus, per quem recipitur caput ſuperius radii, quo tempore cubitus inſigniter ſectitur. Υ Sinus, per quem recipitur ulnae caput ſuperius, quo tempore cubitus admodum ſectitur. Ζ Rotula, cum qua ulna committitur. 1 Caput, cum quo radius committitur. 2 Condylus minor, 3 major.

456:556 Ulnae. 4 Pars, cui brachialis internus inferitur. 6 Epiphyſis, continens capitulum inferius, & proceſſum ſtyloideum.

78910:7910 Radii. 7 Capitulum, quo cum humero & ulna committitur. 8 Tuberculum, ad cujus partem poſterioſem deſinit tendo bicipitis brachii: ad priorē inſectitur, quo tempore manum convertimus in pronum. 10 Epiphyſis inferior.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18:11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 Carpi. 11. Os naviculare. 12 Lunatum. 13 Triquetrum. 14 Subrotundum. 15 Cuneiforme. 16 Capitatum. 17 Multangulum minus. 18 Multangulum majus.

19:19 Pollicum oſſa metacarpi.

20:20 Oſſa prima pollicum manuum.

21:21 Oſſa ultima pollicum manuum.

22 Os ſeſamoideum, appoſitum ad articulum pollicis cum metacarpo ſuo.

23, 23, 23, 23:23, 23, 23, 23 Metacarpi. 24 Epiphyſis inferior: quae itidem in reliquis.

25, 25, 25, 25:25, 25, 25, 25 Digitorum oſſa primi ordinis.

26, 26, 26, 26:26, 26, 26, 26 Digitorum oſſa ſecundi ordinis.

27, 27, 27, 27:27, 27, 27, 27 Digitorum oſſa tertii ordinis.

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34:28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Oſſa coxarum. 28 29

30 Os ilium: cujus 29 criſta, 30 tuberculum, a quo rectus cruris oritur.

31 32 Iſchion: cujus 32 tuber. 33 Os pubis. 34 Foramen magnum.

35 Synchronodrosis ossium pubis.
 36:36 Ligamenta, quibus perficiuntur orae acetabulorum.
 37 38 39 40 41 42 43:37 38 39 40 41 42 43 Ossa femorum. 37 Epiphysis superior, quae est caput cum acetabulo commissum. 38 Collum. 39 Trochanter major. 40 Trochanter minor. 42 Condylus exterior. 43 Condylus interior.

44:44 Patellae.

45 46 47 48 49:45 46 47 48 49 Tibiae. 45 Epiphysis superior indicata ab hac parte. 46 Tuberculum, ad quod ligamentum à patella pertinet: sive potius, ad mentem, ut videtur, Eustachii, pars tendinis communis extensorum genu. 48 49 Epiphysis inferior. 49 Malleolus internus.

50 51 51:50 51 52 Fibulae. 50 Epiphysis superior. 52 Epiphysis inferior.

53, 54, 55, 56, 57, 58, 60:53, 54, 54, 56, 57, 58, 59, 60 Tarsi. 53 Talus. 54 55 Calcaneus: cujus 55 eminentia, qua cervix tali sustinetur. 56 Naviculare. 57 Cuneiforme majus. 58 Cuneiforme minus. 59 Cuneiforme medium. 60 Cubiforme.

Numeri 85, 23, quibus os *naviculare* designatum Lancisii in explicatione, designant cuneiforme magnum, 57 pedis dextri: at juxta naviculare tamen, ut aberrare numeros censei possit.

Iisdem illis numeris, 85, 23, quos modo dixi cuneiforme magnum designare, *cuboïdes* in eadem explicatione designatum. *Cuboïdes* autem hoc in pede dextro est, cui 60 inscripti.

61, 61, 61, 61, 61:61, 61, 62 Metatarsi. 62 Digiti minimi.

63, 63, 63, 63, 63:63, 63, 63 Ossa primi ordinis pollicum pedum, ac digitorum parvorum.

64:64, &c. Ossa secundi ordinis digitorum parvorum pedum.

65, 65, 65, 65, 65:65, 65, 65 Ossa ultima pollicum pedum, eademque, hoc est, ordinis tertii, digitorum parvorum.

FIGURA SECUNDA.

Secunda & tertia exhibent partes duas ossis temporis dextri, per longitudinem ossis petrosi bifariam dissecti. Secunda autem exhibet partium illarum inferiorem, à superiori parte: tertia superiorem, ab inferiore.

a Porus acusticus.

Hic, a, l, videtur permutatio facta fuisse numerorum in Lancisii explicatione. Nam numeri hi, 72, 13, quibus *processus mastoïdaeus* designatus, designant *meatus auditorium* a: hi vero, 72, 16, quibus designatus *meatus auditorius*, designant *processum mastoïdaeum* l.

b Tympanum.

c Videtur esse cochlea dissecta.

d Vestibulum.

e Ostium canalis semicircularis inferioris ejusdemque majoris, in vestibulum patens.

f Sectio canalis semicircularis ejusdem.

g Sectio aquaeductus Fallopii.

h h Cavernulae processus mammillaris.

i i Squama, quae processui styloformi ossis temporis affidet.

k Processus styloformis ossis temporis.

Quoniam extremus hic mucro à squama, quae processui styloformi affidet,

T t 2

det, totus distinctus apparet, is potius ad processum styloformem pertinere visus, quam eminentia, quam Lancisius numeris 69. 13. *principium processus styloidis* esse designat: utpote quae ex parte quidem distincta est, non autem ad radicem suam, non, ut styloformis est: nisi minus curiosus hic Eustachius fuerit. Utrumvis autem verum sit, non magnopere contendo, praefertim quum inter secundarias iconis partes haec habenda esse videatur.

1 Processus mammillaris.

Vide annotationem ad a.

m n Osse mammillaris, m pars exterior, n interior.

o Locus canalis communis in osse petroso, excipientis nervos acusticos, portionem mollem & duram.

FIGURA TERTIA.

Vide annotationem ad secundam.

Egregie Morgagnus epistola anatomica xii. §. xxix.

a Porus acusticus.

b Tympanum.

c Processus mammillaris pars interior, eaque cavernulosa.

d Vestibulum cum cochlea.

Circa hunc b e d locum invenio tympani & labyrinthi partes, ubi *porositates ossis petrosi* in Lancisii explicatione designatae numeris 72. 50.

f Sectio aquaeductus Falloppii.

g Sectio canalis semicircularis inferioris ejusdemque majoris. Eadem, quae f figurae 11.

h Canalis communis ossis petrosi, per quem nervi acustici, portio mollis & dura, ad interiora auris penetrant.

i Extremitas canalis mododicti pars ad cochleam & vestibulum pertinens: ad quam partem portio mollis pertinet.

k Extremitas canalis ejusdem pars, ad quam portio dura pertinet. Quae portio deinde penetrat per foramen, quo pars haec extrema canalis perforata est.

l Eminentia intermedia.

Quintum nervorum cerebri jugum ex duobus tantum nervis, ut alii arbitrantur, minime constat, sed duas utrimque propagines inaequales habet, quarum major secundum longitudinem, instar semicirculi, eleganter excavatur, minoremque, quod alios fugit, amice suscipit & amplectitur, eoque modo ambae simul junctae oblique in anteriorem & exteriorem partem, usque ad extremum sinus h in osse petrae simili earum gratia exsculpti, procedunt; ubi minor propago a majore recedens, parvum foramen, juxta k, sibi paratam invenit, & ingreditur, mireque admodum flexuoso incessu, de quo nunc loqui non est opportunum, extra calvariam elabitur; major autem propago videtur in portiones parum invicem distantes terminari, ex quibus praecipua exiguo foramine, in cochleatum os pervio, obducitur: sed num instar operculi eidem tantum incumbat; an vero alie penetret, & in spiras ejus ossis convolvatur, propter difficultatem administrationis, certo explorare adhuc non potui.

De auditus organis.


m Canalis, per quem penetrat arteria carotis interna, cum nervi intercostalis ramis duobus o, π figurae 11. tabulae xviii.

n Tuberculum, & o sinus, pro articulo maxillae inferioris.

p Processus zygomaticus.


q Os squamosum.

T A.



TAB.

XXXXIV.



TABULA XLIV.

FIGURA PRIMA.

Sceletus à parte posteriore.

a: a Offa verticis.

b Sutura sagittalis.

c Os occipitis.

d d Sutura lambdiformis.

e Additamentum futurae lambdiformis. Juxta foramen est in osse temporis.

fg h Os temporis. f Processus mamillaris. g Processus zygomaticus. h Os squamosum.

i Sutura squamosa.

k Sutura coronalis.

l Os frontis.

m Processus lateralis maximus ossis multififormis.

nn Os jugale.

oo Os maxillare superius.

Suturæ exiliore melius cognoscentur ex figura III. tabulae XLVI.

pp Maxilla inferior. Cujus partes melius cognoscentur ex figura V. tabulae XLVII.

qr stt Atlas. r s Pars corporis sinistra, cum qua r à superiore parte processus coronoideus ossis occipitis committitur: s ab inferiore, corporis epistrophæi pars sinistra. t, t Processus transversi.

u v w w Epistrophæus. u Spina. v, v Processus obliqui inferiores. w, w Processus transversi. Ex hac facile intelliguntur sequentium colli partes.

x, y, z, α, β Colli vertebrae: x quinta, y quarta, z tertia, α secunda, β prima.

γ δ ε ε Dorfi vertebra duodecima. γ Spina. δ, δ Processus transversi. ε, ε Processus obliqui inferiores. Ex hac reliquarum dorfi partes intelliguntur.

ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π Dorfi vertebrae: ζ undecima, η decima, θ nona, ι octava, κ septima, λ sexta, μ quinta, ν quarta, ξ tertia, ο secunda, π prima.

ρ σ στ τ υ υ Lumborum vertebra quinta. ρ, ρ Processus obliqui superiores.

σ, σ Processus transversi. τ Spina. υ, υ Processus obliqui inferiores. Ex hac lumborum reliquarum partes intelliguntur.

φ, χ, ψ, ω Lumborum vertebrae: φ quarta, χ tertia, ψ secunda, ω prima.

Γ Δ Δ Θ Θ Δ Α Os sacrum. Γ Spinæ ejus tres. Δ, Δ Processus obliqui superiores.

Θ: Θ Foramina posteriora, ab utroque latere quatuor. Α Hiatus, in quem canalis ossis sacri definit. Α Processus obliqui inferiores, à latere hiatus mododicti.

Quinque particulas, & quatuor utrimque absoluta foramina magna ex parte in hominibus habere solet. Ossium examine.

B Coccygis ossicula quatuor.

C C: C C: & c. Costæ cum extremis suis cartilagineis: CC: CC primæ, DD: DD secundæ, EE: EE tertiæ, FFF: FFF quartæ, GGG: GGG quintæ, HHH: HHH sextæ, II: II septimæ, KK: KK octavæ, LL: LL nonæ, MM: MM decimæ, N: N undecimæ, O: O duodecimæ.

V v v

P Q R S T U:

PQRSTU: PQRSTU Scapulae. Q Spina. R S Processus superior. S Epiphysis. T Processus coracoideus. U Cervix.

Os S, quod Eudemus, teste Russo, acromion appellat, perexiguum est, & claviculae scapulae connectit, spinaeque ejusdem scapulae a calumniatoribus creditur esse appendix, in pueris exactissima profecto cartilago est, quae licet procedente aetate ossea evadat, nihilominus, ut sere semper observo, usque ad decimum octavum annum, contra morem caeterorum ossium, multum ejus substantiae retinet, & nunquam cum scapulae ipsius spina adeo connascitur, ut in media aetate parva occasione, quemadmodum Galeno in palaestra contigit, luxari non possit. Ossium examine.

V W X X Y Z: V W Y Z Offa humerorum. V Caput superius. X X Epiphysis inferior. Y Condylus major, Z minor.

1 2 3: 1 2 3 Ulnae. 1 Olecranon. 3 Epiphysis inferior: in qua capitulum, & processus styloides.

4 5 6: 4 5 6 Radii. 5 Capitulum superius. 6 Epiphysis inferior.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Carpi. 7 Os subrotundum.

8 Triquetrum. 9 Lunatum. 10 Naviculare. 11 Multangulum majus. 12 Multangulum minus. 13 Capicatum. 14 Cuneiforme.

15, 15, 15, 15: 15, 15, 15, 15 Metacarpi. 16 Epiphysis interior, in singulis ossibus indicata.

17, 17, 17, 17: 17, 17, 17, 17 Digitorum ossa primi ordinis.

18, 18, 18: 18, 18, 18 Digitorum ossa secundi ordinis.

19, 19, 19: 19, 19, 19 Digitorum ossa tertii ordinis.

20: 20 Offa metacarpi pollicum.

21: 21 Offa prima pollicum. In manu dextra indicatum sesamoideum articulo ossis primi cum metacarpo appositum.

22: 22 Offa ultima pollicum.

23 24 25 26 27 28 29: 23 24 25 26 27 28 29 Offa coxarum. 23 24 Os ilium: cujus 24 crista. 25 26 27 Ischion: cujus 26 acutus processus, 27 tuber. 28 Os pubis. 29 Foramen magnum.

30 31 32 33 34 35 35 36: 30 31 32 33 34 35 35 36 Offa femorum. 30 Epiphysis superior, quae est caput, quo cum acetabulo committitur. 31 Collum. 32 Trochanter major. 33 Trochanter minor. 35 35 36 Epiphysis inferior: in eaque 35, 35 condyli, & 36 sinus inter condylos.

37 38 39: 37 38 39 40 Tibiae. 37 Epiphysis superior. 39 40 Epiphysis inferior: in qua 40 malleolus internus.

41 42 43: 41 42 43 Fibulae. 42 Epiphysis superior. 43 Epiphysis inferior: quae ad malleolum externum pertinet.

44, 45, 46, 47, 48, 49: 44, 45, 46, 48 Tarsi. 44 Talus. 45 Calcaneus. 46 Cubiforme. 47 Naviculare. 48 Cuneiforme medium. 49 Cuneiforme minus.

50, 50, 50, 50: 50, 50, 50 Metatarfi. 51 Indicata epiphysis anterior.

52, 52: 52, 52 Offa primi ordinis digitorum parvorum.

53, 53: 53 Offa secundi ordinis digitorum parvorum.

54: 54 Offa tertii ordinis digitorum parvorum.

FIGURA SECUNDA.

Frustum ossis petrosi dextri, in quo sunt canales semicirculares tres. Ab ea parte exhibitum, qua cerebellum spectat.

a b c d Canales semicirculares tres, per longitudinem effracti.

a Ca-


- a Canalis semicircularis inferior idemque major.
- b Canalis semicircularis superior idemque minor.
- c Hic in extremum commune conveniunt inferior & superior.
- d Canalis semicircularis medius idemque minimus.

Lancisius primum hac in figura *serpentinum, ac spiralem labyrinthi ductum apparere* tradiderat. Deinde autem in emendationibus explicationi suae tabularum Eustachii adjectis, *aquaeductum demonstrari*. Atque hoc visum quoque fuerat Morgagno, traditumque ab eo in epistola anatomica I. §. XCIII. Qui etiam refert in epistola anatomica XII. §. XXVIII. *deinde se ex Valsalvae schedis, & Lancisii emendationibus animadvertisse, id jam utrique horum placuisse*. Postea autem, quum Casselbohmius in tractatu v. de aure humana §. CCXIII. non aquaeductum exhiberi, sed tres canales semicirculares, monuisset, singulosque in explicatione figurae VII. tabulae suae IV. indicavisset, Morgagnus, ut decet viros summos, veritatisque amatores, id non agnovit modo candide, sed pleniore etiam explicatione confirmavit, in epistola mododicta anatomica XII. Quod quamvis ad institutum harum annotationum pertineat, eo tamen libentius commemoro, quod in magna laude ponendum est.


FIGURA TERTIA.

- Os petrosum dextrum a, cum mammillari b, ex parte interiore.
- c, d e Canales semicirculares, per longitudinem effracti. c Inferior idemque major. d Superior idemque minor. e Hic in extremum commune conveniunt.
- f Introitus canalis communis nervorum acusticorum, portionis mollis & durae. Hi numeri, 74. 49, designant introitum canalis communis nervorum acusticorum. *Canalis autem semicircularis major*, qui in Lancisii explicatione iis designatus, is est, cui c inscripsi.
- g Sinulus, qui in junioribus pertinet usque ad canalem semicircularem superiorem eundemque minorem: atque etiam ulterius sub eo. Hi numeri, 75. 49, quibus *canalis semicircularis minor* in Lancisii explicatione designatus, designant sinulum, qui in junioribus pertinet usque ad canalem semicircularem superiorem eundemque minorem, ulteriusque sub eo: ut exhibui in iconibus ossium foetus humani, tabulae XII. figurae XIX. t. Canalis autem semicircularis minor est omnino, d cui inscripsi.
- h Sinus, cui sinus lateralis meningis crassae insidet.
- iii Ora, qua os hoc connectitur cum osse occipitis & verticis.
- kk Ora, quae pertinet ad foramen cranii, per quod sinus lateralis meningis crassae penetrat, cum octavi paris nervo cerebri, spinalique recurrente.
- ll Ora, qua connectitur cum anteriore parte ossis occipitis. Praeterea inter k & k Morgagnus, epistola anatomica XII. §. XXVIII, os indicat, quo *diverticulum venae jugularis internae operitur*.





TAB. XXXXV.



T A B U L A XLV.

FIGURA PRIMA.

Sceletus à latere.

a Os occipitis.

b Sutura lambdiformis.

c Additamentum suturae lambdiformis.

d Os verticis.

e Sutura coronalis.

f Sutura squamosa.

g h i k Os temporis. g Os squamosum. h Processus mamillaris. i Porus acusticus. k Processus zygomaticus.

l Processus lateralis maximus ossis multiformis.

m m Os frontis.

n Os jugale.

o Os planum.

p Os unguis.

q Os nasi.

r s Os maxillare superius. r Pars ejus ad fundum foraminis oculi pertinens.

t Maxillâ inferior. Cujus partes intelliguntur ex figura v. tabulae XLVII.

uu Atlas.

v w x Epistropheus. v Processus transversus: in quo foramen pro arteria & vena vertebrali. w Processus obliquus inferior. x Spina. Ex hac intelliguntur partes respondentes sequentium colli.

y z, α, β, γ, δ Colli vertebrae inferiores quinque. z Processus obliquus superior: qui & in sequentibus.

ε ζ η θ Vertebra dorsi duodecima. ε:ε Processus transversi. ζ Processus obliquus inferior. η Corpus. θ Spina. Ex hac quoque intelliguntur sequentium dorsi partes eadem.

ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ς, σ, τ Dorsi vertebrae. ς Processus obliquus superior: qui etiam in cacteris.

τ, υ, φ, χ, ψ, ω Γ Γ Δ, Θ Vertebrae lumborum quinque. χ:χ Secundae (ex qua reliquarum partes intelligi possunt) processus obliqui superiores. ψ:ψ Processus transversi. ω Spina. Γ:Γ Processus obliqui inferiores. Δ Corpus.

Λ Ligamentum inter corpora vertebrarum intercedens, aliaque aliis alligans. Talia quoque inter reliquas lumborum & dorsi.

Ξ Π Π Σ Os sacrum. Ξ Spinae. Π:Π Foramina posteriora. Σ Hiatus, in quem canalis sacri definit.

Quinque particulas, & quatuor utrimque absoluta foramina magna ex parte in hominibus habere solet. Ossium examinae.

Φ Coccygis officula quatuor.

Ψ Ω ABC: Ψ Ψ Ω ABCDD Ossa coxarum. Ψ Ω Os ilium: cujus Ω crista. ABC Ischion: cujus B processus acutus, C tuber. DD Os pubis.

EFGHIKKL: EFGHIKKL Ossa femorum. E Caput, quo cum acetabulo committitur. F Collum. G Trochanter major. H Trochanter minor. KKL Epiphysis inferior: quae continet KKL condylos; quorum partes K, K ad articulum cum tibia pertinent.

M: M Patellae,

Xx x

NOPP:

NOPP: NOP Tibiae. N Epiphysis superior. P. Epiphysis inferior, malleolum internum continens.

QRS: QRS Fibulae. R Epiphysis superior. S Epiphysis inferior, malleoli externi partem maximam continens.

TTVWXYZ 1: TVWXY Tarfi. T Talus. V Calcaneus. W Cubiforme. X Naviculare. Y Cuneiforme majus. Z Cuneiforme medium, 1 Cuneiforme minus.

2, 2, 2, 2, 2: 2, 2, 2, 2, 2 Metatarfi. 3 Epiphysis anterior.

44: 4 Offa primi ordinis digitorum parvorum.

5 5: 5 Offa secundi ordinis digitorum parvorum.

6 Offa tertii ordinis digitorum parvorum.

7 Offa sesamoidea, apposita ad articulum pollicis cum suo metatarfi osse.

8 Os primum pollicis.

9 Os ultimum pollicis.

10, &c. Costae cum extremis suis cartilagineis: 10: 10 10 primae, 11: 11 11 11 secundae, 12 12 12: 12 12 12 tertiae, 13 13 13: 13 13 13 quartae, 14 14 14: 14 14 14 quintae, 15 15 15: 15 15 15 sextae, 16 16: 16 16 16 septimae, 17 17: 17 17 17 octavae, 18 18: 18 18 18 nonae, 19 19: 19 19 decimae, 20: 20 20 undecimae, 21: 21 duodecimae.

Quod Lancisius *luculenter apparere tradit, per cartilaginem fieri costarum, praesertim vero sinistri lateris, cum spina articulationem*, hoc, si modo in icone apparere vult, apparere in ea non invenio.

22 22 22 23 24 Sternum. 23 Os cartilaginis mucronatae. 24 Cartilago mucronata.

25: 25 Claviculae.

In icone alteram claviculae extremitatem cum superiore scapulae processu adnecti, quod Lancisius tradit, apparet: non autem, *per cartilaginem adnecti*.

26 26 27 28 29: 26 26 27 28 Scapulae. 27 Spina. 28 Processus superior. 29 Cervix.

31 32 33: 31 32 34 Offa humerorum. 31 Epiphysis superior, caput continens, quo cum scapula committitur. 33 Capitulum, cum quo radius committitur. 34 Condylus major.

35 36 37: 35 36 37 Ulnae. 35 Olecranon. 37 Epiphysis inferior, continens capitulum & processum styloideum.

38 39 40: 39 40 Radii. 38 Capitulum, quo cum osse humeri & ulna committitur. 40 Epiphysis inferior.

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Carpi. 41 Os naviculare. 42 Lunatum. 43 Triquetrum. 44 Subrotundum. 45 Cuneiforme. 46 Capitatum. 47 Multangulum minus. 48 Multaogulum majus.

49: 49 Offa metacarpi pollicum. 50 Epiphysis inferior.

51: 51 Offa prima pollicum.

52: 52 Offa ultima pollicum.

53, 53, 53, 53: 53, 53, 53, 53 Metacarpi. 54 Epiphysis inferior.

55, 55, 55, 55: 55, 55, 55, 55 Offa primi ordinis digitorum manuum.

56 56: 56 56 Offa secundi ordinis digitorum manuum.

57 57: 57 57 Offa tertii ordinis digitorum manuum.

FIGURA SECUNDA.

Os temporis dextrum, à quo resectum os squamosum, porique acustici pars anterior. Tympanum apertum, effractaque per longitudinem cochlea, ac canalis semicircularis superior idemque minor.

a Porus acusticus.

bb Tympanum.

c Fenestra ovalis.

Foramen, cui triangulum ossiculum praeest. De auditus organis.

d Fenestra rotunda: ut videtur.

eeff Còchlea, ee hac parte effracta. Effracta pars in principio cochleae amplior exhibita, & tanquam in duos angulos migrans. Juxtaque eorum alterum, qui fenestrae rotundae d propior, cochleae capacitas ad fenestram illam pertinet: juxta alterum, ad vestibulum. De cochlea vide epistolam de auditus organis.

g An pars aquaeductus Falloppii? Quae pars in infantibus meninge crassa superinducta clauditur; posteaque superincrefcente squama ossa.

Vide iconum mearum ossium foetus tabulae III. figurae XIX. f, g.

h Canalis semicircularis superior idemque minor.

iii Hinc resectum os squamosum.


kk Os petrosum. In quo, à dextro latere litterae k superioris, expressa pars canalis, per quem arteria carotis interna & nervi intercostalis rami penetrant.

l Os mammillare.


m Processus mammillaris.

n Squama, quae processui styloformi ossis temporis assidet.

Lancisius principium esse tradit processus styloformis. An fortasse squamam styloformi accensuit?



TAB. XXXXVI.



TAB. XXXVI.

T A B U L A XLVI.

FIGURA PRIMA.

- a: **O**ssa verticis.
 b Sutura sagittalis.
 c c e Sutura coronalis. c c Pars, quae sutura vera est. d e Pars, quae squamosa.
 f Sutura communis ossi verticis cum multiformi.
 g Sutura squamosa, osse squamoso ossi verticis assidente.
 h Sutura vera, communis ossi verticis cum osse temporis.
 i k l m n p Os temporis. i Os squamosum. k Processus mammillaris. l Processus styliformis. m Squama, quae est ante styliformem. n Porus acusticus. p Processus zygomaticus.

Os, quod petram referre dicitur, in hominibus duas apophyses habet, quarum altera papillae mammillarum adamussim similis est, altera vero stylum seu columnam suam proceritate eleganter imitatur. Ossium examine.

- q Sutura communis processui zygomatico cum osse jugali.
 r Sutura communis ossi squamoso cum multiformi.
 s Processus lateralis maximus ossis multiformis.
 t u v w x x y z z Os frontis. t Pars ad tempus pertinens. u: u Partes ad frontem & synciput pertinentes. w Sutura sagittalis mediam frontem ad nasum usque secans. x: x Foramina superciliorum: quorum sinistrum integrum est, dextrum ex parte deficit. y Sutura communis ossi frontis cum jugali. z: z Ossis frontis partes ad lacunaria foraminum oculorum pertinentes.

α: α Suturae communes ossi frontis cum ossibus nasi.

β: β Ossa nasi. Inter quae sutura eis communis.

γ Sutura communis ossi maxillari superiori cum osse nasi.

δ Sutura communis ossi frontis cum processu ossis maxillaris superioris ad nasum pertinente.

ε Os unguis.

ζ Sutura communis ossi unguis cum osse frontis.

η Sutura communis ossi unguis cum plano.

θ Sutura communis ossi unguis cum osse maxillari superiore.

ι Sutura communis ossi plano cum maxillari superiore.

κ Os planum.

λ Sutura communis ossi plano cum osse frontis.

μ Processus tenuis ossis multiformis, suturaque ei cum osse frontis communis.

ν Foramen, per quod nervus opticus penetrat, cum arteriola à carotide interna, ad oculum pertinente.

ξ Sutura communis ossi frontis cum jugali & multiformi. In sinistro latere inter π & z sutura communis ossi frontis cum jugali: inter ε & z, cum processu laterali maximo multiformis.

ο Fissura, quae inter ossis multiformis processum tenuem, lateralemque maximum, atque os frontis, relinquitur.

π: π Ossa jugalia, qua parte ad foramina oculorum pertinent.

ε: ε Processus laterales maximi ossis multiformis, quibus partibus ad foramina oculorum pertinent.

T γ γ

In-

Inter ρ & sinistram π Sutura communis ossi jugali cum processu laterali maximo multiformis.

$\sigma\sigma$ Os maxillare superius, quae parte ad fundum foraminis oculi pertinet.

τ Fissura, quae est inter os maxillare superius, multiforme, & jugale.

υ Patens pars canalis, qui per fundum foraminis oculi, à posteriori parte in priorem ductus.

ϕ Suturae species, quae squama ossis, quae canalis mododictus υ à superiore parte perficitur, cum reliquo ossis maxillaris conjungitur.

$\chi:\chi$ Ossa jugalia, à parte exteriori.

Nec silentio praetereundum est, os jugo simile χ p, quae parte a malis procedit, in homine tenue conspici, & ut Galenus diligenter admonuit, sutura in medio dirimi q. Ossium examine.

$\psi:\psi$ Suturae communes ossibus jugalibus cum maxillaribus superioribus.

ω Processus pterygoideus ossis multiformis.

ABC: ABCD Ossa maxillaria superiora. B Foramen, quod est exitus canalis υ supradicti. C Sutura, quae est continuatio suturae supradictae ϕ , circum oram foraminis oculi ductae. D Pars ad interiora nasi pertinens. Dentes apparent.

E Sutura communis ossibus maxillaribus superioribus.

FG Septi narium pars ossis, constans ex F vomere, & G interstitio ossis cribriformis.

FIGURA SECUNDA.

Simiae.

a Os verticis dextrum.

b Sutura squamosa, communis ossi squamoso cum osse verticis.

cde Os temporis dextrum. c Os squamosum. d Porus acusticus. e Processus zygomaticus.

Apophysis, quae papillae mammillarum adamussim similis est, in simia nullum propemodum vestigium cernitur. Ossium examine.

f Os jugo simile in simia medium linea potius, quam sutura distinguitur. Ossium examine.

g Processus lateralis maximus ossis multiformis.

h Sutura communis processui laterali maximo multiformis cum osse frontis.

i Sutura communis ossi squamoso cum osse frontis.

k Sutura coronalis.

lmnn Os frontis. l Pars, quae ad temporis sinum pertinet. m Pars, quae ad frontem & synciput. n:n Partes, quae ad lacunaria foraminum oculorum.

o Os unguis.

p Sutura ossi unguis communis cum osse frontis.

q Sutura ossi unguis communis cum plano.

r Os planum.

s Sutura ossi plano communis cum osse frontis.

t Processus tenuis ossis multiformis.

u:uu Suturae ossibus jugalibus communes cum osse frontis.

v:vw Ossa jugalia. v Pars exterior, w pars ad foramen oculi pertinens.

Nec silentio praetereundum est, os jugo simile, quae parte a malis procedit, in homine tenue conspici, & ut Galenus diligenter admonuit, sutura in medio

dis

dio dirimi, quorum neutrum simiae competis, in qua ejusmodi os v f crassum est & robustum, & medium linea potius f, quam sutura distinguitur. Ossium examine.

x Sutura ossi jugali communis cum maxillari superiore.

y Os maxillare superius.

z Foramina aliquot, ubi in homine unum esse solet.

a Sutura, quae inter caninum & proximum sibi incisorem ducta palatum intersecat. Ossium examine.

β Sutura ossi nasi communis cum maxillari superiore.

γ Os nasi.

Ossa nasi non quadrangula, sed triangula plerumque existunt, saepissime etiam unum os tantum pro duobus superiorem nasi partem efformat, quod etiam interdum transversa linea medium dissecat. Ossium examine.

δ Sutura ossi nasi communis cum osse dentes, qui secant, continente.

ε ε Os, quod dentes, qui secant, continet.

ζ η θ ι κ Maxilla inferior. η Simia homini simillima hac parte nihil penitus ab eo discrepat, & in ipsius maxillae extremo divisio non semper est quaerenda: ossium examine. θ Foramen, per quod penetrant rami arteriae venae & nervi. ι Capitulum, quo cum osse temporis committitur. κ Processus coronoides.

FIGURA TERTIA.

a Os frontis.

b Sutura coronalis.

c: c Ossa verticis.

d Ego eam suturam; quae sagittam imitatur (quamvis haec nemo animadvertit) frequenter deesse invenio, & paucis ante diebus in publico theatro, quindecim ejus formae calvarias ante oculos omnium cernendas & examinandas exposui, in quibus obelaea sutura penitus deest, nullumque vestigium sui ostendit, quamvis aliae suturae sint concinne & eleganter exsculptae. Ossium examine.

e Sutura lambdiformis.

f, f Officula, quae Wormiana vocantur.

Os, quod Λ litteram imitatur, non semel in bene conformato cranio multiformes suturas obtinet. Ossium examine.

g Os occipitis.

h Suturae lambdiformis additamentum.

i k l m n Os temporis. i Foramen juxta additamentum suturae lambdiformis.

k Processus mammillaris. l Processus styliformis. m Processus zygomaticus.

n Pars squamosa.

Per foramen penetrantem una cum vena, quam occipitem vocant, arteriam vidi, à ramo carotidis externae.

o Sutura ossi temporis communis cum osse verticis.

p Sutura squamosa.

q Sutura ossi squamoso communis cum processu laterali maximo multiformis.

r Processus lateralis maximus ossis multiformis.

s Sutura processui laterali maximo multiformis communis cum osse verticis.

t Sutura processui laterali maximo multiformis communis cum osse frontis.

u u Sutura ossi jugali communis cum osse frontis.

γ γ 2

v w

- v w Os jugale. v Pars exterior. w Pars ad sinum temporis pertinens.
 Inter v & m Sutura ossi jugali communis cum processu zygomatico ossis temporis.
 x x Os maxillare superius.
 y Processus aliformis ossis multiformis : obscure.

FIGURA QUARTA.

Os frontis ex interiore parte.

- a a Ora denticulata, qua cum ossibus verticis committitur, sutura vera.
 b : b Orae in squamas tenuatae, quibus ossa verticis subit, squamae modo.
 c : c Partes scabrae, quibus connectitur cum processibus lateralibus maximis ossis multiformis, & cum ossibus jugalibus.
 d : d Orae, quibus connectitur cum processibus tenuibus ossis multiformis.
 e : e Partes ad lacunaria foraminum oculorum pertinentes. Inter quas fissura, quam os cribriforme implet.
Frontis os in calvariae basis sede, qua ab osse euneum imitante, transversa potius linea, quam sutura distinguitur, ampla oblongaque scissura homines divisum obtinent, in quam os aliud instar cribri perforatum & anterioribus cerebri ventriculis, ut Galenus inquit, praelocatum conjicitur, arctissimeque stringitur. Ossium examine.
 f Pars inaequalis, cui os cribriforme adnectitur.
 g Sinus, cui sinus superior meningis crassae inhaeret.
 h h h Vestigia arteriarum & venarum, in meningem crassam ductarum.

FIGURA QUINTA.

Os temporis dextri ex interiore parte.

- a b b Os squamosum. b b Ora, qua cum osse verticis & processu laterali maximo multiformis connectitur.
 c Processus zygomaticus.
 d e f Os petrosum. e Canalis, in quem nervi auditorii penetrant, mollis cum duro. f Eminentium canalium semicircularium duorum indicia. Quorum alter, cui littera f inscripta, est inferior idemque major : alter, superior idemque minor.
 g h i Os mammillare. h Ora, qua cum osse verticis connectitur. i Ora, qua cum osse occipitis, ad suturae lambdiformis additamentum pertinens.

FIGURA SEXTA.

Idem os temporis ex interiore quoque parte, sed inversum.

- a b b c d e g h Eadem designant, quae in figura v.
 k *Linea minime alte penetrans, qua os, quod petram refert, exsculptum est.*
 De auditus organis.
 l Sub hac squama est extremum ossae partis tubae Eustachianae.
 m Exitus canalis, per quem arteria carotis interna penetrat, una cum nervi intercostalis ramis duobus, ϕ, π figurae 11. tabulae xviii.

FIGURA SEPTIMA.

Os verticis dextrum ex interiore parte.

a Ora denticulata, qua cum osse frontis connectitur.

bb Ora denticulata, qua cum osse verticis sinistro connectitur.

c Ora denticulata, qua cum osse occipitis connectitur.

d Ora denticulata, qua cum osse mammillari connectitur.

ef Ora exacuta: cujus parte e cum osse squamoso connectitur; parte f cum multiformis processu laterali maximo.

gg Vestigia arteriarum & venarum, quae in exteriorem partem meningis crassae ducuntur.

FIGURA OCTAVA.

a Sutura sagittalis.

b:b Foramina verticalia.

cc Sutura lambdiformis.

d *Neque enim advertunt os, quod Δ literam imitatur; non semel in bene conformato cranio multiformes suturas obtinere, interdumque vel transversa sutura dividi, vel gemina circumscribi, perinde ac si triangulus major minorem undique comprehenderet. Ossium examine.*

Reliqua respondent figurae *xxx*; ex qua index huc transferri potest.

FIGURA NONA.

Os occipitis ex interiore parte.

a:a Orae denticulatae, quibus cum ossibus verticis connectitur.

b:b Orae denticulatae, quibus cum ossibus mammillaribus connectitur.

c:c Orae, quibus cum ossibus petrosis leviter connectitur.

d Extremitas, quo connectitur cum osse multiformi.

e:e Partes, quae pertinent ad foramina, per quae sinus laterales penetrant, in venas jugulares internas migrantes.

f Exitus foraminis, per quod nervus linguae penetrat, qui noni paris cerebri est.

g:g Ostia foraminum, per quae venae vertebrales penetrant.

Horum foraminum alterum multo majus est altero. Habeo calvarias, quibus haec figura convenit: quam iis juvantibus & docentibus interpretatus sum.

h Foramen magnum.

i Eminentia à medio ossis pertinet ad foramen magnum. Obscurius quoque indicata vestigia sinuum lateraliū. Indicati & sinus, quibus globi cerebelli insident, & quibus lobi posteriores cerebri.

FIGURA DECIMA.

Respondet Vesalii figurae *xx*. capitis quinti libri primi de humani corporis fabrica, *primam non naturalem capitis figuram demonstranti, in qua anterior eminentia perit.*

Z z z

Ego

Ego miraculum me videre existimarem, si quis calvariam mihi ostenderet, in qua aut coronaria sutura, aut ea, quae Δ literae similis est, deficeret, aut illam inveniret, in qua utrisque his deletis, duae lineae, altera secundum capitis longitudinem, altera secundum aures protracta, instar \times calvariam interfecant; nisi forte a futuris, quae frequenter abolentur, deceptus ejus generis capita mihi objiceret; neque enim negarim, suturas frequenter constare, & ea occasione diversa serie dispensatas apparere, sed moneo, solere coalitum abolere suturas, sive capitis eminentiae depravatae sint, (haec enim, ut Hippocrates arbitratur, est praecipua hujus rei causa) sive naturalem constitutionem retineant. Ossium examine.

- a: a Osse verticis, deleta sutura coronaria, continuata ab utraque parte ossis frontis in partes duas per sagittalem ad nasi osse usque diviso.
 b Sutura sagittalis ad nasi osse usque pertinens.
 c Sutura lambdiformis.
 d Os occipitis.
 e Suturae lambdiformis additamentum.
 f Sutura ossis verticis cum osse mammillari communis.
 g h i k l m n Os temporis. g Pars mammillaris. h Processus mammillaris. i Processus styloformis. k Squama, quae ante styloformem est. l Osseus auris introitus. m Processus zygomaticus. n Os squamosum. Circa g foramen i figurae III.
 o Sutura squamosa, communis ossis verticis cum squamoso.
 p Sutura ossis squamoso cum multiformi communis.
 q Ossis multiformis processus lateralis maximus.
 r Sutura squamosa, processui laterali maximo ossis multiformis communis cum osse frontis.
 s Sutura processui laterali maximo ossis multiformis communis cum osse jugali.
 t t Sutura communis ossis frontis cum jugali, juxta caudam supercilii.
 u v Os jugale. n Pars ad temporis sinum pertinens.
 w Sutura communis ossis jugali cum processu zygomatico ossis temporis.
 x Sutura communis ossis jugali cum maxillari superiore.
 y Ossis maxillaris superioris pars ad fundum foraminis oculi pertinens.
 z Os planum.
 Inter y & z Sutura communis ossis maxillari superiori cum plano.
 a. Os unguis.
 Inter y & a Sutura communis ossis unguis cum maxillari superiore.
 Inter z & a Sutura communis ossis plano cum osse unguis.
 β Ossis frontis pars ad foramen oculi pertinens.
 Inter z & β Sutura ossis frontis communis cum plano.
 Inter a & β Sutura ossis unguis communis cum osse frontis.
 γ Foramen supercilii.
 δ Sutura ossis frontis communis cum processu ossis maxillaris superioris, qui ad nasum eminentem pertinet.
 ϵ Sutura communis ossis frontis cum osse nasi.
 ζ Os nasi.
 Inter ζ & η Sutura communis ossis nasi cum maxillari superiore.
 η ι κ λ Os maxillare superius. η θ Processus ad nasum eminentem pertinens: cujus θ pars ad canalem, quem nasalem vocant, pertinens. ι Sutura ossis huic propria, circum oram foraminis oculi ducta. κ Exitus canalis, qui per fundum foraminis oculi ducitur. Apparent dentes huic ossi infixi.

μ Pro-

μ Processus pterygoideus ossis multiformis.

FIGURA UNDECIMA.

Os multiforme una cum cribriformi & vomere, à parte posteriore.
 abccddeeffgghhiikkllmmnnnooppqqrr Os multiforme.
 a Paries pone sellam equinam erectus.
 b Basis pars postica inaequalis, qua cum osse occipitis conjungitur.
 c:c Foramina, per quae nervi optici penetrant, & arteriolae à carotidibus internis ad oculos pertinentes.
 de:de Processus tenues. e:e Processus clinoidei anteriores.
 fg:fg Fissurae, quae relinquuntur inter ossis multiformis processus tenues, processus laterales maximos, & os frontis. f Pars rotundior, per quam penetrant nervi cerebri, paris tertii, quarti, sexti, ramus primus paris quinti.
 hik:hik Processus laterales maximi. i Ora, qua cum osse verticis conjungitur. k Ora, qua cum squamoso.
 l:l Partes foraminum, per quae arteriae ad meningem crassam penetrant.
 m:m Foramina, per quae rami tertii nervorum quinti paris cerebri penetrant.
 n:n Ostia posteriora canalium, quibus os multiforme supra processus pterygoideos perforatum est.
 oppq:oppq Processus pterygoidei. o Paries exterior. ppq Paries interior: cui q hamulus, circum quem circumflexus palati flectitur.
 r:r Fissurae processuum pterygoideorum, in quas inseruntur portiones ossium palati.
 ss Os cribriforme.
 tt Vomer.

FIGURA DUODECIMA.

Os multiforme una cum cribriformi, à parte superiore.
 aabccdd Os cribriforme. a:a Partes cribriformes. b Crista galli. cc Pars, qua cum osse frontis connectitur. dd Sutura, communis ei cum multiformi.
 eeffgghhiikkllmmnnnooppqqrr Os multiforme.
 efg:efg Processus tenues. f:f Orae, quibus connectuntur cum osse frontis.
 g:g Processus clinoidei anteriores.
 h:h Foramina, per quae optici nervi una cum arteriis ab internis carotidibus penetrant in foramina oculorum.
 i Sinus, cui insidet continuïtas nervorum opticorum.
 k Sella equina.
 l Paries à postica parte sellae equinae subrectus.
 mno:mno Processus laterales maximi. n:n Orae, quibus connectuntur cum osse frontis, ossibusque verticis. o:o Orae, quibus connectuntur cum ossibus squamosis.
 p:p Foramina, per quae paris quinti nervorum cerebri rami secundi penetrant.
 q:q Foramina, per quae quinti paris nervorum cerebri rami tertii penetrant.
 r:r Partes foraminum, per quae arteriolae ad meningem crassam penetrant.

FIGURA DECIMA TERTIA.

Os multiforme una cum cribriformi & vomere, à parte inferiore.
 a a b Os cribriforme, cum spongiosis inferioribus. b Interstitium ad septum
 narium pertinens: ut videtur.
 c Vomere.
 d d e e f f g g h h i i k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w. Os multiforme.
 d e: d e Processus tenues. d Squama, qua cum osse frontis connectitur.
 f g: f g Processus laterales maximi. f Pars ad oculi foramen pertinens. g Pars,
 ad tempus & ad basem cranii.
 h: h Orae, quibus connectuntur cum ossibus jugalibus.
 i: i Orae, quibus connectuntur cum osse frontis.
 k l: k l Orae, quae pertinent ad foramina, quae constant ex oris illis, basi,
 processibus tenuibus, osse frontis. k Pars orae ad foraminis illius angustio-
 rem partem fissurae similem pertinens. l Pars, ad rotundiorē, idcirco
 lunata: per quam rotundiorē nervi cerebri tertii paris, quarti, sexti, &
 primi rami quinti paris in oculi foramen penetrant.
 m: m Foramina, per quae rami secundi quinti paris nervorum cerebri pene-
 trant.
 n: n Orae, quae connectuntur cum osse frontis, & ossibus verticis.
 o: o Orae, quae connectuntur cum ossibus squamosis.
 p: p Foramina, per quae tertii rami quinti paris nervorum cerebri penetrant.
 q Pars foraminis, per quod arteriola penetrat ad meningem crassam.
 r s t: r s t Processus pterygoidei. r Paries exterior. s t Paries interior: cui t ha-
 mulus, circum quem circumflexus palati flectitur. Inter extrema parietum
 fissura est, quam portio ossis palati implet.
 u: u Ostia priora canalium, quibus os multiforme supra processus pterygoideos
 perforatum est.
 v v v w Basis. w Pars postica, qua cum osse occipitis connectitur.
 Dubium quatenam *foraminula* Lancisius hic velit, *per quae nonnulli aërem*
illabi usque ad cerebrum asseverent.

FIGURA DECIMA QUARTA.

Os cribriforme & multiforme, à parte superiore. Sed cribriforme à multi-
 formi separatum. Ac multiforme in partes tres divisum: basem cum pro-
 cessibus tenuibus, & processus laterales maximos.
 a a b c d Os cribriforme.
 a: a Partes cribriformes.
 b c Crista galli. c Pars, qua cum osse frontis connectitur.
 d Interstitii, quod ad septum narium pertinet, pars superior: quae connecti-
 tur cum multiformi.
 e e f f g g h h i k l m n o o Ossis multiformis pars, constans ex basi & processibus
 tenuibus.
 e e f f g g Processus tenues. f: f Orae, quibus connectuntur cum osse frontis.
 g: g Processus clinoidei anteriores.
 h: h Foramina, per quae in foramina oculorum penetrant nervi optici una
 cum arteriis à carotidibus internis ad oculos pertinentibus.
 i k l m n o o Basis. i Pars anterior: cujus k ora, qua connectitur cum cribriformi.

- l Sinus, cui infidet continuitas nervorum opticorum.
 m Sella equina.
 n Pars politica, qua cum osse occipitis conjungitur. In hac paries subrectus, l figurae xii.
 o: o Partes laterales, cum quibus connectuntur processus laterales maximi.
 Confer iconum ossium foetus humani tabulae iv. figurae xx. c: c.
 p q r s t u v w x: p q r s t u v w x Processus laterales maximi.
 q Ora, qua connectitur cum osse frontis & verticis.
 r s Ora pertinens ad foramen, quod fit ex processu laterali maximo, basi, processu tenui, osse frontis. r Pars ad partem angustiore pertinens, fissurae similem. s Pars quodammodo lunata, pertinens ad partem rotundiorum.
 t Foramen, per quod secundus ramus quinti paris nervorum cerebri penetrat.
 u Pars, qua connectitur cum basi.
 Confer iconum ossium foetus tabulae iv. figurae xx. A: A.
 v Foramen, per quod tertius ramus quinti paris nervorum cerebri penetrat.
 Vide annotationem ad w.
 w Pars foraminis, per quod arteriola penetrat ad meningem crassam.
 An Lancisius, *foramina, per quae admittantur sanguinea vasa*, designans numeris his, 71. 23, voluit dextrum ex iis, quibus w adscripsi? Et an, designans quoque numeris 71. 24, voluit illud, cui v in sinistro latere inscripsi? Hoc certe illud est, per quod tertius ramus nervi quinti paris nervorum cerebri penetrat. Latet fortasse in numeris vitium.
 x Ora, qua connectitur cum osse squamoso.

FIGURA DECIMA QUINTA.

Respondet Vesalii figurae xii. capitis quinti libri primi de humani corporis fabrica, secundam capitis figuram non naturalem ostendenti, in qua anterior eminentia deperditur.

In utroque Vesalii codice Oporiniano exitat *anterior*: pro quo reponendum *posterior*, ut emendavimus in eo, quem hic Leidae edidimus.

Ego miraculum me videre existimarem, si quis calvariam mihi ostenderet, in qua--ea futura, quae Λ litterae similis est, deficeret, &c. ossium examine. Vide supra ad figuram x.

- a: a Ossa verticis ossi occipitis, deficiente futura lambdiformi, continuata.
 b Os squamosum processui laterali maximo ossis multiformis, deficiente, vel deleta futura, continuatum.

Neque enim negarim, *suturas frequenter connasci*, & ea occasione *diversa serie dispensatas apparere*. Ossium examine.

Reliqua ex figura x. intelligentur, cui respondent.

FIGURA DECIMA SEXTA.

Os multiforme cum cribriformi, à parte priore.

a b c c Os cribriforme.

ab Interstitium: cujus a pars superior est crista galli, quae hac parte cum osse frontis connectitur: b pars inferior ad septum narium pertinet.

Fortasse una cum lamina media ossis cribriformis etiam vomer exhibitus.

Hic Lancisius de *septo medio nasi, styliformem figuram*, ab aliis ossibus, & cartilaginibus liberatum, aemulari. Hanc autem figuram habet hic ex perspectivae, ut vocant, ratione.

Aa aa

c: c

- c:c Partes laterales cavernosae.
 ddeeffggghhiikkllmmnniooppqqrrsstt Os multiforme.
 d:d Processus tenues.
 ef:ef Processus laterales maximi. e:e Partes, quae ad foramina oculorum pertinent. f:f Partes, quae ad tempora, & ad basem cranii.
 g:g Orae, quibus connectuntur cum ossibus verticis.
 h:h Orae, quibus connectuntur cum osse frontis.
 i:i Orae, quibus connectuntur cum ossibus jugalibus.
 kl:kl Orae, quae pertinent ad foramina, quae fiunt ex processibus laterali-
 bus maximis, basi, processibus tenuibus, osse frontis. k:k Partes ad par-
 tes angustiores illorum foraminum pertinentes, fissuris similes. l:l Partes
 quodammodo lunatae, quibus pertinent ad eorundem partes rotundiores.
 m:m Foramina, per quae secundi rami quinti paris nervorum cerebri pene-
 trant.
 n:n Ostia anteriora canalium, quibus os multiforme supra processus ptery-
 goideos perforatum.
 opq:opq Processus pterygoidei.
 o:o Parietes exteriores.
 pq:pq Parietes interiores. q:q Hamuli, circum quos circumflexi palati
 flectuntur.
 r:r Fissurae inter extremos parietes processuum pterygoideorum. Quas portio-
 nes ossium palati implent.
 s:s Partes foraminum, per quae tertii rami quinti paris nervorum cerebri pe-
 netrant.
 t:t Partes foraminum, per quae arteriolae ad meningem crassam penetrant.


FIGURA DECIMA SEPTIMA.

Respondet Vesalii figurae quatuor capitis quinti libri primi de humani corpo-
 ris fabrica, tertiam non naturalem capitis figuram indicanti, in qua utrun-
 que tuber, antérieur nimirum & postérieur, intercidit.

Ego miraculum me videre existimarem, si quis calvariam -- inveniret, in
 qua, utrisque his, coronaria, & ea, quae A litterae similis est, deletis,
 duae lineae, altera secundum capitis longitudinem, altera secundum aures
 protracta, instar x calvariam interfecant. &c. ossium examine. Sutura ta-
 men coronalis in hac figura non discrepat à consueta, ut discrepat apud
 Vesalium loco supradicto.

- aa Ossa verticis continuata ossi occipitis, ob deletam, aut deficientem, su-
 turam lambdiformem.
 b Processus pterygoideus.
 c Os maxillare superius.
 Reliqua fere respondent figurae x: ex eaque, aut ex prima, intelligi poterunt.

100



TAB. XXXVII.

T A B U L A XLVII.

FIGURA PRIMA.

abcde **O**s jugale dextrum. a Ora denticulata, qua cum osse frontis & multiformi connectitur. b Pars ad temporis sinum pertinens. c Hac parte cum osse maxillari superiore connectitur. d Pars exterior. e Processus ad zygoma pertinens.

f Os unguis.

ghik Os maxillare superius dextrum. gh Processus ad nasum eminentem pertinens: cujus g pars interior, h exterior. i Pars, quae cum osse jugali connectitur; ex quo futura communis. k Pars posterior, & lateralis, pertinensque ad fundum foraminis oculi. Dentes infixi apparent.

lmno Os palati dextrum. l Pars, quae ad fundum foraminis oculi pertinet, & ab altera parte connectitur cum maxillari superiore, ab altera cum multiformis basi. m Pars tenuis, quae cum basi multiformis connectitur. Inter l & m fissura, cujus defectum supplet ossis multiformis basis. n Pars, cum qua connectitur processus pterygoideus ossis multiformis. o Pars, quae inter extremum processum pterygoideum & ossis maxillaris superioris partem, quae pone dentem maxillarem intimum est, interferitur.

FIGURA SECUNDA.

Os unguis.

Hoc esse pono, non quia forma plane suadeat, sed quia in hac figurarum serie vix aliud esse posse videatur, & fortasse rudius adumbratum sit.

FIGURA TERTIA.

a Os jugale dextrum.

bc Interstitium ossis cribriformis una cum continuata ei crista galli. b Crista galli. c Pars ad septum narium pertinens.

def Vomer. e Pars, quae cum basi multiformis connectitur. f Ora ad fauces pertinens.

ghi Hic vomer connectitur g h in fundo narium, g cum osse palati, h cum osse maxillari superiori; & i cum interstitio cribriformis.

klmnn Os maxillare superius dextrum. k Processus ad nasum eminentem pertinens. l Pars ad septum narium pertinens. m m Pars, qua cum osse maxillari superiore sinistro connectitur. n Pars ad palatum pertinens. Dentes apparent.

opqr Os palati dextrum. o Pars, qua cum osse sinistro connectitur. p Pars, quae interferitur extremo processui pterygoideo ossis multiformis imaeque parti ossis maxillaris superioris, quae est pone molarem intimum. q Pars tenuis, quae connectitur cum basi ossis multiformis. r Pars ad fundum foraminis oculi pertinens. Inter q & r fissura eadem, quae inter l & m figurae 1.

FIGURA QUARTA.

Os nasi.

FIGURA QUINTA.

Maxilla inferior.

a: a Capitula, quibus cum ossibus temporum committitur.

b: b Cervices.

c: c Processus coronoidæi.

d: d Partes, quae ad caput eriguntur.

e Introitus canalis, in quem nervus arteria & vena penetrant.

f Eminentia, cui mucro inferitur crassior eorum, in quos tendineum temporalis extremum à priori parte quodammodo migrat.

g g Pars dentes continens: qui per se apparent.

h Foramen, per quod rami nervi, arteriae, & venae penetrant ex canali, cujus introitus e.

FIGURA SEXTA.

a b Os jugale dextrum. a Ora denticulata, qua connectitur cum osse frontis, & multiformi. b Pars ad foramen oculi pertinens.

c Os unguis dextrum ex interiore parte, qua ad nasum pertinet.

de f g h h: Os maxillare superius dextrum. d Pars superior ad nasum pertinens, connexaque cum osse cavernoso. e Sinus maxillaris. f Processus, qui ad nasum eminentem pertinet. g Pars ad latus nasi pertinens. h h Ora scabra denticulataque, qua connectitur cum osse maxillari superiore sinistro. i Pars ad palatum pertinens. Dentes huic ossi infixi apparent per se.

k l m n o Os palati dextrum. k Ora denticulata, qua connectitur cum sinistro. l Processus, qui extremo processui pterygoideo ossis multiformis, maxillarisque superioris parti illi, quae est pone molarem intimum, interfertur. m Pars ad latus nasi pertinens, & ad sinum maxillarem. n Pars tenuis, quae connectitur cum basi ossis multiformis. o Pars ad fundum foraminis oculi pertinens, priorique parte connexa cum osse maxillari superiore, posteriori cum basi multiformis. Inter n & o fissura eadem, quae inter l & m figurae r.

p q r Os spongiosum inferius. q Hac parte annectitur processui ossis maxillaris superioris, qui ad nasum eminentem pertinet: r hac, ossi palati.

FIGURA SEPTIMA.

a b Os jugale dextrum. a Ora denticulata, qua connectitur cum osse frontis, & multiformi. b Pars ad foramen oculi pertinens.

c Os unguis dextrum, ex interiore parte.

de f f g h h i k Os maxillare superius dextrum. d Processus ad nasum eminentem pertinens. e Pars ad latus nasi pertinens. ff Ora aspera denticulataque, qua connectitur cum dextro. g Pars ad palatum pertinens. h h Pars, cui os palati assidet, annectiturque. i Pars, quae connectitur cum osse cavernoso, & ad cavernas ejus pertinet. k Sinus maxillaris.

FIGURA OCTAVA.

Os palati dextrum, ex interiore parte.

a Pars, quae pertinet ad latus nasi, sinumque maxillarem.

b Pars, quae ad fundum foraminis oculi pertinet: de qua figura 1. 1, & figura VI. o.

c Pars tenuis, quae annectitur ossis multiformis basi.

d Pars, quae interfertur extremo processui pterygoideo ossis multiformis, ossique maxillari superiori pone molarem intimum.

e Ora, cujus pars connectitur cum sinistro: pars, cum ossis maxillaris superioris parte ad palatum nasique fundum pertinente.

FIGURA NONA.

a a b b c Atlas. a: a Corporis partes duae, quibus cum processibus coronoidis ossis occipitis committitur. b: b Processus transversus: in quibus foramina pro arteria & vena vertebrali. c Pars arcuata posterior: in qua spinnae loco eminentia est asperula, à qua recti postici minores capitis oriuntur.

Primum spondylum spinae desinunt Galenus asserit, cujus non modo nullum vestigium in simia apparet, sed nec asperitas aliqua ea in parte sentitur; quum tamen in hominibus sedes illa aspera usque sit, & obtusum angulum habeat, ac etiam in multis ea parte processus emineat illo major, qui in ejus vertebrae anteriori sede extuberat, atque nonnunquam inchoatae spinnae mucro appareat. Ossium examine.

d Axis epistrophaei, sive processus, quem dentem nominant.

e: e Ligamenta duo fere teretia, utrimque nimirum unum, ab externa sede summitatis ejusdem apophysis (quam dentem nominant) oriuntur, & internae anteriorive partis utriusque coronae occipitis inferuntur. De motu capitis.

f Tertium, quod in medio eorum e: e consistit, quancumque robustissimum sit, & instar nervi mediocriter rotundum, nihilominus magnitudine & rotunditate ab utroque eorum superatur: oritur autem ab anteriori regione apicis processus dentem referentis, priorique ac mediae sedi foraminis medullae spinali parati valde adhaerescit. De motu capitis.

Hoc ligamentum designant numeri 15. 8, quibus dentem Lancisus designat. Et locum quidem, qui paulo supra dentem est: ut illum tamen ipsum designare voluisse, credibile sit.

g Prostreum ligamentum, instar nervi seu tendinis digitorum mediocriter rotundum, nonnihilque depressum, durum ac robustum est adeo, ut a cartilaginis natura parum recedat, hoc primae vertebrae cavitatem, quae dentem suscipit, extrinsecus circumdat, oriturque a sinu utrimque ipsius gratia excavato, & a dextra parte ad laevam procedens velut angulum rectum efficit, secundaeque vertebrae extremum turbinatum adamussim constringens, simul ipsum firmat, ut in neutram partem inclinet, & medullam spinalem quasi vallum ab eo separans tegit ac protegit, ne ossi nudo & errabundo assidue occurrens laedatur. De motu capitis.

h h i i k k l Epistrophaeus. h: h Corporis partes laterales duae, cum quibus atlas committitur. i: i Processus transversus: in quibus foramina pro arteria & vena vertebrali. k: k Processus obliqui inferiores. l Spina.

B b b b

F I.

FIGURA DECIMA.

Dentes dextri superiores. a Maxillaris intimus, b quartus, c tertius; d secundus, e primus. f Caninus. g Eorum, qui secant, secundus, h primus. Vide tractatum de dentibus.

FIGURA UNDECIMA.

Spina.

a a b b c Atlas. a: a Partes corporis sinuatae duae, quibus processus coronoides ossis occipitis excipit. b: b Processus transversi. c Posterior arcuata pars.

d c c æ f g Epistrophaeus. d Spina. e: e Corporis partes laterales duae, quibus cum atlante committitur. æ Axis. f Processus obliquus inferior. g Processus transversus.

h, i, k, l m n n o, p Colli vertebrae. Secundae l processus transversus, m corpus, n: n processus obliqui inferiores, o spina. Ex hac reliquarum partes cognosci possunt.

q q r s t, u, v, w, x, y, z, α, β, γ, δ, ε Vertebrae dorfi. Duodecimae q: q processus transversi, r corpus, s processus obliquus inferior, t spina. Ex hac partes reliquarum intelligentur.

ζ ζ η θ θ ι κ κ λ, μ, ν, ξ Vertebrae lumborum. Quintae ζ: ζ processus obliqui superiores, η spina, θ processus transversus, θ tuberculum circa radicem processus transversi, ι corpus, κ: κ processus obliqui inferiores. Ex hac intelligentur partes reliquarum.

Posterior vertebrarum apophysis η duplici linea, superiori nimirum ac inferiori, circumscibitur; prior in homine ad lumborum usque vertebrae semper deorsum inaequaliter tamen fertur; quanto enim superiorem locum vertebra ipsa obinet, tanto etiam ejusmodi linea productior est, & minus obliqua; in vertebrae lumborum quandoque recta est, aut quod rarius evenit, nonnihil sursum vergit: at linea, quae inferiorem spinæ vertebrarum sedem occupat, ad decimam usque thoracis superiori lineae productionem similem obinet, nam cum eadem inaequalitate obliqua deorsum protrahitur. Decimae spina, ut bene Galenus scribit, minor est, & in rotundum finem definit, saepeque recta linea in humiliori ipsius sede designatur, & obscure a subiecta excipitur: quamvis hoc saepius in undecima fieri conspiciamus. Infra decimam haec linea a prima spinæ origine tanquam a latiori basi sursum ferri incipit, & ab apophysis, quibus vertebrarum articuli commissi sunt, ne ipsorum syntaxis ac motus impediatur, longius recedit: verum quia ejusmodi articulorum processus, quanto vertebra inferior est, tanto alius in subiecti spondyli cavitates infiguntur, necesse quoque est, inferiorem spinæ lineam eo magis sursum vergere, quo humiliorem locum obinet ipsa vertebra. Ossium examine.

Ignorandum cum aliis anatomicis non est, in homine circa radices infernas transversarum proceritatum spondylorum lumbi, atque etiam duorum, qui ultimam thoracis partem constituunt, quaedam tubercula θ, magnitudine figuraque mespilorum nucleos referentia, saepe ac saepius reperiri. Ossium examine.

- o Ligamentum inter corpora vertebrarum intercedens, eaque colligans inter se. Talia quoque inter corpora reliqua.

$\pi\pi\epsilon\epsilon\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma\tau\tau\upsilon\phi\chi\chi$ Os sacrum. $\pi:\pi$ Processus obliqui superiores. $\epsilon:\epsilon$ Latera, quibus cum ossibus ilium committitur. $\sigma\sigma\sigma:\sigma\sigma\sigma$ Foramina posteriora, ab utroque latere quatuor. $\tau\tau$ Spinae. υ Hac parte vertebra prima & secunda non continuatae inter se. ϕ Hiatus, in quem ossis sacri canalis desinit. $\chi:\chi$ Processus obliqui inferiores imi.

Quatuor utrimque absoluta foramina magna ex parte in hominibus habere soles. Ossium examine.

ψ Foramina duo inter extremum sacrum & coccygis principium.

ω Coccyx.

FIGURA DUODECIMA.

Dentes dextri inferiores. a Maxillaris intimus, b quartus, c tertius, d secundus, e primus. f Caninus. g Eorum, qui secant, secundus, h primus. Vide tractatum de dentibus.

FIGURA DECIMA TERTIA.

Clavicula. a Extremum, quo committitur cum processu superiore scapulae. b Caput, quo cum sterno.

Ad jugulum ipsum foris convexa est, intus cava, ad acromium vero contra extrinsecus leviter cava, intus magis convexa. Ossium examine.

FIGURA DECIMA QUARTA.

Os hyoïdes, cum additamentis, quae cum apophysibus styloïdeis conjunguntur.

a Basis.

b:b Cornua.

cdef:ghi Additamenta, quae cum apophysibus styloïdeis conjunguntur. c:g Officula graniformia.

Quod vero dicunt recentes hi anatomicae artis instauratores, hujusce ossis additamenta, quae cum apophysi styloïde conjunguntur, hinc inde nunc tria, nunc quatuor officula, seu internodia, sere semper habere, adeo falsum est, ut iis, qui humana cadavera dissecant, ipsorum fidem ac diligentiam suspectam reddat, pariterque omnibus palam faciat, quam bene de ejusmodi officulis, quae raro in viris, & rarius etiam in mulieribus occurrunt, Galenum, tanquam ea ignoraverit, reprehendant. Ossium examine.

FIGURA DECIMA QUINTA.

Os hyoïdes, cujus additamenta, quae cum apophysibus styloïdeis conjunguntur, alia ac figura xiv. Huc pertinet idem locus Eustachii, qui adjectus figurae xiv.

a Basis.

b:b Cornua.

cde Additamentum, quod cum processu styloïde conjungitur.

f Officulum graniforme: ut videtur.

g Ligamentum esse videtur, cujusmodi plerumque invenitur, loco officulorum.

Bb bb 2

FI-

FIGURA DECIMA SEXTA:

Scapula dextra ex interiore parte.

a Pars sinuata.

b Cervix.

c Sinus, cum quo os humeri committitur.

d Processus superior.

e Processus coracoideus.

f Lunula ad radicem processus coracoidei: per quam arteria & vena s tabulae xxiv. n°. 11, & nervus 34 tabulae xx. n°. 11. pertinent.

FIGURA DECIMA SEPTIMA.

Eadem scapula à parte priori.

Velis dextram scapulam hominis, praesertim junioris, in manum sumere, eamque à priori parte spectare; sic ut in sinum, qui caput ossis humeri recipit, fere recta inspicias, eo positu, qui figurae huic maxime responderet: & cognosces, ejusmodi scapulam illo positu expressam esse. Quod vero Lancisium movit, ut de *alicujus bruti scapula* cogitaret, est fortasse hoc, quod dorsum scapulae a rudi modo adumbratum, maximeque pars illa, quae supra spinam est e.

a Dorsum.

b Ora anterior.

c Sinus, cum quo os humeri committitur.

dd Processus superior.

e Dorsi pars, quae supra spinam est.

f Processus coracoideus.

FIGURA DECIMA OCTAVA.

Sternum.

Puerulorum sternum in prima generatione totum cartilagineum est, & prorsus continuum, nullaque linea distinctum: ubi autem in os formari incipit, celerius ossis speciem superiores, quam inferiores, & mediae secundum latitudinem citius, quam extremae partes assumunt; unde fit, ut cartilagine undique comprehensae ejusmodi osseae partes, quasi plurimum in tabula nodorum speciem prae se ferant: quando autem foetus in lucem editur, inferiores sterni partes adhuc cartilagineae sunt, & divisionem nullam habent; deinde etiam ipsae eo modo, quo exposui, osseae evadunt; ac tandem ad summum sex tantum particulas, transversa linea a costarum cartilaginibus protracta, sternum incisae obtinet, quibus adnumero etiam illam, quae mucronatae cartilagini est praeposita; nam quum inferiores costae semper minus distent in insertione, quam superiores, sexta, qua ossi pectoris per articulum committitur, adeo septimae est vicina, ut quia ipsam tangit, nulla prorsus aut divisio, aut linea ejus gratia incisa in sterno, dum evadit osseum, remanere possit, sed in medio quinti ossis g. eam insigi necesse sit; quod ita se habere in publico gymnasio ostendi, multis sternis ante oculos omnium positis, non solum puerulorum, sed etiam illorum, qui ad quartum decimum, ac decimum octavum annum usque vixerant. Ossium examine.

abbcc

- a b b c c Os primum idemque superius. b: b Partes, quibus claviculae insident. c: c Partes, quibus continuantur cartilaginea extrema costarum primarum. Eadem in figura xix, xx, & xxi.
 d Os secundum, quod est inter extrema costarum secundarum & tertiarum.
 e Os tertium, inter extrema costarum tertiarum & quartarum.
 f Os quartum, inter extrema costarum quartarum & quintarum.
 g Os quintum, inter extrema costarum quintarum & septimarum.
 h Os sextum, cartilaginis mucronatae.
 i Cartilago mucronata.

In homine — plurimum varia fere semper occurrit, siquidem interdum vel in acutum finem desinit, vel instar epiglottidis in rotundum; saepe aut caudam birundinis, intus nonnihil in modum C flexam, refert, aut alteram cytini incisionem repraesentat: ossium examine. Confer h figurae xix, & k figurae xx, & l figurae xxi.

- k Foramen cartilaginis mucronatae.

Frequenter, sive hac, sive illa forma sit praedita, media perforatur. Ossium examine.

- l Quandoque sternum in medio lato foramine est pervium. Ossium examine.

FIGURA DECIMA NONA.

Sternum aliud.

Evenit etiam frequenter, quod alii non animadvertunt, ut haec ossa, primo & ultimo excepto, omnia scilicet quae in medio sunt, aut certe eorum aliqua, evidentissima linea, secundum eorundem longitudinis medium, modo recta, modo oblique protracta, dividantur; quo fit, ut sterni partes aut decem, aut novem, aut octo, aut septem, frequenter numerentur: ossium examine. Confer figuram xx, & xxi.

Lancisus uno ossium ordine integratum sternum cerni tradit. Ad hoc autem attendisse videtur, quod ex uno ordine maximam partem constat.

- a Os primum.
 b Os secundum, inter extrema costarum secundarum & tertiarum.
 c Os tertium, inter extrema costarum tertiarum & quartarum.
 d Os quartum, inter extrema costarum quartarum & quintarum.
 e, f Loco ossis quinti, quod inter extrema costarum quintarum & septimarum est, ossa duo, tanquam si quintum medium per longitudinem divisum recta esset.
 g Os sextum, cartilaginis mucronatae.
 h Cartilago mucronata.

In homine — plurimum varia fere semper occurrit, siquidem interdum vel in acutum finem desinit, vel instar epiglottidis in rotundum, saepe aut caudam birundinis, intus nonnihil in modum C flexam, refert, aut alteram cytini incisionem repraesentat: ossium examine. Confer i figurae xviii, & k figurae xx, & l figurae xxi.

FIGURA VIGESIMA.

Sternum aliud.

Evenit etiam frequenter, quod alii non animadvertunt, ut haec ossa, primo & ultimo excepto, omnia scilicet quae in medio sunt, aut certe eorum
 Cc cc
 ali-

aliqua, evidentissima linea, secundum eorundem longitudinis medium, modo recta, modo oblique protracta, dividantur; quo fit, ut sterni partes aut decem, aut novem, aut octo, aut septem, frequenter numerentur: ossium examine. Confer figuram xix, & xxi.

a Os primum.

b Os secundum, inter extrema costarum secundarum & tertiarum.

c Os tertium, inter extrema costarum tertiarum & quartarum.

d,e Loco ossis quarti, quod est inter extrema costarum quartarum & quintarum, ossa duo, tanquam si quartum medium per longitudinem recta divisum esset.

f,g Loco ossis quinti, quod inter extrema costarum quintarum & septimarum, ossa duo, tanquam si quintum per longitudinem oblique divisum esset.

Si modo inter e & f linea dividens indicata est, ut videtur esse, utque locus, ex ossium examine supra adductus, indicare potest.

h Os sextum, cartilaginis mucronatae.

i *Frequenter media perforatur.* Ossium examine.

Quem locum huc pertinere posse putavi: quanquam non ignoro, foramen in icone partim esse in cartilagine, partim etiam in osse, cui continuata est.

k Cartilago mucronata.

In homine -- plurimum varia fere semper occurrit, siquidem interdum vel in acutum finem desinit, vel instar epiglottidis in rotundum, saepe aut caudam hirundinis, intus nonnihil in modum C flexam, refert, aut alteram cytini incisionem repraesentat: ossium examine. Confer i figurae xviii, & h figurae xix, & l figurae xxi.

FIGURA VIGESIMA PRIMA.

Sternum aliud.

Evenit etiam frequenter, quod alii non animadvertunt, ut haec ossa, primo & ultimo excepto, omnia scilicet quae in medio sunt, aut certe eorum aliqua, evidentissima linea, secundum eorum longitudinis medium, modo recta, modo oblique protracta, dividantur; quo fit, ut sterni partes aut decem, aut novem, aut octo, aut septem, frequenter numerentur: ossium examine. Confer figuram xix, & xx.

a Os primum.

b,c Ossa duo, quae secundi loco sunt. d,e Duo, quae tertii. f,g Duo, quae quarti. h,i Duo, quae quinti: tanquam si per longitudinem recta divisa omnia essent.

k Os sextum, cartilaginis mucronatae.

l Cartilago mucronata.

In homine -- plurimum varia fere semper occurrit, siquidem interdum vel in acutum finem desinit, vel instar epiglottidis in rotundum, saepe aut caudam hirundinis, intus nonnihil in modum C flexam, refert, aut alteram cytini incisionem repraesentat: ossium examine. Confer i figurae xviii, & h figurae xix, & k figurae xx.

FIGURA VIGESIMA SECUNDA.

Costa dextra prima, à posteriore parte.

De

De hac Lancisius, *confractam forte ostendi*. Integra autem est, quantum ex figura intelligo.

- a Pars prim^a, qua inhaeret corpori vertebrae duodecimae dorſi.
b Capitulum, quo committitur cum proceſſu tranſverſo dorſi vertebrae duodecimae.
c Tuberculum juxta capitulum b: ad quod tuberculum ligamentum à proceſſu tranſverſo pertinet, coſtam alligans.

FIGURA VIGESIMA TERTIA.

Una ex costis dextris mediis.

- a Pars prima, qua inhaeret corporibus vertebrarum.
b Capitulum, quo committitur cum processu transverso.
c Tuberculum, ni fallor, cui ligamentum affixum, à processu transverso extremo huc pertinet, costamque alligans.
d Hic costa abrupta.

FIGURA VIGESIMA QUARTA.

Costa aut undecima, aut duodecima.

- a Pars prima, qua inhaeret corpori vertebrae suae.
b Abrupta pars.

Postremae costae tuberculum non habent, quod in processus transversi extremo leviter cavo conjicitur. Ossium examine.

FIGURA VIGESIMA QUINTA.

Manus dextra ex interiore parte.

- a, a, a, a, a Pollicis & digitorum ossa ordinis tertii. b Epiphysis superior: quae & in reliquis. c, c, c, c Digitorum ossa ordinis secundi. d Orbita, qua cum osse ordinis tertii committitur. e Epiphysis superior. Quae etiam in reliquis. f, f, f, f Pollicis & digitorum ossa ordinis primi. g Orbita, qua cum osse proximo committitur. h Epiphysis superior. Quae etiam in reliquis. i, i, i, i, i, i, i Ossa sesamoidea.

In homine sesamina officula pauca sunt, magnaue ex parte cartilaginea, si ea, quae pollicis applicantur, exceperis, inconstanti sede firmata. Ossium examine.

- k, k, k, k, k Osfa metacarpi. l Epiphyfis inferior, in omnibus.
m, n, o, p, q, r, s, t, u Carpus. m Os multangulum majus. n Multangulum mi-
nus. o Capitarum. p q Cuneiforme: in quo q processus unciformis. r Sub-
rotundum. s Triquetrum. t Lunatum. u Naviculare.

De multangulo majore confer efg figuræ xxxiii.

FIGURA VIGESIMA SEXTA.

Os humeri dextrum ab interiore parte.

- abc Epiphysis superior. a Caput, quo cum scapulae sinu committitur. b, c
Tubera inaequalia, b majus, c minus.

Cc cc 2

d, c

d, e Eminentiae, in quas ab inferiore parte tubera b & c migrant. Inter quas, itemque inter tubera illa, sinus f est, partim in epiphysi, partim in trunco: per quem sinum ducitur tendo capitis longioris bicipitis brachii.

g Truncus.

h, i Sinus, quorum alter h radium, alter i ulnam recipit, quo tempore cubitus admodum flexus est.

Cavitas humeri, in quam posterior corona (ulnae) recipitur, simulque tota immergitur atque absconditur, triplo illa est major, quae anteriorem suscipit.

Ossium examine.

k l Epiphysis inferior. k Tuberculum, cum quo radius committitur. l Rotula, cum qua ulna.

m, n Condyli: m minor, n major.

FIGURA VIGESIMA SEPTIMA:

Idem os humeri ab exteriori parte.

a Epiphysis superior. a Caput, quo cum sinu scapulae committitur. b Tuberinaequabile majus.

c Truncus.

d Sinus, qui olecranon recipit, quum cubitus extenditur.

Cavitas humeri, in quam posterior corona (ulnae) recipitur, simulque tota immergitur atque absconditur, triplo illa est major, quae anteriorem suscipit.

Ossium examine.

e f Epiphysis inferior. e Rotula, cum qua ulna committitur. f Tuberculum, cum quo radius.

g, h Condyli: g minor, h major.

FIGURA VIGESIMA OCTAVA:

Radius dexter ab interiori parte.

a Capitulum, quo cum ossis humeri tuberculo, & cum ulnae sinu, committitur.

c Epiphysis inferior.

FIGURA VIGESIMA NONA:

Idem radius ab exteriori parte.

a Capitulum, quo cum osse humeri, & cum ulna, committitur.

c Epiphysis inferior.

In inferiore parte sinus, per quos tendines ad manum à cubito ducuntur, majorem partem obscure indicati. Vide plenius in skeleti hominis tabula 11.

FIGURA TRIGESIMA:

Ulna dextra ab illa parte, qua radium spectat.

a Olecranon.

Corona posterior. Ossium examine.

b Sinus sigmoides, quo cum ossis humeri rotula committitur.

c Sinus,

c Sinus, cum quo radii capitulum committitur.

d *Corona anterior*. Ossium examine.

fg Epiphysis inferior. f Processus styloides. g Capitulum, cum quo radius committitur.

h Spina acuta, in quam, qua radium spectat, definit.

FIGURA TRIGESIMA PRIMA.

Eadem ulna à parte adversa.

a Olecranon.

b Sinus sigmoideus, quo cum rotula ossis humeri committitur.

c *Corona anterior*. Ossium examine.

ef Epiphysis inferior. e Capitulum, cum quo radius committitur. f Processus styloides.

g Spina acuta, in quam, qua radium spectat, definit.

FIGURA TRIGESIMA SECUNDA.

Manus dextra ab exteriori parte.

a, a, a, a, a Digitorum ossa ordinis tertii, & pollicis ultimum. b Epiphysis superior, in omnibus.

c, c, c, c Digitorum ossa ordinis secundi. d Epiphysis superior, in omnibus.

e, e, e, e Pollicis digitorumque ossa ordinis primi. f Epiphysis superior, in omnibus.

g, g, g, g, g Ossa metacarpi. h Epiphysis inferior, in omnibus.

i, k, l, m, n, o, p, q Carpus. i Os multangulum majus. k Multangulum minus.

l Capitulum. m Cuneiforme. n Naviculare. o Lunatum. p Triquetrum.

q Subrotundum.

FIGURA TRIGESIMA TERTIA.

Carpus dexter ab interiori parte.

abcdefg Carpi ossium ordo secundus.

hikl Ordo primus.

a Os cuneiforme. b Processus unciformis.

c Capitulum.

d Multangulum minus.

efg Multangulum majus. f Eminentia insignis, ad cujus interiorem partem g sinus est, in quo tendo radialis interni continetur.

h Naviculare.

i Lunatum.

k Triquetrum.

l Subrotundum.

FIGURA TRIGESIMA QUARTA.

Simiae carpus dexter, ex interiori parte.

a Os cuneiforme.

Dd dd

b Capi-

- b Capitatum.
 c Multangulum minus.
 d Multangulum majus.
 e *Sed instabunt & urgebunt, ut eis in homine ossiculum circa radicem magni digiti manus locatum ostendamus, quum Galenus de illo mentionem faciens renuerit, cum vetustioribus anatomicis id inter brachialis ossa numerare: Ego, ut verum ingenue fatear, id ossiculum, quod in simia perpetuo reperitur e, quodque semel aut bis tantum in homine videre potui, nescio utrum a Galeno ex propria, an ex antiquorum sententia (quod, ut jam monui, aequius est suspicari) introducatur. Ossium examinae.*
 f *Errare etiam se cognoscent, qui tam licenter Galenum interpretantur, aut potius ejus sensum pervertunt, si animadvertent, illum asseruisse, brachialis ossa nec plura, nec pauciora, quam octo esse posse, & id os f, quo simiae abundant, homo vero destituitur, non in prima brachialis aciei esse locatum, sed tertio ejusdem aciei ossi incumbere, atque inter ea, quae indicem ac medium sustinent, se ipsum inserere. Ossium examinae.*
 g Naviculare.
 h Lunatum.
 i Triquetrum.
 k Subrotundum.

FIGURA TRIGESIMA QUINTA.

Simiae carpus: dexter idem, ab exteriori parte.

- a Est e figurae xxxiv.
 b Multangulum majus.
 c Multangulum minus.
 d Capitatum.
 e Cuneiforme.
 f Est f figurae xxxiv.
 g Naviculare.
 h Lunatum.
 i Triquetrum.
 k Subrotundum.

FIGURA TRIGESIMA SEXTA.

Carpus dexter ab exteriori parte.

a b c d Carpi ossium ordo secundus.

- e f g h Ordo primus.
 a Multangulum majus.
 b Multangulum minus.
 c Capitatum.
 d Cuneiforme.
 e Naviculare.
 f Lunatum.
 g Triquetrum.
 h Subrotundum.

FIGURA TRIGESIMA SEPTIMA.

Manus dextra simiae, ex interiore parte.

In simia magnus digitus brevis, gracilis, & omnino ridiculus. Ossium examine.

a, a, a, a, a Digitorum ossa ordinis tertii, pollicisque ultimum.

b, b, b, b Digitorum ossa ordinis secundi.

c, c, c, c, c Digitorum pollicisque ossa ordinis primi.

d, d, d, d, d Ossa metacarpi.

e, e, e, e, e Ossicula sesamoidea.

In simia & canibus multa occurrunt, & ossa perpetuo sunt, singuloque primo quatuor digitorum internodio, & secundo pollicis gemina ex illis sere semper adhaerentur. Ossium examine.

f Carpi os cuneiforme.

g Capitatum.

h Multangulum minus.

i Multangulum majus.

k Est e figurae xxxiv.

l Naviculare.

m Est f figurae xxxiv.

n Lunatum.

o Triquetrum.

p Subrotundum.

F I N I S.

Pag. 245. l. 38. pro F:F pone DE:DE.

B I B L I O P E G O.

Tab. I. II. colloca è regione paginae 33.

III. IV. - - - - - 39.

V. VI. - - - - - 45.

VII. VIII. - - - - - 49.

Sequentes è regione suae quamque linearis pone, ac sic unamquamque cum sua lineari colloca ante explicationem, quae ad eam pertinet.

Linearium geminarum n°. 1. colloca ante n°. 11. positu eodem.

A A N D E N B O E K B I N D E R.

Tab. I. II. moet gesteld werden tegen over pag. 33.

III. IV. - - - - - 39.

V. VI. - - - - - 45.

VII. VIII. - - - - - 49.

De volgende moeten ieder met haare geletterde omtrekplaat geplaatst werden voor de explicatie, die tot haar behoort; in diervoegen, dat de omtrekplaat tegen over derzelver opgemaakte kome.

Van de dubbelde omtrekplaat moet n°. 1. voor n°. 11. geplaatst, en op de zelve wyze als n°. 11. gesteld werden.

Apud Joannem & Hermannum Verbeek prostant

Bernardi Siegfried Albinii *Historia musculorum hominis.* Leidae 1734. 4°.

- - - - - *Icones ossium foetus humani. Accedit osteogeniae brevis historia.* Leid. 1737. 4°.

- - - - - *Tabulae sceleti & musculorum corporis humani.* Leid. 1747. forma atlant. maj.

- - - - - *Tabulae VII. uteri mulieris gravidae, cum jam parturiret mortuae.* Lugd. Bat. 1748. Et appendicis tab. 1. 1751. forma atlant. maj.

- - - - - *Tabulae ossium humanorum.* Leid. 1753. forma atlant. maj.

- - - - - *Tabula vasis chyliferi cum vena azyga, arteriis intercostalibus, aliisque vicinis partibus.* Lugd. bat. 1757. forma atlant. maj.

- - - - - *Academicarum annotationum lib. I. II. III. IV. V. 1754. 1755. 1756. 1758. 1761. 4°.*

2 T Y P O G R A P H I A

D A M M E A N A.

005661453

